УДК 517.9

Р. С. Минасян

О стационарном температурном поле в некоторых криволинейных
 звездообразных телах

(Представлено академиком АН Армянской ССР М. М. Джрбашяном 16/XII 1970)

В работе дается эффективное решение задачи плоского установившегося течения тепла в некоторых цилиндрических телах, поперечное сечение которых представляет звездообразную двусвязную область, когда на границе области задано распределение температуры, а внутри тела имеются источники тепла. Задачи подобного рода встречаются при определении температурного поля в элементах теплообменников, змеевиках и т. п.

Рис. 1

Пусть имеем цилиндрическое тело (рис. 1), ограниченное поверхностями

$$r = R_1 e^{-\left(\varphi - \frac{2\mu\pi}{n}\right)}; \quad r = R_2 e^{-\left(\varphi - \frac{2\mu\pi}{n}\right)} \quad \text{при} \quad \frac{2\mu\pi}{n} \leq \varphi \leq \frac{(2\mu+1)\pi}{n}$$

и

$$r = R_1 e^{\left(2\pi \frac{\mu+1}{n} - \varphi\right)}; \quad r = R_2 e^{\left(2\pi \frac{\mu+1}{n} - \varphi\right)}$$

$$\text{при} \quad \frac{(2\mu+1)\pi}{n} \leq \varphi \leq \frac{2(\mu+1)\pi}{n}$$

Здесь $\omega = \text{ctg} \frac{\theta}{2}$; θ — угол между касательными ED и EF ; n — число вершин; $\mu = 0, 1, 2, \dots, n-1$.

Функция распределения температуры $U(r, \varphi)$ удовлетворяет уравнению (1)

$$\frac{\partial^2 U}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} = -\frac{1}{\lambda} \omega(r, \varphi), \quad (1)$$

где λ — коэффициент теплопроводности, $\omega(r, \varphi)$ — интенсивность тепловыделения, и граничным условиям

$$U(R_1 e^{i\left(\varphi - \frac{2\mu\pi}{n}\right)}, \varphi) = T_0(\varphi);$$

$$U(R_2 e^{i\left(\varphi - \frac{2\mu\pi}{n}\right)}, \varphi) = T_1(\varphi), \quad \left(\frac{2\mu\pi}{n} \leq \varphi \leq \frac{(2\mu+1)\pi}{n}\right);$$

$$U(R_1 e^{i\left(2\pi\frac{\mu+1}{n} - \varphi\right)}, \varphi) = T_0(\varphi);$$

$$U(R_2 e^{i\left(2\pi\frac{\mu+1}{n} - \varphi\right)}, \varphi) = T_1(\varphi), \quad \left(\frac{(2\mu+1)\pi}{n} \leq \varphi \leq \frac{2(\mu+1)\pi}{n}\right).$$

Предполагаем, что функции $T_0(\varphi)$ и $T_1(\varphi)$ непрерывны и почти всюду на $(0, 2\pi)$ обладают производной с ограниченной вариацией, а $\omega(r, \varphi)$ удовлетворяет условиям Дирихле. Кроме того, предполагаем, что $U(r, \varphi)$ — периодическая относительно φ функция с периодом $\frac{2\pi}{n}$:

$$U\left(r, \varphi + \frac{2\pi}{n}\right) = U(r, \varphi). \text{ Вследствие периодичности достаточно рас-}$$

смотреть $U(r, \varphi)$ при $0 \leq \varphi \leq \frac{2\pi}{n}$, причем должны выполняться условия

$$U(r, 0) = U\left(r, \frac{2\pi}{n}\right); \quad \frac{\partial U}{\partial \varphi} \Big|_{\varphi=0} = \frac{\partial U}{\partial \varphi} \Big|_{\varphi=\frac{2\pi}{n}}. \quad (3)$$

Прежде, чем переходить к построению решения, преобразуем систему координат, обозначив

$$re^{-i\varphi} = R_1 e^{i\sqrt{1+\omega^2}\xi}, \quad \varphi = \eta. \quad (4)$$

Тогда новые неизвестные функции

$$U_1(\xi, \eta) = \frac{1}{2} \left[U(R_1 e^{i\sqrt{1+\omega^2}\xi + i\eta}, \eta) - U\left(R_1 e^{i\sqrt{1+\omega^2}\xi + i\left(\frac{2\pi}{n} - \eta\right)}, \frac{2\pi}{n} - \eta\right) \right]; \quad (5)$$

$$U_2(\xi, \eta) = \frac{1}{2} \left[U(R_1 e^{i\sqrt{1+\omega^2}\xi + i\eta}, \eta) + U\left(R_1 e^{i\sqrt{1+\omega^2}\xi + i\left(\frac{2\pi}{n} - \eta\right)}, \frac{2\pi}{n} - \eta\right) \right]$$

в области $0 < \xi < \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}} \ln \frac{R_2}{R_1}$; $0 < \eta < \frac{\pi}{n}$ удовлетворяют уравнению с неразделяющимися переменными

$$\frac{\partial^2 U_l}{\partial \xi^2} - 2\alpha \frac{\partial^2 U_l}{\partial \xi \partial \tau_l} + \frac{\partial^2 U_l}{\partial \tau_l^2} = -\frac{1}{\lambda} \omega_l(\xi, \eta), \quad (l = 1; 2) \quad (6)$$

и граничным условиям

$$U_l(0, \tau_l) = T_0^{(l)}(\tau_l); \quad U_l(d, \tau_l) = T_1^{(l)}(\tau_l); \quad U_l(\xi, 0) = U_l(\xi, b) = 0;$$

$$\left| \frac{\partial U_2}{\partial \tau_1} - \alpha \frac{\partial U_2}{\partial \xi} \right|_{\tau_1=0} = \left| \frac{\partial U_2}{\partial \tau_1} - \alpha \frac{\partial U_2}{\partial \xi} \right|_{\tau_1=b} = 0. \quad (7)$$

Здесь введены следующие обозначения:

$$\alpha = \frac{\omega}{\sqrt{1+\omega^2}}; \quad \omega_l(\xi, \eta) = \frac{R_1^2}{2} e^{2\sqrt{1+\omega^2}\xi} \left[e^{2\omega\tau_l} \omega(R_1 e^{\sqrt{1+\omega^2}\xi + \omega\tau_l}, \eta) + \right. \\ \left. + (-1)^l e^{2\omega\left(\frac{2\pi}{n} - \tau_l\right)} \omega\left(R_1 e^{\omega\left(\frac{2\pi}{n} - \tau_l\right) + \sqrt{1+\omega^2}\xi}, \frac{2\pi}{n} - \eta\right) \right];$$

$$b = \frac{\pi}{n}; \quad d = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}} \ln \frac{R_2}{R_1}; \quad T_0^{(l)}(\tau_l) = \frac{1}{2} \left[T_0(\tau_l) + (-1)^l T_0\left(\frac{2\pi}{n} - \tau_l\right) \right];$$

$$T_1^{(l)}(\tau_l) = \frac{1}{2} \left[T_1(\tau_l) + (-1)^l T_1\left(\frac{2\pi}{n} - \tau_l\right) \right]. \quad (8)$$

Поступая далее так же, как ранее (2), будем искать функции $U_1(\xi, \tau_1)$ и $U_2(\xi, \tau_2)$ одновременно в виде двух разложений в ряд

$$U_l(\xi, \tau_l) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k^{(l)}(\tau_l) \sin \gamma_k \xi = \frac{g_0^{(l)}(\tau_l)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} g_k^{(l)}(\tau_l) \cos \gamma_k \xi, \quad (l = 1; 2) \quad (9)$$

где

$$\gamma_k = \frac{k\pi}{d}; \quad f_k^{(l)}(\tau_l) = \frac{2}{d} \int_0^d U_l(\xi, \tau_l) \sin \gamma_k \xi d\xi;$$

$$g_k^{(l)}(\tau_l) = \frac{2}{d} \int_0^d U_l(\xi, \tau_l) \cos \gamma_k \xi d\xi.$$

Для определения $f_k^{(l)}(\tau_l)$ и $g_k^{(l)}(\tau_l)$ умножим уравнение (6) поочередно на $\frac{2}{d} \sin \gamma_k \xi d\xi$; $\frac{2}{d} \cos \gamma_k \xi d\xi$ и проинтегрируем от 0 до d . Принимая во внимание (7), будем иметь:

$$f_k^{(l)''}(\tau_l) + 2\alpha\gamma_k g_k^{(l)'}(\tau_l) - \gamma_k^2 f_k^{(l)}(\tau_l) = -\frac{2}{d} \left\{ \frac{1}{\lambda} \int_0^d \omega_l(\xi, \eta) \sin \gamma_k \xi d\xi + \right.$$

$$+ \gamma_k \left[T_0^{(1)}(\eta) - (-1)^k T_1^{(1)}(\eta) \right] \Big| = -\frac{2}{d} P_k^{(1)}(\eta); \quad (10)$$

$$g_k^{(1)'}(\eta) - 2\alpha\gamma_k f_k^{(1)'}(\eta) - \gamma_k^2 g_k^{(1)}(\eta) = -\frac{2}{d} \left\{ \frac{1}{k} \int_0^d \omega_1(\xi, \eta) \cos \gamma_k \xi d\xi + \right.$$

$$\left. + 2\alpha \left[T_0^{(1)'}(\eta) - (-1)^k T_1^{(1)'}(\eta) \right] - T_2^{(1)}(\eta) + (-1)^k T_3^{(1)}(\eta) \right\} = -\frac{2}{d} Q_k^{(1)}(\eta).$$

Здесь обозначено

$$T_2^{(1)}(\eta) = \frac{\partial U_1}{\partial \xi} \Big|_{\xi=0}; \quad T_3^{(1)}(\eta) = \frac{\partial U_1}{\partial \xi} \Big|_{\xi=d}. \quad (11)$$

Граничные условия для $f_k^{(1)}(\eta)$ и $g_k^{(1)}(\eta)$, согласно (7), будут:

$$f_k^{(1)}(0) = f_k^{(1)}(b) = g_k^{(1)}(0) = g_k^{(1)}(b) = 0;$$

$$f_k^{(2)'}(0) + \alpha\gamma_k g_k^{(2)}(0) = f_k^{(2)'}(b) + \alpha\gamma_k g_k^{(2)}(b) = 0; \quad (12)$$

$$g_k^{(2)'}(0) - \alpha\gamma_k f_k^{(2)'}(0) = -\frac{2\alpha}{d} \left[T_0^{(2)}(0) - (-1)^k T_1^{(2)}(0) \right];$$

$$g_k^{(2)'}(b) - \alpha\gamma_k f_k^{(2)'}(b) = -\frac{2\alpha}{d} \left[T_0^{(2)}(b) - (-1)^k T_1^{(2)}(b) \right].$$

Решая уравнения (10) и удовлетворяя условиям (12), для $f_k^{(1)}(\eta)$ и $g_k^{(1)}(\eta)$ получаем следующие выражения:

$$f_k^{(1)}(\eta) = \frac{2}{\nu\gamma_k d \operatorname{sh} \nu\gamma_k b} \left\{ \operatorname{sh} \nu\gamma_k (b - \eta) \int_0^b \left[P_k^{(1)}(\eta_1) \cos \alpha\gamma_k (\eta - \eta_1) - \right. \right.$$

$$\left. - Q_k^{(1)}(\eta_1) \sin \alpha\gamma_k (\eta - \eta_1) \right] \operatorname{sh} \nu\gamma_k \eta_1 d\eta_1 + \operatorname{sh} \nu\gamma_k \eta \int_\eta^b \left[P_k^{(1)}(\eta_1) \cos \alpha\gamma_k (\eta_1 - \eta) + \right.$$

$$\left. + Q_k^{(1)}(\eta_1) \sin \alpha\gamma_k (\eta_1 - \eta) \right] \operatorname{sh} \nu\gamma_k (b - \eta_1) d\eta_1 \Big\}; \quad (13)$$

$$g_k^{(1)}(\eta) = \frac{2}{\nu\gamma_k d \operatorname{sh} \nu\gamma_k b} \left\{ \operatorname{sh} \nu\gamma_k (b - \eta) \int_0^b \left[P_k^{(1)}(\eta_1) \sin \alpha\gamma_k (\eta - \eta_1) + \right. \right.$$

$$\left. + Q_k^{(1)}(\eta_1) \cos \alpha\gamma_k (\eta - \eta_1) \right] \operatorname{sh} \nu\gamma_k \eta_1 d\eta_1 - \operatorname{sh} \nu\gamma_k \eta \int_\eta^b \left[P_k^{(1)}(\eta_1) \sin \alpha\gamma_k (\eta_1 - \eta) - \right.$$

$$\left. - Q_k^{(1)}(\eta_1) \cos \alpha\gamma_k (\eta_1 - \eta) \right] \operatorname{sh} \nu\gamma_k (b - \eta_1) d\eta_1 \Big\};$$

$$g_n^{(1)}(\eta) = \frac{2}{d} \left| \left(1 - \frac{\eta}{b} \right) \int_0^\eta Q_0^{(1)}(\tau_n) \tau_n d\tau_n + \eta \int_\eta^b Q_0^{(1)}(\tau_n) \left(1 - \frac{\tau_n}{b} \right) d\tau_n \right|$$

Здесь обозначено $\nu = \sqrt{1 - \sigma^2}$. Аналогично для $f_k^{(2)}(\eta)$ и $g_k^{(2)}(\eta)$ имеем

$$f_k^{(2)}(\eta) = \frac{2}{\nu \gamma_k d \operatorname{sh} \nu \gamma_k b} \left\{ \operatorname{ch} \nu \gamma_k (b - \eta) \left| \int_0^\eta (P_k^{(2)}(\tau_n) \cos \alpha \gamma_k (\tau - \tau_n) - \right. \right. \\ \left. \left. - Q_k^{(2)}(\tau_n) \sin \alpha \gamma_k (\tau - \tau_n)) \operatorname{ch} \nu \gamma_k \tau_n d\tau_n - a (T_0^{(2)}(0) - (-1)^k T_1^{(2)}(0)) \sin \alpha \gamma_k \eta \right| + \right. \\ \left. + \operatorname{ch} \nu \gamma_k \eta \left| \int_\eta^b (P_k^{(2)}(\tau) \cos \alpha \gamma_k (\tau_n - \tau) - Q_k^{(2)}(\tau_n) \sin \alpha \gamma_k (\tau_n - \tau)) \operatorname{ch} \nu \gamma_k (b - \tau_n) d\tau_n - \right. \right. \\ \left. \left. - a (T_0^{(2)}(b) - (-1)^k T_1^{(2)}(b)) \sin \alpha \gamma_k (b - \eta) \right| \right\},$$

$$g_k^{(2)}(\eta) = \frac{2}{\nu \gamma_k d \operatorname{sh} \nu \gamma_k b} \left\{ \operatorname{ch} \nu \gamma_k (b - \eta) \left| \int_0^\eta (P_k^{(2)}(\tau_n) \sin \alpha \gamma_k (\tau - \tau_n) + \right. \right. \\ \left. \left. + Q_k^{(2)}(\tau_n) \cos \alpha \gamma_k (\tau - \tau_n)) \operatorname{ch} \nu \gamma_k \tau_n d\tau_n + a (T_0^{(2)}(0) - (-1)^k T_1^{(2)}(0)) \cos \alpha \gamma_k \eta \right| - \right. \\ \left. - \operatorname{ch} \nu \gamma_k \eta \left| \int_\eta^b (P_k^{(2)}(\tau_n) \sin \alpha \gamma_k (\tau_n - \tau) - Q_k^{(2)}(\tau_n) \cos \alpha \gamma_k (\tau_n - \tau)) \operatorname{ch} \nu \gamma_k (b - \tau_n) d\tau_n + \right. \right. \\ \left. \left. + a (T_0^{(2)}(b) - (-1)^k T_1^{(2)}(b)) \cos \alpha \gamma_k (b - \eta) \right| \right\}; \quad (14)$$

$$g_0^{(2)}(\eta) = C_0 - \frac{2}{d} \int_0^\eta \left\{ (\tau - \tau_n) \left| \frac{1}{k} \int_0^\eta \alpha_2(\xi, \tau_n) d\xi - T_2^{(2)}(\tau_n) + T_3^{(2)}(\tau_n) + \right. \right. \\ \left. \left. + a (T_0^{(2)}(\tau_n) - T_1^{(2)}(\tau_n)) \right| + a [T_0^{(2)}(\tau_n) - T_1^{(2)}(\tau_n)] \right\} d\tau_n,$$

где C_0 — постоянная, которая определится в дальнейшем. При этом должно выполняться следующее условие:

$$\int_0^\eta \left| T_2^{(2)}(\tau) - T_3^{(2)}(\tau) - a (T_0^{(2)}(\tau) - T_1^{(2)}(\tau)) - \frac{1}{k} \int_0^\eta \alpha_2(\xi, \tau) d\xi \right| d\eta = 0. \quad (15)$$

В выражения (13) и (14) входят неизвестные значения $T_2^{(1)}(\tau)$, $T_3^{(1)}(\tau)$, $T_2^{(2)}(\tau)$ и $T_3^{(2)}(\tau)$. Для их определения потребуем выполнения первой группы граничных условий (7) вторым из представлений (9) функций $U_l(\xi, \tau)$:

$$\frac{\bar{g}_0^{(l)}(\tau)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} g_k^{(l)}(\tau) = T_0^{(l)}(\tau); \quad \frac{g_0^{(l)}(\tau)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k g_k^{(l)}(\tau) = T_1^{(l)}(\tau). \quad (16)$$

Рассмотрим сначала случай, когда $l = 1$. Умножим оба соотношения (16) на $\frac{2}{b} \sin \delta_1 \tau d \tau$, где $\delta_1 = \frac{j\pi}{b}$, и проинтегрируем от 0 до b .

Замечая, что ряды в (16) сходятся равномерно при $0 \leq \tau \leq b$, вследствие чего возможна перестановка знаков суммы и интеграла, а также учитывая (10) и (12), для коэффициентов Фурье функций $T_2^{(1)}(\tau)$ и $T_3^{(1)}(\tau)$ получаем

$$B_l^{(s)} = -4\alpha\delta_1^3 \frac{\operatorname{ch} \nu\delta_1 d - (-1)^s \cos 2\delta_1 d}{d \operatorname{sh} \nu\delta_1 d} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{[1 + (-1)^{k+s}] N_k^{(l)}}{(\gamma_k^2 + \delta_1^2)^2 - 4\alpha^2 \gamma_k^2 \delta_1^2} + p_l^{(s)}. \quad (17)$$

Здесь введены следующие обозначения:

$$B_l^{(s)} = 2\delta_1 \int_0^b |T_2^{(1)}(\tau) - (-1)^s T_3^{(1)}(\tau)| \sin \delta_1 \tau d \tau;$$

$$N_k^{(s)} = \gamma_k d |f_k^{(1)'}(0) - (-1)^s f_k^{(1)'}(b)|;$$

$$p_l^{(s)} = -\frac{2\delta_1}{\operatorname{sh} \nu\delta_1 d} \left\{ [\operatorname{ch} \nu\delta_1 d - (-1)^s \cos 2\delta_1 d] \int_0^b [T_0^{(1)'}(\tau) + (-1)^s T_1^{(1)'}(\tau)] \times \right. \quad (18)$$

$$\times \cos \delta_1 \tau d \tau - [2 \operatorname{sh} \nu\delta_1 d + (-1)^s \nu \sin 2\delta_1 d] \int_0^b [T_0^{(1)'}(\tau) - (-1)^s T_1^{(1)'}(\tau)] \times$$

$$\times \sin \delta_1 \tau d \tau - \frac{1}{\kappa} \int_0^b \int_0^d \varpi_1(\xi, \tau) |\sin \delta_1 (\tau + \alpha\xi) \operatorname{sh} \nu\delta_1 (d - \xi) +$$

$$+ (-1)^s \sin \delta_1 (\tau - \alpha d - \alpha\xi) \operatorname{sh} \nu\delta_1 \xi| d\xi d\tau \left. \right\}.$$

В свою очередь, $N_k^{(s)}$, согласно (13) и (18), выразятся посредством $B_l^{(s)}$ из следующей системы:

$$N_k^{(s)} = -4\alpha\nu\gamma_k^3 \frac{\operatorname{ch} \nu\gamma_k b - (-1)^s \cos 2\gamma_k b}{b \operatorname{sh} \nu\gamma_k b} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{[1 + (-1)^{l+s}] B_l^{(k)}}{(\gamma_k^2 + \delta_l^2)^2 - 4\alpha^2 \gamma_k^2 \delta_l^2} + \tau_k^{(s)}, \quad (19)$$

где

$$\begin{aligned}
 A_k^{(j)} = & \frac{2\gamma_k}{\operatorname{sh} \nu \gamma_k b} \left\{ \int_0^b [T_0^{(j)}(\tau) - (-1)^k T_1^{(j)}(\tau)] [2 \sin \alpha \gamma_k \tau \operatorname{sh} \nu \gamma_k (b - \tau) + \right. \\
 & + \nu \cos \alpha \gamma_k \tau \operatorname{ch} \nu \gamma_k (b - \tau) - (-1)^k (2 \sin \alpha \gamma_k (b - \tau) \operatorname{sh} \nu \gamma_k \tau - \\
 & \left. - \nu \cos \alpha \gamma_k (b - \tau) \operatorname{ch} \nu \gamma_k \tau)] d\tau + \frac{1}{k} \int_0^b \int_0^d \omega_1(\xi, \eta) [\sin \gamma_k (\alpha \tau + \xi) \operatorname{sh} \nu \gamma_k (b - \tau) - \right. \\
 & \left. - (-1)^k \sin \gamma_k (\alpha b - \alpha \tau - \xi) \operatorname{sh} \nu \gamma_k \tau] d\xi d\tau \right\}. \quad (20)
 \end{aligned}$$

Таким образом, для определения неизвестных $B_j^{(j)}$ и $A_j^{(j)}$ получили совокупность двух бесконечных систем линейных алгебраических уравнений (17) и (19). Займемся исследованием полученных систем. Определим вначале суммы модулей коэффициентов в каждом из уравнений. Сумма модулей коэффициентов в j -м уравнении системы (17) равна

$$\begin{aligned}
 \sigma_j^{(j)} = & |\alpha| \left| 1 - (-1)^j \frac{\nu \sin \alpha \delta_j d}{\alpha \operatorname{sh} \nu \delta_j d} - \right. \\
 & \left. - 2\nu \frac{1 + (-1)^j}{\delta_j d} \left(\operatorname{cth} \nu \delta_j d - \frac{\cos \alpha \delta_j d}{\operatorname{sh} \nu \delta_j d} \right) \right|. \quad (21)
 \end{aligned}$$

Аналогичные значения получаются и для суммы модулей коэффициентов системы (19). Второе слагаемое в выражении (21) убывает с экспоненциальной быстротой и, начиная с некоторого j , σ_j , вследствие неравенства $|\alpha| < 1$, становится меньше 1. Заметим, что при $|\alpha| < \frac{2}{\sqrt{5}}$ суммы модулей коэффициентов систем (17) и (19) строго

меньше единицы для всех j и k и при любых отношениях $\frac{d}{b}$, т. е.

системы вполне регулярны. Свободные члены $p_j^{(j)}$ и $q_k^{(j)}$, как легко видеть из (18) и (20), ограничены в своей совокупности. Из теории бесконечных систем (3) следует единственность ограниченного решения систем (17) и (19) и сходимость методов последовательных приближений.

Рассмотрим далее случай $l = 2$. Умножим соотношения (16) на $\frac{2}{b} \cos \delta_j \tau d\tau$ и проинтегрируем от 0 до b . Поступая аналогично предыдущему, получаем

$$A_j^{(j)} = -2\alpha \delta_j \frac{\operatorname{ch} \nu \delta_j d - (-1)^j \cos \alpha \delta_j d}{d \operatorname{sh} \nu \delta_j d} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|1 + (-1)^{k+j}| (\delta_j^2 - \gamma_k^2) M_k^{(j)}}{(\gamma_k^2 + \delta_j^2)^2 - 4\alpha^2 \gamma_k^2 \delta_j^2} + q_j^{(j)}; \quad (22)$$

$$M_k^{(s)} = -2\alpha\gamma_k \frac{\operatorname{ch} \nu\gamma_k b - (-1)^s \cos \alpha\gamma_k b}{b \operatorname{sh} \nu\gamma_k b} \left\{ \frac{1 + (-1)^s}{2\gamma_k^2} A_0^{(s)} + \right. \\ \left. + \sum_{j=1}^n \frac{[1 + (-1)^{j+s}](\gamma_k^2 - \delta_j^2) A_j^{(s)}}{(\gamma_k^2 + \delta_j^2)^2 - 4\alpha^2\gamma_k^2 \delta_j^2} \right\} + \zeta_k^{(s)},$$

где введены следующие обозначения:

$$A_j^{(s)} = 2 \int_0^b [T_0^{(2)}(\eta) - (-1)^s T_1^{(2)}(\eta)] \cos \delta_j \eta d\eta;$$

$$M_k^{(s)} = \nu\gamma_k d [f_k^{(2)}(0) - (-1)^s f_k^{(2)}(b)] + 2\nu [T_0^{(2)}(0) - (-1)^s T_1^{(2)}(0) - \\ - (-1)^s (T_0^{(2)}(b) - (-1)^s T_1^{(2)}(b))];$$

$$q_j^{(s)} = \frac{2}{\operatorname{sh} \nu\delta_j d} \left\{ \frac{1}{\lambda} \int_0^b \int_0^d \omega_2(\xi, \eta) [\cos \delta_j (\eta + \alpha\xi) \operatorname{sh} \nu\delta_j (d - \xi) + \right. \\ \left. + (-1)^s \cos \delta_j (\eta - \alpha d + \alpha\xi) \operatorname{sh} \nu\delta_j \xi] d\xi d\eta + [\alpha \operatorname{sh} \nu\delta_j d + \right. \\ \left. + (-1)^s \nu \operatorname{sh} \alpha\delta_j d] \int_0^b [T_0^{(2)'}(\eta) - (-1)^s T_1^{(2)'}(\eta)] \cos \delta_j \eta d\eta + \nu [\operatorname{ch} \nu\delta_j d - \right. \\ \left. - (-1)^s \cos \alpha\delta_j d] \left[\int_0^b (T_0^{(2)'}(\eta) + (-1)^s T_1^{(2)'}(\eta)) \sin \delta_j \eta d\eta + \right. \quad (23) \\ \left. + \frac{\alpha}{\delta_j d} (1 + (-1)^s)(T_0^{(2)}(0) - T_1^{(2)}(0) - (-1)^s T_0^{(2)}(b) + (-1)^s T_1^{(2)}(b)) \right] \Big\};$$

$$\zeta_k^{(s)} = \frac{2}{\operatorname{sh} \nu\gamma_k b} \left\{ \frac{1}{\lambda} \int_0^b \int_0^d \omega_2(\xi, \eta) [\sin \gamma_k (\xi + \alpha\eta) \operatorname{ch} \nu\gamma_k (b - \eta) + \right. \\ \left. + (-1)^s \sin \gamma_k (\alpha b - \alpha\eta - \xi) \operatorname{ch} \nu\gamma_k \eta] d\xi d\eta + \int_0^b [T_0^{(2)'}(\eta) - (-1)^s T_1^{(2)'}(\eta)] \right. \\ \left. \times [\alpha \sin \alpha\gamma_k \eta \operatorname{ch} \nu\gamma_k (b - \eta) + \nu \cos \alpha\gamma_k \eta \operatorname{sh} \nu\gamma_k (b - \eta) + \right. \\ \left. + (-1)^s (\alpha \sin \alpha\gamma_k (b - \eta) \operatorname{ch} \nu\gamma_k \eta + \nu \cos \alpha\gamma_k (b - \eta) \operatorname{sh} \nu\gamma_k \eta)] d\eta \right\}.$$

Для $j = 0$ имеем:

$$A_0^{(1)} = 2 \int_0^b \left[\frac{1}{\lambda} \int_0^d \omega_2(\xi, \eta) d\xi + \alpha (T_0^{(2)'}(\eta) - T_1^{(2)'}(\eta)) \right] d\eta;$$

$$A_0^{(2)} = \frac{4\alpha}{\nu d^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 + (-1)^k}{\gamma_k^2} M_k^{(0)} + \frac{2}{d} \int_0^b \left[\frac{1}{\lambda} \int_0^d \omega_2(\xi, \eta) (d - 2\xi) d\xi - \right. \\ \left. - T_0^{(2)}(\eta) + T_1^{(2)}(\eta) \right] d\eta;$$

$$C_0 = \frac{1}{bd} \int_0^b \left[\frac{1}{\lambda} \int_0^d \omega_2(\xi, \eta) d\xi + 2\alpha (T_0^{(2)'}(\eta) - T_1^{(2)'}(\eta)) \right] \eta^2 d\eta + \quad (24)$$

$$+ \frac{1}{\lambda bd} \int_0^b \int_0^d \omega_2(\xi, \eta) \xi (d - \xi) d\xi d\eta + \frac{1}{b} \int_0^b [T_0^{(2)}(\eta) + T_1^{(2)}(\eta)] d\eta - \\ - \frac{2b}{d} [T_0^{(2)}(b) - T_1^{(2)}(b)] - \frac{2d}{2b} [T_0^{(2)}(0) - T_1^{(2)}(0) - T_0^{(2)}(b) + T_1^{(2)}(b)] - \\ - \frac{1}{bd} \left[\frac{A_0^{(0)} b^2}{6} + 2 \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^j A_j^{(0)}}{\delta_j^2} + \frac{\alpha}{\nu} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 + (-1)^k}{\gamma_k^2} M_k^{(0)} \right].$$

Таким образом, для определения $A_j^{(1)}$ и $M_k^{(1)}$ получили совокупность бесконечных систем линейных алгебраических уравнений (22) и (24). Исследование полученных уравнений показывает, что при $|z| \leq 0.9$ суммы модулей коэффициентов в каждом из уравнений (22), начиная от $k > 2; j > 2$, строго меньше единицы. Свободные члены $q_j^{(1)}$ и $\zeta_k^{(1)}$, как легко видеть из (23), оставаясь ограниченными в своей совокупности, стремятся к нулю с быстротой $O\left(\frac{1}{j}\right)$ и $O\left(\frac{1}{k}\right)$. Согласно теории бесконечных систем ⁽³⁾, совокупность систем (22) и (24) имеет единственное ограниченное решение, которое может быть получено методом последовательных приближений.

Институт математики и механики
Академии наук Армянской ССР

Բ. Ս. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Սրոշ կորագլիծ աստղածն մարմիններում ստացիոնար ջերմային դաշտի մասին

Հողվածում դիտարկվում է երկկապ կորագլիծ աստղածն կտրվածք ունեցող գլանային մարմիններում ջերմության հարթ կայունացած հոսանքի խնդիրը: Կորդինատական սիստեմի ձևափոխման շնորհիվ խնդիրը բերվում է շտրոմ-

վող փոփոխականներով (6) հավասարման լուծմանը: Լուծումը տրվում է ըստ
եռանկյունային և ցուցիչային ֆունկցիաների շարքերի միջոցով, որոնց ան-
հայտ գործակիցները որոշվում են գծային հանրահաշվական հավասարումների
լիովին սեղույլար անվերջ սիստեմներից:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- 1 Г. Гребер, С. Эрк и У. Григуля, Основы учения о теплообмене, М., ИЛ, 1958
- 2 Р. С. Минисян, ДАН Арм. ССР, т. XXIII, № 4, (1956) 3Л. В. Канторович и В. И. Крылов, Приближенные методы высшего анализа, Физматгиз, М.—Л., 1962