УДК 543.70

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Член-корреспондент АН Армянской ССР В. М. Тараян, Е. Н. Овсепян,
 А. А. Петросян

О составе бензойнокислого аниона уранила, образующего ионные
 ассоциаты с некоторыми основными красителями

(Представлено 12/VI 1971)

Для определения микрограммовых количества урана (VI) применяются экстракционно-фотометрические и экстракционно-флуориметрические методы. Оба метода основаны на экстракции ионных ассоциатов, образующихся при взаимодействии ацидокомплексов урана (VI) с катионами различных основных красителей (¹⁻⁷). В преобладающем большинстве случаев, получение реакционноспособного анионного комплекса урана (VI) осуществляется с использованием в качестве ацидосоставляющей бензоат-аниона (^{1, 2, 5-7}).

В образующихся многокомпонентных соединениях, как правило, экспериментально определяются только мольные отношения урана (VI) к катиону основного красителя. Что же касается состава бензойнокислого аниона урана (VI), то соответствующие, подтвержденные опытом данные в литературе, отсутствуют и упомянутому аниону предположительно приписывают формулу $[UO_2(C_6H_5COO)_3]^-$.

Данная статья имеет целью определить отношение компонентов в вышеупомянутом анионном комплексе урана (VI). Ранее при исследовании взаимодействия основных красителей тиазинового ряда: диметилтионина, триметилтионина, тетраметилтионина, нитропроизводного тетраметилтионина (метиленового зеленого) и толудинового голубого, а также акридинового оранжевого с бензойнокислым анионом урана (VI) было установлено, что извлечение образующихся ионных ассоциатов имеет место в интервале кислотности pH 3,8—5,6.

В указанной области кислотности катионы всех исследованных нами основных красителей однозарядны, а их мольное отношение к бензойнокислому аниону урана (VI) во всех рассмотренных случаях равно 1:1. Следовательно суммарный заряд анионного комплекса урана (VI), также должен быть равен единице. На этом основании можно было предположить, что уранил-ион (UO_2^{2+}) взаимодействует с бензоат-анионом в мольном отношении 1:3, с образованием однозарядного бензойнокис-

лого аниона состава $[\text{UO}_2(\text{C}_6\text{H}_5\text{COO})_2]^-$. Для экспериментального подтверждения этого предположения молярное отношение катиона уранила и бензоат-аниону в экстрагирующихся соединениях было установлено двумя общезвестными спектрофотометрическими методами: методом сдвига равновесия и методом прямой Асмуса. Графики были построены при постоянной концентрации уранил-иона, оптимальной кислотности и концентрации реагента-красителя. Переменной величиной являлась концентрация бензоата.

В первом случае были использованы результаты определения зависимости экстракции от концентрации бензоат-аниона. Полученные данные были проанализированы методом, аналогичным методу сдвига равновесия. В логарифмических координатах зависимость образования исследуемых соединений от концентрации бензоата носит линейный характер и тангенс угла наклона прямой близок к двум (рис. 1).

Рис. 1. Определение молярного отношения уранил-иона к бензоат-аниону в ионных ассоциатах с катионами красителей: а) $\circ$ — $\circ$ — $\circ$ —диметилглиоксимом, $\odot$ — $\odot$ — $\odot$ —триметилтинном, $\square$ — $\square$ — $\square$ —тетраметилтинном, $\circ$ — $\circ$ —метиленовым зеленым, — — — — акридиновым оранжевым NO; б) $\triangle$ — $\triangle$ — $\triangle$ —толуидиновым голубым, методом сдвига равновесия ($[\text{UO}_2^{2+}] = 3,7 \cdot 10^{-5} \text{ M}$, $l = 10 \text{ см}$)

Кривые зависимости $\frac{1}{V_R^n} = f\left(\frac{1}{m_{\text{H}_2\text{O}}}\right)$, построенные по опытным данным для значений $n=1,2$ и нанесенные на рис. 2, показывают, что только $n=2$ удовлетворяет требованию прямолинейности.

Таким образом, данные, полученные спектрофотометрическими методами, однозначно указывают на то, что уранил-ион во всех рассмотренных нами случаях взаимодействует с бензоат-анионом в молярном отношении 1:2, и тем самым было опровергнуто первое из принятых пред-

положений о составе бензойнокислого анионного комплекса урана (VI).

Исходный раствор уранила был получен растворением трехоксида урана в соляной кислоте. Поэтому возникло второе, на наш взгляд более

Рис. 2. Определение мольного отношения уранил-иона к бензоат-иону в ионных ассоциатах с катионами красителей: а) х—х—х—диметилтионином; $\odot$ — $\odot$ — $\odot$ —триметилтионином; п—п—п—тетраметилтионином; о—о—о—метилновым зеленым; Δ — Δ — Δ —толундиновым голубым; б) — — — — акридинным оранжевым NO, методом прямой линии Асмуса ($[UO_2^{2+}] = 3.7 \cdot 10^{-6}$ М, $b = 10$ мм)

вероятное предположение, что с бензоат-анионом взаимодействует не двузарядный катион уранила (UO_2^{2+}), а описанный в литературе его хлоридный однозарядный катионный комплекс $[UO_2Cl]^+$ (8) и при этом в мольном отношении 1:2, т. е., что состав образующегося однозарядного анионного комплекса уранила с бензоат-анионом можно выразить формулой: $[UO_2Cl(C_6H_5COO)_2]^-$.

В этой связи были исследованы инфракрасные спектры одного из исследованных нами многокомпонентных соединений, специально синтезированных в макроколичестве, а именно инфракрасные спектры системы: уран (VI)—бензоат—тетраметилтионин. Сопоставление инфракрасных спектров хлорида тетраметилтионина, бензоата натрия и соответствующего их соединения с уранилом показало, что последний спектр в отличие от спектров первых двух компонентов имеет четко выраженное поглощение в области 720 см^{-1} , свидетельствующее о наличии хлора в образующемся сложном органическом соединении (рис. 3).

Из всего вышесказанного следует, что в образовании экстрагируемого в органическую фазу ионного ассоциата тетраметилтионина, принимает участие однозарядный и трехкомпонентный анионный комплекс уранила состава: $[UO_2Cl(C_6H_5COO)_2]^-$.

Установленные в отношении к системе: уранил-бензоат-тетраметил-тионин обстоятельства, касающиеся состава бензойнокислого аниона уранила, могут быть распространены и на остальные исследованные нами

Рис. 3. Инфракрасные спектры: 1 — бензоата натрия; 2 — хлорида тетраметилтионина; 3 — ионного ассоциата бензойнокислого аниона урана (VI) с катионом тетраметилтионина

системы с той только разницей, что в образующихся ионных ассоциатах будет подвергаться изменению только лишь природа однозарядного катиона реагента-красителя.

Ереванский государственный университет

Հայկական ՍՍՀ ԿԱ րդրակից-անդամ Վ. Մ. ՔԱՌԱՅԱՆ, Ե. Ն. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Ա. Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Մի քանի հիմնային ներկանյութերի նեո խոնային ասոցիատներ առաջացնող ուրանիլի բենզոյաթթվական անիոնի բաղադրության մասին

Ուսումնասիրված է մի քանի հիմնային ներկանյութերի՝ դիմեթիլթիոնինի, տրիմեթիլթիոնինի, տետրամեթիլթիոնինի, տետրամեթիլթիոնինի նիտրոածանցյալի (մեթիլենային կանաչի), տոլուիդինային կապույտի և ակրիդինային նարինջ NO-ի հետ իոնային ասոցիատներ առաջացնող ուրանիլի բենզոյաթթվական անիոնի բաղադրությունը՝ Երկու սպեկտրոֆոտոմետրական եղանակներով (հալասարակչության տեղաշարժի եղանակ, ուղիղ գծի եղանակ) հաստատված է հետազոտվող կոմպլեքսային անիոնի մեջ ուրանիլի և բենզոյատի մոլային հարաբերությունը, որը հալասար է 1:2:

Ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիայի եղանակով հաստատված է, որ հետազոտվող անիոնի բաղադրության մեջ մտնում է նաև քլորը, որի հետևանքով ձևանում է ուրանիլի ուսկցիոնունակ միալիցք երկոմպոնենտ անիոնը $[\text{UO}_2\text{Cl}(\text{C}_6\text{H}_5\text{COO})_2]^-$.

ЛИТЕРАТУРА — ҒРЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ

- ¹ F. da Silva, L. de Moura, *Tecnica*, 33, № 285, 5—12 (1958) (РЖХ, 31012 (1959)).
² N. R. Andersen, D. M. Hercules, *Analyt. chem.*, 36, 2138 (1964).
³ Л. М. Буртменко, Н. С. Полуэктов, *ЖАХ*, 23, 700 (1968).
⁴ Л. М. Буртменко, Н. С. Полуэктов, Л. И. Кононенко, *ЖАХ*, 23, 1647 (1968).
⁵ П. Н. Коваленко, Г. Г. Щемелева, Л. С. Соколова, *ЖАХ*, 22, 1815 (1967).
⁶ H. N. Mønsken, Neste W. A. H. van, *Analyt. chim. acta.*, 37, 480—483 (1967).
⁷ Л. С. Соколова, П. Н. Коваленко, Г. Г. Щемелева, *Изв. высш. уч. зав. Химия и хим. технология*, 12, № 7, 875—877 (1969).
⁸ R. A. Day, R. M. Powers, *J. Am. Chem. Soc.*, 76, 3895 (1954).