МАТЕМАТИКА

А. А. Азатян

Об одном классе комбинаторных объектов

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Ф. Т. Саркисяном 15/V 1973)

1. Определения. Из целочисленных положительных функций $l(h, i)$, $l(h+1, i), \dots, l(h+m-1, i)$, $p(h, i)$, $p(h+1, i), \dots, p(h+m-1, i)$ составим таблицы $|l(h, i)p(h, i)l(h+1, i)p(h+1, i) \dots l(h+m-1, i)p(h+m-1, i)|$, где: $i=1, 2, \dots, n$; $h=1, 2, \dots, t$; $m=f(h)$; m, n и h — целые, положительные. Назовем эти таблицы „ m -таблицами“ и обозначим через (h, m) (1-таблицу назовем „таблицей“). „Местами m -таблицы“ назовем h -ые аргументы, „местами строки элемента в m -таблице“ — i -ые аргументы. Функции $l(h, i)$, $l(h+1, i), \dots$ и $p(h, i)$, $p(h+1, i), \dots$ назовем соответственно „левоместными“ и „правоместными“ элементами. За положительные направления следования элементов, строк, столбцов и таблиц примем следующие: а) внутри таблиц, по столбцам — слева-направо; по строкам — сверху-вниз (от $i=1$ до $i=n$); б) по таблицам — по циклу (от $h=1$ через $h=t$ до $h=1$).

Под „ s -элементом“ будем подразумевать такую s -выборку из s элементов, принадлежащих различным столбцам, в которой порядок следования элементов совпадает с порядком следования соответствующих столбцов. Каждому s -элементу сопоставим некоторое число S , используя следующее правило: наименьший разряд числового значения $(k-1)$ -ого элемента ($k=1, 2, \dots, s$) на единицу больше наибольшего разряда числового значения k -ого элемента. Два s -элемента с одинаковым числовым значением S при различных аргументах будем называть „равночисленными“ и „разноместными“ и, поэтому, „различными“. Любые совокупности из одинакового числа равночисленных элементов будем считать „одинаковыми по составу“.

Рассмотрим m столбцов $L_1, L_2, \dots, L_m$ левоместных и m столбцов $P_1, P_2, \dots, P_m$ правоместных элементов из некоторой таблицы (h, m) . Каждый элемент из L_1 сопоставим с некоторым элементом из P_1 ; каждый, образованный из сопоставления, 2-элемент сопоставим с некоторым элементом из $L_2, \dots$, наконец, каждый $(2m-1)$ -элемент сопоставим с одним из элементов из P_m . Полученное множество из $2m$ -элементов назовем „ассоциацией“ h -ой m -таблицы и обозначим

через U_h^m . „Левоместным“ и „правоместным“ m -столбцами некоторой m -таблицы назовем первую и вторую из пары совокупностей столбцов, составленных из первой и второй m -ки столбцов соответственно. Множество всех различных по составу $2m$ -элементов ассоциаций таблицы (h, m) назовем „полным множеством ассоциаций“ h -ой m -таблицы и обозначим через $\{U_h^m\}$ (при $m=1$ индекс „ m “ и индекс „ h “ (за ненадобностью будут опускаться).

Разбивая некоторое множество $\{n\}$ на подмножества $\{n_1\}, \{n_2\}, \dots, \{n_v\}$ ($v=1, 2, \dots, v; n=n_1+n_2+\dots+n_v; |\{n_v\}|=n_v$) по всем равночисленным элементам, назовем эти подмножества „группами равночисленности“. Две группы равночисленности, принадлежащие двум различным по составу совокупностям элементов, назовем „одноименными“, если элементы одной группы равночисленны с элементами другой. „Распределением“ множества $\{n\}$ назовем последовательность $(n; n_1, n_2, \dots, n_v)$. „Распределением m -таблицы“ назовем совокупность всех распределений столбцов $(l_1; l_{11}, l_{21}, \dots, l_{v1}), (p_1, p_{11}, p_{21}, \dots, p_{w1}), \dots, (p_m; p_{1m}, p_{2m}, \dots, p_{wm})$ m -таблицы, где при $k=1, 2, \dots, m; v=1, 2, \dots, v; w=1, 2, \dots, w; v=\varphi(k); w=\psi(k)$.

Пусть t m_h -таблиц, занумерованы в порядке возрастания h ($h=1, 2, \dots, t; m_h=f(h)$). Пусть каждое множество элементов, составляющих $2m_h$ -ый столбец каждой h -ой m -таблицы полностью (либо частично) перекрывается с каждым множеством элементов, составляющих первый столбец каждой $(h+1)$ -ой m -таблицы. Используя t -последовательность m -таблиц, составим, некоторую t -последовательность ассоциаций m -таблиц. Выбирая из каждого $\{U_h^m\}$ по одной ассоциации и располагая их в порядке возрастания h . Под „ t -контакт-элементом“ будем подразумевать всякий r -элемент ($r=m_1+m_2+\dots+m_t$), составленный путем последовательной выборки из построенной t -последовательности ассоциаций $2m$ -элементов, при условии, что каждая пара, состоящая из $2m$ -ого элемента U_h^m и первого элемента U_{h+1}^m — пара равночисленных элементов. (При $t=2, f(1)=f(2)=1$ и $r=2$ имеем 2-контакт-элемент, называемый далее просто „контакт-элементом“). Под „ t -кольцом“ будем понимать $(t+1)$ -контакт-элемент, в котором $(t+1)$ -ый $2m$ -элемент и первый $2m$ -элемент равночисленны и равноместны (т. е. представляют один и тот же $2m$ -элемент). Каждой из t -последовательностей ассоциаций, соответствует своя „ассоциация t -контакта“ K^t , представляющая множество всех различных t -контакт-элементов, могущих быть образованными из данной t -последовательности. Множество всех различных ассоциаций K^t , составленное из всех различных t -последовательностей ассоциаций m -таблиц, назовем „полным множеством ассоциаций t -контакта“ и обозначим через $\{K^t\}$. В частности, при выполнении условия существования t -кольца будем иметь „ассоциации t -кольца“ R^t и их „полные множества“ $\{R^t\}$. (При $t=2, f(1)=f(2)=1$ будем иметь „ассоциации контакта“ K и полное множество $\{K\}$).

Пример 1. Даны функции $l(h, i)$ и $p(h, i)$ ($1 \leq h \leq 2, 1 \leq i \leq 4$), поведение которых определяется из таблиц (1, 1) и (2, 1)

(1,1)
1 5
2 6
2 7
3 7

(2,1)
5 1
6 1
6 2
7 3

2-элементами таблицы (1,1) и (2,1) соответственно являются: 15, 16, 17, 25, 26, 27, 35, 36, 37 и 51, 53, 61, 62, 63, 71, 72, 73. Полное множество ассоциаций таблицы (1,1) состоит из следующих ассоциаций:

1 5	1 5	1 6	1 7	1 7	1 6	1 7
2 6	2 7	2 5	2 5	2 7	2 7	2 7
2 7	2 7	2 7	2 6	2 6	2 7	2 5
3 7	3 6	3 7	3 7	3 5	3 5	3 6

4-элементы: 1551, 1661, 2552, 3773, ... являются контакт-элементами, составленными из различных ассоциаций таблиц (1,1) и (2,1). Приведем некоторые из ассоциаций контакта, порождаемых различными ассоциациями $U_1 \in \{U_1\}$ и $U_2 \in \{U_2\}$:

1 5 5 1	1 6 6 1	2 6 6 2
2 6 6 1	2 5 5 1	2 7 7 3
2 7 7 3	3 7 7 3	3 5 5 1

а также некоторые ассоциации кольца:

1 5 5 1 1 5	1 6 6 1 1 6	1 7 7 1 1 7
2 6 6 2 2 6	2 7 7 2 2 7	2 5 5 2 2 5
3 7 7 3 3 7	3 5 5 3 3 5	3 6 6 3 3 6

Распределения всех столбцов в таблицах идентичны: (4; 2, 1, 1). Мощности полных множеств ассоциаций таблиц (1,1) и (2,1) ввиду одинаковых распределений таблиц одинаковы: $|\{U_1\}| = |\{U_2\}| = 7$.

2. Каждую ассоциацию из $\{U_h\}$ сопоставим с одной из ассоциаций из $\{U_{h+1}\}$ и рассмотрим полученные совокупности как 2-таблицы, левоместный и правоместный 2-столбцы которой суть ассоциации из $\{U_h\}$ и $\{U_{h+1}\}$ соответственно. Обозначим каждую из этих совокупностей через $U_{\zeta_h} U_{\zeta_{h+1}}$, а множество всех возможных таких сопоставлений через $\{U_h U_{h+1}\}$. Очевидно, $|\{U_h U_{h+1}\}| = |\{U_h\}| \cdot |\{U_{h+1}\}|$. Каждый элемент из $\{U_h U_{h+1}\}$ порождает свое полное множество ассоциаций 2-таблицы; Обозначим эти ассоциации через $U_{\zeta_h \zeta_{h+1}}^2$, а их полное множество через $\{U_{\zeta_h \zeta_{h+1}}^2\}$. Полное множество всех полных множеств $\{U_{\zeta_h \zeta_{h+1}}^2\}$ ($\zeta_h = 1, 2, \dots, |\{U_h\}|$ и $\zeta_{h+1} = 1, 2, \dots, |\{U_{h+1}\}|$), порождаемых из всех элементов $\{U_h U_{h+1}\}$, обозначим через $\{U_{h,h+1}^2\}$. Очевидно,

$$||\{U_{h,h+1}^2\}\| = \sum_{u=1}^{u=|\{U_h U_{h+1}\}|} |u| |U_{\zeta_h \zeta_{h+1}}^2| \quad (2.1)$$

Всякие ζ_h -ую и ζ_{h+1} -ую ассоциации, составляющие некоторый элемент из $\{U_h U_{h+1}\}$, разобьем соответственно на подмножества по всем группам равночисленности правоместного столбца U_{ζ_h} и левоместного столбца $U_{\zeta_{h+1}}$, называя эти разбиения „ ω -ыми подассоциациями U_{ζ_h} “ и „ ν -ми подассоциациями $U_{\zeta_{h+1}}$ “. Если множества элементов правоместного столбца U_{ζ_h} и левоместного столбца $U_{\zeta_{h+1}}$ частично (или полностью) перекрывающиеся, то в каждом элементе из $\{U_h U_{h+1}\}$ можно выделить некоторую группу, характеризующуюся следующим свойством: правоместные элементы всякой ω -ой подассоциации U_{ζ_h} , входящей в группу, равночисленны с левоместными элементами одной из ν -ых подассоциаций $U_{\zeta_{h+1}}$, входящей в группу. Обозначим каждую такую группу через $\{U_{h,\zeta,x}^2\}$, где: $\{U_{h,\zeta,x}^2\} \in U_{\zeta_h \zeta_{h+1}}$, $|\{U_{h,\zeta,x}^2\}| = x$, x — число одноименных групп равночисленности из правоместного столбца таблицы $(h, 1)$ и левоместного столбца таблицы $(h+1, 1)$; так что каждое из множеств $\{U_{h,\zeta,x}^2\}$ разбивается на x подгрупп, различающихся по составу 4-элементов в зависимости от выбранной пары ассоциаций из $\{U_h\}$ и $\{U_{h+1}\}$; при этом в каждой x -ой подгруппе ($x=1, 2, \dots, x$) число 2-элементов левоместного 2-столбца не обязательно равно числу 2-элементов правоместного 2-столбца, составляющих подгруппу. Дополняя (при необходимости) в каждой x -ой подгруппе число недостающих 2-элементов левоместного (либо правоместного) 2-столбца 2-элементами, составленными из любых элементов, неравночисленных с элементами из $(h, 1)$ и $(h+1, 1)$, каждую вновь построенную совокупность можно рассматривать как x -ую таблицу $(\zeta_{h,h+1}, 1)_x$ ($\zeta_{h,h+1}=1, 2, \dots, |\{U_h U_{h+1}\}|$), если пренебречь при этом всеми правоместными элементами левоместного и левоместными элементами правоместного 2-столбцов x -ой подгруппы. Обозначая через $U_{h,\zeta,x}$ и $\{U_{q,\zeta,x}\}$ соответственно ассоциации и полные множества ассоциаций каждой таблицы $(\zeta_{h,h+1}, 1)_x$, можно теперь записать:

$$||K_h|| = \sum_{\zeta_{h,h+1}=1}^{\zeta_{h,h+1}=|\{U_h U_{h+1}\}|} \frac{1}{|\zeta_{h,h+1}|} \cdot \sum_{x=1}^{x=|\{U_{h,\zeta,x}^2\}|} \frac{1}{x} ||U_{h,\zeta,x}^2||. \quad (2.2)$$

С некоторым не принципиальным усложнением определений п. 1 соотношения (2.1), (2.2) легко распространятся на более общие случаи ($m > 1$, $t > 2$), что опущено ради краткости.

Для некоторого $n(n=l=p)$ рассмотрим множества всех различных k -ых и q -ых распределений $(l; l_{1k} l_{2k} \dots l_{vk})$ ($p; p_{1q} p_{2q} \dots p_{wq}$), где $v = \varphi(k)$, $w = \psi(q)$, сопоставляя им соответствующие произведения: $a_k = (l_{1k}!) \cdot (l_{2k}!) \cdot \dots \cdot (l_{vk}!)$ и $b_q = (p_{1q}!) \cdot (p_{2q}!) \cdot \dots \cdot (p_{wq}!)$. Обозначая через $\{U\}_{n,k,q}$ полные множества ассоциаций таблиц с числом строк n при некоторых k -ом и q -ом распределениях столбцов и при-

нимая $|\{U\}_{n,k,q}| = F_n(a_k, b_q)$, заметим, что для $n=2, 3, 4, 5, 6$ имеет место:

$$\begin{aligned} (a_1 > a_2 > \dots) &\leftrightarrow (F_n(a_1, b_q) \leq F_n(a_2, b_q) \leq \dots) \text{ при всех } q \text{ — фиксированных;} \\ (b_1 > b_2 > \dots) &\leftrightarrow (F_n(a_k, b_1) \leq F_n(a_k, b_2) \leq \dots) \text{ при всех } k \text{ — фиксированных.} \end{aligned} \quad (2.3)$$

Пример 2. На схеме 1 приводятся соответствующие (2.3) таблицы зависимостей $|\{U\}_{n,k,q}| = F_n(a_k, b_q)$ для $n=3, 4, 5$. Представляет интерес изучение различных структурных и комбинаторных свойств

$F_3(a_k, b_q)$				$F_4(a_k, b_q)$						$F_5(a_k, b_q)$							
				a_k						a_k							
				24	6	4	2	1	120	24	12	6	4	2	1		
6	2	1		24	6	4	2	1	120	24	12	6	4	2	1		
6	1	1	1	6	1	2	2	3	4	120	1	1	1	1	1	1	
2	1	2	3	4	1	2	3	4	6	24	1	2	2	3	3	4	5
1	1	3	6	2	1	3	4	7	12	12	1	2	3	4	5	7	10
				1	1	4	6	12	24	6	1	3	4	7	8	13	20
										4	1	3	5	8	11	19	30
										2	1	4	7	13	18	33	60
										1	1	5	10	20	30	60	120

Схема 1. $|\{U\}_{n,k,q}| = F_n(a_k, b_q)$; $n=3, 4, 5$.

множеств $\{U^m\}$, $\{K^t\}$ и $\{R^t\}$, и в связи с этим, разработка эффективных методов перечисления их элементов с заданием соответствующих списков этих элементов. Из вышеприведенного, в частности из (2.1) и (2.2), легко видеть, что эти задачи сводятся в первую очередь к проблеме конструктивного перечисления элементов простейших из таких объектов—элементов $\{U\}$. Для полноты рассмотрения можно было бы не ограничиться описанием двумерных структур, но также ввести определения, описывающие многомерные структуры, а также объекты, в которых „контактирующими“ могли бы оказаться элементы одной и той же m -таблицы и др; однако ради краткости мы только указываем на них, отмечая, что изучение таких объектов также сводится к проблеме перечисления элементов $\{U\}$. Необходимость в разработке указанных проблем становится ясной, в частности, из наличия широкого класса прикладных комбинаторных задач („транспортные задачи с ограничениями“, „задачи о назначениях“ и др) ⁽¹⁻⁶⁾, описываемых рассмотренными объектами. Приведем некоторые из них. Задача 1. Дана некоторая m -таблица с определенным распределением. Требуется составить список всех ассоциаций из $\{U^m\}$ и вычислить $|\{U^m\}|$.

Задача 2. Дана некоторая t -последовательность m -таблиц. Требуется определить состав $\{K^t\}$ ($\{R^t\}$) и вычислить $|\{K^t\}|$ ($|\{R^t\}|$).

В частном случае, когда по условию задачи требуется выбирать только по одной ассоциации каждой из t m -таблиц, то очевидно, что число этапов решения задачи сокращается, хотя, как это видно из (2.2)

проблематичным остается вновь вопрос перечисления элементов $\{U_{q,c,x}\}$.

Рассмотрим одну из интерпретаций такой задачи.

Задача „о сборке“. Имеется t различных наименований деталей по n деталей каждого наименования. Выбирая по одной детали каждого наименования можно собрать некоторый агрегат; который считается изготовленным тогда, когда детали соединены по циклу: I, II, . . . t -ая, I; при этом „конец“ I детали соединяется с „началом“ II детали, „конец“ II—с „началом“ III . . . „конец“ t -ой—с „началом“ I. Известно, однако, что определенные „концы“ могут быть соединены лишь с определенными „началами“, а для некоторых „концов“ не имеется соответствующих „начал“. Требуется определить число различных вариантов сборки агрегатов и соответствующее каждому варианту число агрегатов.

В других случаях в задаче описывается такая ситуация, когда известны только m -таблицы, но неизвестно какие ассоциации из каждой m -таблицы могут участвовать в образовании множеств $\{K^t\}$ или $\{R^t\}$. Например, в следующей задаче.

З а д а ч а 3. Дана t -последовательность ($h=1, 2, \dots, t$) m -таблиц. Определить вероятности образования каждой из R^t .

Заметим, что проблема перечисления элементов $\{U\}$, имеющая решение в каждом частном случае с помощью различных методов комбинаторного анализа [1, 2, 7], принципиально неразрешима в общем виде, т. е. для как угодно свободного поведения функций $l(h, i)$, $l(h+1, i) \dots p(h, i)$, $q(h+1, i) \dots$ над массивами (h, i) , $(h+1, i)$, . . . Однако, как с точки зрения решения конкретных задач, так и в общетеоретическом аспекте, чем свободнее поведение этих функций над соответствующими массивами, тем больший интерес представляет изучение указанных объектов. Называя класс комбинаторных объектов $\{U^m\}$, $\{K^t\}$ и $\{R^t\}$ и класс задач, описываемых этими объектами соответственно „ассоциативными классами“ комбинаторных объектов и задач, заметим, что в настоящее время назрела необходимость рассмотрения решений этих задач с единой точки зрения; и в связи с расширением возможностей применения электронно-вычислительной техники сейчас возможна практическая реализация табулирования зависимостей списочных структур—элементов $\{U^m\}$, $\{K^t\}$, $\{R^t\}$ и т. д. и их мощностей от распределений соответствующих m -таблиц, либо от a_k b_q (см. пример 2). Наличие таких списков привело бы, с одной стороны, к стандартизации и типизации задач ассоциативного класса, к введению общих критериев оценки сложности данных задач и т. д., с другой стороны, открыло бы возможности для дальнейших теоретических исследований. В отдельной работе будет рассмотрен один из общих методов генерирования элементов $\{U\}$ с помощью моделирования программы перечисления элементов на ЭВМ.

Автор выражает признательность К. А. Рыбникову, Г. П. Егорычеву и А. Д. Лумпову, за внимательное обсуждение, а также Ф. В. Широкову за постановку задачи „о сборке“.

Միացությունների տեսությանը պատկանող օբյեկտների մի դաս

Սահմանվում է միացությունների տեսությանը պատկանող «զուգորդումներ» (կամ «ասոցիացիաներ») անվանված օբյեկտների մի դաս: Ցույց է տրրվում, որ ամենատարբեր զուգորդումների ուսումնասիրության խնդիրը կախված է ամենահասարակ զուգորդումների՝ « $\{U\}$ -բազմությունների» էրեմենտների կոնստրուկտիվ թվարկման հնարավորությունից: Բերվում են զուգորդումների միջոցով նկարագրվող խնդիրների օրինակներ: Առաջ է քաշվում և հիմնավորվում զուգորդումների և նրանց լրիվ բազմությունների հզորությունների աղյուսակավորման պրոբլեմը:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

¹ К. А. Рыбников, Введение в комбинаторный анализ, Изд. Московского университета, М., 1972. ² М. Холл, Комбинаторика, пер. с англ., «Мир», М., 1970. ³ М. Холл, Блок-схемы. Сб. «Прикладная комбинаторная математика», 203—241, «Мир», М., 1968. ⁴ В. Н. Бурков, С. Е. Ловецкий, «Известия АН СССР», Техническая кибернетика, № 4, 82—93, 1968. ⁵ А. А. Корбут и Ю. Ю. Финкельштейн, Дискретное программирование, «Наука», М., 1969. ⁶ Дж. Кемени и Дж. Снелл, Конечные цепи Маркова, пер. с англ., «Наука», М., 1970. ⁷ Дж. Риордан, Введение в комбинаторный анализ., ИЛ., М., 1963.