

УДК 595.754

ЭНТОМОЛОГИЯ

Э. Г. Акрамовская, В. Б. Голуб

Новый вид кружевницы рода *Catoplatas* Spinola (Heteroptera, Tingidae) из Армении.

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Э. А. Давтяном 23/1 1973)

Экземпляры данного вида были выделены для описания еще покойным А. Н. Кириченко. При описании этого вида мы сохранили название *C. brevicornis*, которое он дал ему.

Catoplatas brevicornis Akramowskaja et Golub, sp. nov.

Плоский, продолговато-овальный. Голова, усики, диск переднеспинки и ее передний отросток, иногда также и ноги в тонком, белом налете, который может иногда быть почти невыраженным.

Голова и усики черные. Хоботковые пластинки в нижней половине желтые. Лобные шипики короткие, тупые, параллельные, горизонтальные.

В основании слегка расставленных 1-х члеников усиков четко виден короткий клипеус. 2—4-й членики усиков в коротких прилегающих волосках. 1-й членик усиков цилиндрический, 2-й обратно-конический, 3-й длинный цилиндрический, его вершина обрублена слегка косо, 4-й членик не толще 3-го, постепенно утончающийся к основанию и вершине. Соотношение длин члеников усиков у ♂ от 1:1:3:1,7 до 1,1:1,1:3,1:1,8, у ♀ от 1:1:2,8:1,7 до 1,1:1,1:3,1:1,8. Отношение длины 3-го членика усиков к ширине головы 0,85—0,95.

Ширина переднеспинки в 3—3,1 раза меньше длины тела. Передний отросток переднеспинки и ее диск черные, либо диск посередине бурый. Боковые края переднеспинки слабо выемчатые, с 1 рядом ячеек (смотреть сбоку), загнуты кверху, прижаты к диску неплотно, так что в передней половине при рассматривании сверху видны ячейки бокового края. Все 3 кия заметны по всей длине переднеспинки, боковые—кзади слегка расходящиеся. Задний отросток переднеспинки желтый. Грудь и ноги черные, но голени на вершине часто слегка светлее, так же как и лапки, особенно их 1-й членик. Бедра и голени в редких, коротких светлых уплощенных волосках, которые на бедрах могут быть почти невыраженными. Голени к вершине слегка утончаются.

Полнокрылая форма. Надкрылья желтые. Боковые края по всей

длине с 1 рядом ячеек или у вершины, а иногда также и у основания, с 2 рядами. Боковое поле с 3—4, срединное с 6—7 неправильными рядами ячеек. Брюшко черное.

Длина тела 3—3,3 мм. Ширина 1,45—1,5 мм.

Голотип: ♂ Армения, Бюракан (1435 м над ур. м.) 15/VII 1946 г., А. Рихтер, Тер-Минасян. Находится в Зоологическом институте Академии наук СССР в Ленинграде.

Паратипы: В Зоологическом институте Академии наук Армянской ССР в Ереване: Армения, Азизбековский район, окрестности Заритана, 5/VI 1958 г., Акрамовская, ♂ В Зоологическом институте Академии наук СССР в Ленинграде: Армения, Сисиан, 22/VI 1957 г., В. Рихтер, ♂; Армения, Горис, 18—19/IX 1956 г., Тряпицын, ♂; Армения, каньон р. Воротан, 10/IX 1956 г., Тряпицын, ♀; Армения, Брнакот, 20/VI 1957 г., В. Рихтер, ♀; Армения, Шаки, Сисианский р-н, 2/V 1957 г., Тряпицын, ♀; Турция, Меджингерт, 2♀.

Наиболее близок к *C. carthusianus* Goeze и *C. nigriceps* Horv. Отличается от них одним рядом ячеек бокового края переднеспинки.



Рис. 1 *Catoplatus brevicornis* Akramowskaja et Golub sp. nov.



Рис. 2. Боковой край переднеспинки у того же вида с одним рядом ячеек

неплотно прижатыми боковыми краями переднеспинки с заметными сверху ячейками в передней их половине, меньшими размерами (у *C. carthusianus* Goeze и *C. nigriceps* Horv. длина тела 3,9—4,5 мм). Кроме того, *C. brevicornis* и *C. carthusianus* различаются еще по следующим признакам: отношение длины 3-го членика усиков к ширине головы у *C. brevicornis* 0,85—0,95, у *C. carthusianus* 1,13—1,37; передний отросток и диск переднеспинки у *C. brevicornis* черные или же диск посередине бурый, у *C. carthusianus* передний отросток и диск переднеспинки бурые или желтые, за исключением 2-х черных пятен кнаружи от места слияния боковых килей с передним отростком:

ширина переднеспинки у *C. brevicornis* в 3 — 3,1 раза меньше длины тела, у *C. carthusianus* в 3,4 — 3,5 раза.

От *C. nigriceps* отличается также значительно менее выпуклым диском переднеспинки.

Зоологический институт

Академии наук Армянской ССР

Зоологический институт

Академии наук СССР

Է. Գ. ԱԿՐԱՍՈՎՈՎԱՅԱ, Վ. Բ. ԳՈՂՈՒՐ

Catoplatus Spinola սեռի նոր տեսակ Հայաստանից (Heteroptera, Tingidae)

Հոգնվածում նկարագրված է *Catoplatus brevicornis* Akramowskaja et Golub նոր տեսակը, որը գտնված է Հայաստանում՝ Աղիպրեկովի շրջանում՝ Զատիժափի շրջակայքում, Սիսիանի, Գորիսի շրջակայքում, Որոտան գետի կիրճում, Բանակոթի շրջակայքում և Խարքիայում՝ Մեջինդերտում: Տրված է նախնական տեսակի հատկանիշները, որով նա տարբերվում է իրեն մոտիկ տեսակից՝ *C. carthusianus*-ից: