

УДК 595.765.4

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хизорян

Новый род и вид жесткокрылых—шелкунов из Армении  
(Coleoptera, Elateridae)

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Э. А. Давтяном 30/XI 1973)

Род *Nalrus* Jablokoff-Khizorian gen. nov.

Лоб спереди слегка вдавлен, с прямолинейными боковыми килями, достигающими срединной четверти его переднего края, который окантован и слегка нависает над маленьким отвесным наличником. Усики ♂ пиловидные с 4-го членика, их 2-й и 3-й членики маленькие и сходные. Переднеспинка трапецевидная, с цельной боковой каймой, расположенной латерально до передних углов, под которыми загибается. Задние углы имеют форму узкого отростка, внутри отграниченного вырезкой переднегруди, с длинным килем. Диск в густой волосистости, зачесанной назад. Щиток удлиненно 4-угольный, с боков прилегает к краям надкрылий, спереди вдавленный. Надкрылья длинные, с правильными рядами точек, густо точечные и волосистые, их эпиплевры очень короткие, постепенно сужены кзади. Переднегрудь с коротким воротничком, отогнутым вниз и не прикрывающим основание головы, несущим 2 боковых зубчика, под ними с вогнутым боковым краем, ее выступ прямолинейный, пригнут к телу, без вершинного сужения (рис. 1,б). Швы спереди зияющие, извилистые, простые, на большом протяжении окаймлены гладкой полоской. Среднегрудь спадает косо и отлого вперед, без обособленного переднего ската, ее передний край с 2 парами лопастевидных зубцов на эпистернах. Средние тазики с трохантинами, расположенными под боковым краем среднегруди, к ним узким концом примыкают эпимеры среднегруди. Таким образом, средние тазиковые впадины открытые, друг от друга отдалены слегка меньше, чем передние. Заднегрудь с цельной срединной бороздкой. Бедренные покрывки с тупым зубцом у места прикрепления вертлуга, от него сужены в обоих направлениях, к концу почти равной ширины (рис. 1,в). Ноги длинные, лапки узкие, все их членики простые, не двулопастные, без лопастинок, в прилегающей волосистости, с несколь-




Рис. 1.

*Natrus dux* Khnz., gen. et spec. nov.

а—общий вид; б—грудь между передними и средними ногами в профиль, в—голова и грудь, вентрально, з—пенис; д—последние сегменты брюшка, вентрально.

а—бХ8; в—дХ24

кими вершинными щетинками, 1-й членик задних лапок много длиннее 2-го. Коготки длинные, гладкие, слегка утолщены у основания, без зубца и без щетинок.

Монотипичный род, названный по имени древнего племени Наири, жившего в северной Армении.

Согласно современной классификации этот род принадлежит к трибе Athoini, хотя он, по-видимому, ближе стоит к трибе Melanotini, у которой, однако, коготки всегда гребенчатые. В трибе Athoini он ближе всего стоит к роду *Isidus* Muls., у которого волоски на переднеспинке также зачесаны назад и воротничок короткий (у прочих родов трибы волоски переднеспинки зачесаны вперед или косо в разные стороны, воротничок длиннее), но у этого рода габитус иной, усики много длиннее, пальчатые с 3-го членика, боковая кайма переднеспинки подогнута вниз почти по всей длине, пенис совсем другого типа. Средние тазики уже, чем у всех прочих родов трибы. По строению воротничка отличается от всех прочих шелкоунов, изученных в этом отношении.

*Nalrus dux* Iablokoff-Khinzorian sp. nov.

Армянская ССР: Джрабер, на север от Еревана, на травянистом южном склоне на высоте около 1600 м над у. м., в норе хомячка, 23/VIII 1972, голотип, ♂. Одноцветно красно-бурый, конечности немногим светлее тела, волосистость золотистая. Длина 11,5 мм. Рис. 1,а.

Голова поперечная, глаза большие, снизу крупнее, чем сверху. Лоб выпуклый, спереди спадает довольно круто, густо и грубо точечный. точки глазчатые, отстоят друг от друга на много меньше, чем на диаметр, волосистость короткая, зачесана вперед, спереди расходится веерообразно. Переднеспинка едва шире длины, сзади с тонкой продольной бороздкой, диск в такой же точечности, как лоб, но его волосистость длинная и гуще, задние углы с килем, который вдвое длиннее них. Надкрылья в 2,5 раза длиннее общей ширины (длина измерена без щитка), лишь с пришовной бороздкой, с правильными рядами точек, промежутки которых негусто точечные и волосистые на гладком фоне, их точки вдвое меньше точек в рядах. Переднегрудь с изогнутыми швами, отграничивающими грушевидное поле, которое сзади вдвое уже, чем спереди, ее выступ с тонким срединным килем, густо точечный и волосистый. Вся грудь в такой же скульптуре, как переднеспинка, лишь на среднегрудь местами имеются гладкие зеркальца. На брюшке точечность мелкая, рассеянная и равномерная. Все тело покрыто густой волосистостью, сверху слегка приподнятой.

У ♂ усики пальчатые с 4-го членика, который длиннее и толще последующих, все членики в прилегающей волосистости и с несколькими вершинными щетинками. Пенис: рис. 1,г. Последние сегменты брюшка: рис. 1,д. Самка неизвестна.

Зоологический институт  
Академии наук Армянской ССР

Կարձրարև-չրխկանների հոր սեռ և տեսակ Հայաստանից

Հոդվածում նկարագրված է չրխկանների սոր սեռ և տեսակ *Nairus dux* Khnz. gen. et spec. nov. գտնված Երևանից հյուսիս բնկած Զրարերում, համատեղիկի բնում.

Սևոր յուրահատուկ է և հարցես տարբերվում է *Athoim* տրիբին պատկանող մնացած բոլոր սեռերից: