МИКРОБИОЛОГИЯ

УДК 576.851

Э. К. Африкян

О природе морфологической инверсии *Vac. mycoides*
 по данным сканирующей электронной микроскопии

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР С. А. Мирзояном 13/ХІ 1973)

Спорообразующие бактерии *Vac. mycoides* Flügge широко распространены в природе и служили объектом многочисленных исследований по эколого-географической изменчивости микроорганизмов (1-3). Культуры данного вида характеризуются образованием на твердых питательных средах своеобразных колоний с закручивающимися лево- и правозавитыми тяжами. Обычно в природе обнаруживаются левозавитые формы, однако в определенных экологических условиях выявляется распространение инверсивных, правозавитых форм (3-5).

Причина морфологической инверсии, равно как и вращения бактериальных тяжей *Vac. mycoides*, остается невыясненной. Ряд авторов использовал это явление для исследований в области асимметрии протоплазмы (6-7). Среди особенностей этих форм, определяющих их морфо-физиологическую специфичность, вызвало интерес установление Льюисом (8) сахаролитической, инвертазной активности, свойственной левозавитым и отсутствовавшей у правозавитых форм *Vac. mycoides*. Однако эти данные не были подтверждены исследованиями других авторов на большом числе культур данного вида (3-9).

В настоящем сообщении излагаются результаты изучения лево- и правозавитых форм *Vac. mycoides* в сканирующем микроскопе с использованием оригинальной методики.

Объектами исследований служили 2 культуры левозавитых и 2 культуры правозавитых форм *Vac. mycoides*, выделенных из почв одной и той же местности. Культуры бактерий были очищены многократными посевами, а ориентация бактериальных тяжей установлена изучением развития колоний на МПА с содержанием 3% агара.

Подготовка исследуемого материала осуществлялась следующим образом. На поверхность агаризованной среды (МПА с 0,2% глюкозы) в чашке Петри располагалась полоска стерильной однослойной целлюлозной пленки, используемой в лабораторной практике для работ по

диализу. Пленка предварительно стерилизовалась и хранилась в чашках Петри между двумя слоями увлажненной фильтровальной бумаги. После слабого подсушивания чашек с питательной средой и разложенных на ней пленок на поверхность последних вносилась по типу гигантских колоний культура бактерий, и чашки инкубировались при 30° в термостате. По ходу инкубации рост культуры на пленке изучался в световом микроскопе при увеличении 600х.

Для исследований в сканирующем микроскопе выросшие на пленке колонии бактерий фиксировались в парах формальдегида в течение 24 часов путем размещения открытых чашек Петри в герметической камере, на дно которой вносился раствор формалина. Затем пленка осторожно снималась с поверхности агара и располагалась на объектодержателе сканирующего микроскопа, лишние части пленки обрезались. Напыление бактериальной колонии производилось смесью золото—паладий (60 : 40) на толщину 15 нм при вращении 15 об./мин. в вакуумиспарительном аппарате Denton DV-502. Препарат исследовался в сканирующем электронном микроскопе Stereoscan (Mark 2A, Cambridge Scientific Instruments Co) при угле потока электронов к поверхности обследуемого образца 45°, напряжении 20кв и конечной апертуре 200мк.

Достоинство описанного метода заключается в том, что он позволяет исследовать бактерии без нарушения естественного расположения их клеток в колонии и ее структуре. Все другие методы, использованные многими авторами для изучения микроорганизмов в сканирующем электронном микроскопе, не обеспечивают этого (10-12). В процессе подготовки исследуемого материала, при фиксации или напылении клеток нарушается структура колонии и расположение клеток в ней.

На рис. 1 показаны фотографии колоний различных форм *Vac. tyucoides* на разных стадиях их развития при исследовании в сканирующем микроскопе. Снимки сделаны при разных увеличениях, чтобы по-возможности более ясно представить изучаемые морфологические структуры.

Как видно из фотоснимков, бактериальные тяжи *Vac. tyucoides* состоят из цепочек клеток, прилегающих друг к другу (А, С). Наиболее характерным является то, что составляющие подобный тяж цепочки бактериальных клеток имеют неодинаковую длину. Это обусловлено тем, что каждый тяж начинает развиваться вначале с одной цепочки бактерий, за которой следует вторая, третья и т. д. В результате наружная цепочка клеток—наиболее длинная—продолжает развиваться, тогда как прилегающие к ней другие, которые плотно окружаются остальными цепочками бактерий, растут медленнее или прекращают развитие. Вследствие этого явления, бактериальный тяж закручивается в зависимости от того—в какой стороне имеется замедленное развитие расположенных рядом цепочек бактерий.

На рис. 1,В ясно видны концевые клетки двух цепочек бактерий прекративших свое размножение. На рис. 1,Д видны отделившиеся

клетки, что было достигнуто путем направления сильного потока электронов на определенное место, вызвавшего вздутие пленки и обрыв клеток бактерий.

Рис. 1. Бактериальные тяжи и клетки *Bac. thuringiensis* в сканирующем электронном микроскопе. Объяснения в тексте

По изложенным данным, можно заключить, что причиной вращения бактериальных тяжей в колониях *Bac. thuringiensis* является неравномерное деление клеток вдоль отдельных цепочек бактерий. Каждый бактериальный тяж состоит из плотно расположенных друг к другу цепочек клеток и, если замедление роста и размножения имеет место в расположенной слева цепочке клеток, тяж начинает загибаться и вращаться влево и, наоборот, — когда это имеет место в цепочке клеток справа, бактериальный тяж принимает правозавитую форму.

Неравномерность развития цепочек бактерий внутри каждого тяжа определяется тем, что они начинают развиваться одновременно: вначале развивается одна цепочка, затем вторая, третья и так далее. Порядок развития цепочек бактерий, равно как и специфическая особенность их развития, выражающаяся в том, что клетки начинают делиться без завершения процесса их разделения друг от друга, состав-

ляют наследственную характеристику лево- и правозавитых форм *Bac. inycoides*.

Институт микробиологии
Академии наук Армянской ССР

Է. Վ. ԱՖՐԻԿՅԱՆ

Bac. inycoides բակտերիաների մորֆոլոգիական ինվերսիայի բնույթի ուսումնասիրությունը սկանային էլեկտրոնային միկրոսկոպի օգնությամբ

Մշակված է սկանային էլեկտրոնային միկրոսկոպի օգնությամբ միկրոօրգանիզմների ուսումնասիրության նոր եղանակ: Այդ եղանակով *Bac. inycoides* բակտերիաների աջապտույտ և ձախապտույտ 4 կուլտուրաների հետազոտությունները ցույց են տվել, որ գաղութներում բակտերայի թելիկների տարբեր կողմեր պտտվելը պայմանավորվում է այդ թելիկները կազմող բջիջների ոչ հավասարաչափ բազմացմամբ:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- ¹ Е. Н. Мишустин, Эколого-географическая изменчивость почвенных бактерий. Изд. АН СССР, 1947. ² Е. Н. Мишустин, Микробиология, в 1, 1950. ³ Э. К. Африкян, ДАН Арм. ССР, 20, № 5, 1955. ⁴ О. К. Настюкова, ДАН СССР, 59, № 9, 1947. ⁵ Э. К. Африкян, Аэробные спорообразующие бактерии и их энтомопатогенные свойства. Автор. докт. дисс., М., 1970. ⁶ Г. Ф. Гаузе, Асимметрия протоплазмы, Изд. АН СССР, 1940. ⁷ В. В. Алпатов и О. К. Настюкова, ДАН СССР, 54, 541, 1946. ⁸ I. M. Lewis, J. Bacteriol., 25, 365, 1933. ⁹ О. К. Настюкова и В. В. Алпатов, Микробиология, 17, 42, 1948. ¹⁰ S. T. Williams, J. Gen. Microbiol., 62, 67, 1970. ¹¹ G. St. Julian, L. A. Bulla, C. W. Hesseltine, Can. J. Microbiol., 17, 373, 1971. ¹² D. B. Drucker, D. K. Whittaker, J. Bacteriol., 108, 515, 1971.