УДК 519.210

МАТЕМАТИКА

И. В. Ковалишина, В. П. Потапов

Индефинитная метрика в проблеме Неванлинны—Пика

(Представлено академиком АН Армянской ССР М. М. Джрбашяном 20/IV 1974г.)

В настоящей статье рассматривается проблема Неванлинны—Пика⁽¹⁾ в матричном аспекте, а именно: дана последовательность точек

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \dots \quad (\lambda_j + \bar{\lambda}_j > 0)$$

из открытой правой полуплоскости и последовательность квадратных матриц m -го порядка

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots \quad (\omega_j + \omega_j^* > 0)$$

из открытой правой матричной полуплоскости; ищется позитивная матрица-функция $\omega = \omega(\lambda)$, то есть голоморфная в правой полуплоскости, удовлетворяющая условию

$$\operatorname{Re} \omega(\lambda) = \frac{1}{2} [\omega(\lambda) + \omega^*(\bar{\lambda})] \geq 0$$

такля, что

$$\omega(\lambda_1) = \omega_1, \quad \omega(\lambda_2) = \omega_2, \quad \dots \quad \omega(\lambda_n) = \omega_n \dots$$

Мы устанавливаем здесь теснейшую связь этой задачи с теорией J -растягивающих матриц-функций⁽²⁾.

В основе исследования лежит известное неравенство Шварца—Пика для позитивных матриц-функций:

$$\left\| \frac{\omega(\lambda_j) + \omega^*(\lambda_k)}{\lambda_j + \bar{\lambda}_k} \right\|_{j,k=1}^n \geq 0 \quad (1)$$

Как обычно, сначала решается усеченная проблема. Справедлива Теорема: Для того, чтобы матрица-функция $\omega(\lambda)$ была решением проблемы Неванлинны-Пика для конечного числа пар λ_j, ω_j ($j=1, 2, \dots, n$), необходимо и достаточно, чтобы матрица-функция удовлетворяла основному матричному неравенству

$$\begin{vmatrix} \frac{\omega_1 + \omega_1^*}{\lambda_1 + \bar{\lambda}_1} & \dots & \frac{\omega_1 + \omega_n^*}{\lambda_1 + \bar{\lambda}_n} & | & \frac{\omega_1 + \omega^*(\lambda)}{\lambda_1 + \bar{\lambda}} \\ \sim & \sim & \sim & | & \sim \\ \frac{\omega_n + \omega_1^*}{\lambda_n + \bar{\lambda}_1} & \dots & \frac{\omega_n + \omega_n^*}{\lambda_n + \bar{\lambda}_n} & | & \frac{\omega_n + \omega^*(\lambda)}{\lambda_n + \bar{\lambda}} \\ \dots & \dots & \dots & | & \dots \\ \frac{\omega(\lambda) + \omega_1^*}{\lambda + \bar{\lambda}_1} & \dots & \frac{\omega(\lambda) + \omega_n^*}{\lambda + \bar{\lambda}_n} & | & \frac{\omega(\lambda) + \omega^*(\lambda)}{\lambda + \bar{\lambda}} \end{vmatrix} \geq 0. \quad (2)$$

В предположении, что блок

$$A = \begin{vmatrix} \frac{\omega_1 + \omega_1^*}{\lambda_1 + \bar{\lambda}_1} & \dots & \frac{\omega_1 + \omega_n^*}{\lambda_1 + \bar{\lambda}_n} \\ \sim & \sim & \sim \\ \frac{\omega_n + \omega_1^*}{\lambda_n + \bar{\lambda}_1} & \dots & \frac{\omega_n + \omega_n^*}{\lambda_n + \bar{\lambda}_n} \end{vmatrix}$$

неособенный*, решение неравенства (2) записывается в виде дробно-линейного преобразования произвольной положительной матрицы-функции $\omega(\lambda)$

$$\omega(\lambda) = [\omega(\lambda)b(\lambda) + d(\lambda)]^{-1} [\omega(\lambda)a(\lambda) + c(\lambda)],$$

матрицей коэффициентов которого является групповой элементарный множитель (**), то есть J -растягивающая в правой полуплоскости, J -унитарная на мнимой оси матрица-функция

$$B_n(\lambda) = I + \sum_{j=1}^n \frac{2\sigma_j a_j}{\lambda - \lambda_j} = \begin{bmatrix} a(\lambda) & b(\lambda) \\ c(\lambda) & d(\lambda) \end{bmatrix}, \quad (3)$$

где

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix},$$

$$2\sigma_j a_j = \sum_{k=1}^n \begin{bmatrix} I \\ \omega_k^* \end{bmatrix} h_{kj} [I, \omega_j] J,$$

$$\|h_{jk}\|_{j,k=1}^n = A^{-1}, \quad 2\sigma_j = \lambda_j + \bar{\lambda}_j.$$

Параллельно рассматривается и пошаговое решение задачи. Устанавливаются следующие факты:

1. Каждый J -неотрицательный проектор: $P^2 = P$, $PJ \geq 0$ полного** ранга может быть записан в виде

* В скалярном случае вырождение блока A приводит к единственному решению, являющемуся рациональной положительной функцией. Вопрос о вырождении блока A в матричном случае здесь обсуждаться не будет.

** То есть максимального ранга, в данном случае равного m .

$$\rho = \begin{vmatrix} (w_0 + w_0^*)^{-1} w_0 & (w_0 + w_0^*)^{-1} \\ w_0^* (w_0 + w_0^*)^{-1} w_0 & w_0^* (w_0 + w_0^*)^{-1} \end{vmatrix}, \quad w_0 + w_0^* > 0$$

2. Если

$$L_0(\lambda) = I + \frac{2\alpha_0}{\lambda - \lambda_0} \rho = \begin{vmatrix} a(\lambda) & b(\lambda) \\ c(\lambda) & d(\lambda) \end{vmatrix}$$

элементарный множитель полного ранга, а $w(\lambda)$ — произвольная позитивная матрица-функция, то дробно-линейное преобразование

$$w(\lambda) = [w(\lambda)b(\lambda) + d(\lambda)]^{-1} [w(\lambda)a(\lambda) + c(\lambda)] = L_0(\lambda) | w(\lambda) |$$

определяет позитивную матрицу-функцию $w(\lambda)$, являющуюся общим решением интерполяционной задачи $w(\lambda_0) = w_0$ с одним узлом.

3. Общий вид позитивных матриц-функций, удовлетворяющих любому конечному числу первых условий

$$w(\lambda_1) = w_1, \quad w(\lambda_2) = w_2, \quad \dots, \quad w(\lambda_n) = w_n,$$

представим в форме суперпозиции дробно-линейных преобразований

$$w(\lambda) = L_1(\lambda) | L_2(\lambda) | \dots | L_n(\lambda) | w_n(\lambda) | \dots | |,$$

где $w_n(\lambda)$ — произвольная позитивная матрица-функция. Матрица коэффициентов результирующего дробно-линейного преобразования равна произведению элементарных множителей полного ранга

$$L_n(\lambda) L_{n-1}(\lambda) \dots L_2(\lambda) L_1(\lambda)$$

$$L_i(\lambda) = I + \frac{2\alpha_i}{\lambda - \lambda_i} P_i, \quad P_i = \begin{vmatrix} (w_i^{(i)} + w_i^{(i)*})^{-1} w_i^{(i)} & (w_i^{(i)} + w_i^{(i)*})^{-1} \\ w_i^{(i)*} (w_i^{(i)} + w_i^{(i)*})^{-1} w_i^{(i)} & w_i^{(i)*} (w_i^{(i)} + w_i^{(i)*})^{-1} \end{vmatrix}, \quad (4)$$

где матрицы $w_i^{(i)}$ — так называемые параметры Шура — последовательно находятся по формулам

$$w_i^{(i)} = L_{i-1}^{-1}(\lambda_i) | L_{i-2}^{-1}(\lambda_i) | \dots | L_1^{-1}(\lambda_i) | w_1 | \dots | |, \quad (i=2, 3, \dots, n),$$

$$(w_1^{(1)} = w_1).$$

Таким образом, постановке любой задачи Неванлинны-Пика соответствует бесконечное произведение двучленных множителей полного ранга

$$\dots L_n(\lambda) L_{n-1}(\lambda) \dots L_2(\lambda) L_1(\lambda),$$

n -ое частичное произведение которого

$$B_n(\lambda) = L_n(\lambda) L_{n-1}(\lambda) \dots L_2(\lambda) L_1(\lambda)^*$$

является матрицей коэффициентов дробно-линейного преобразования произвольной позитивной функции, дающего общее решение усеченной проблемы. Справедливо и обратное утверждение. В самом деле, зададим произвольное бесконечное произведение двучленных множителей полного ранга

$$\dots L_n(\lambda) \dots L_2(\lambda)L_1(\lambda)$$

$$L_i(\lambda) = I + \frac{2\alpha_i}{\lambda - \lambda_i} P_i,$$

где все λ_i различны между собой. Проектор P_i каждого такого множителя определит позитивную матрицу $w_i^{(0)}$. По $w_i^{(0)}$ строим матрицы

$$w_i = L_1(\lambda_i) \{ L_2(\lambda_i) \{ \dots \{ L_{i-1}(\lambda_i) \{ w_i^{(0)} \} \dots \} \}$$

и формулируем проблему Неванлинны—Пика: найти позитивную матрицу-функцию $w(\lambda)$, удовлетворяющую условиям $w(\lambda_j) = w_j$ ($j=1, 2, \dots$).

Тем самым показано, что проблема Неванлинны—Пика адекватна изучению бесконечного произведения двучленных множителей полного ранга.

Дальнейшее исследование связано с рассмотрением кругов Вейля. В терминах $B_n(\lambda)$ неравенство (2) переписывается в виде

$$[w(\lambda), I] \frac{B_n^{-1}(\lambda) J B_n^{*-1}(\lambda)}{\lambda + \bar{\lambda}} \begin{bmatrix} w^*(\lambda) \\ I \end{bmatrix} \geq 0$$

или

$$[w(\lambda), I] \begin{pmatrix} -R_n & S_n^* \\ S_n & -T_n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} w^*(\lambda) \\ I \end{bmatrix} \geq 0, \quad (5)$$

где

$$B_n^{-1}(\lambda) J B_n^{*-1}(\lambda) = \begin{pmatrix} -R_n & S_n^* \\ S_n & -T_n \end{pmatrix} = W_n$$

—так называемая матрица Вейля. Неравенство (5) означает, что при фиксированном λ множество решений $w(\lambda)$ неравенства (2) заполняет матричный круг Вейля $B_n(\lambda)$:

$$w(\lambda) = S_n R_n^{-1} + \sqrt{S_n R_n^{-1} S_n^* - T_n} \cdot u \cdot \frac{1}{\sqrt{R_n}}, \quad \|u\| \leq 1.$$

Изучение поведения кругов Вейля при возрастании n приводит к следующим результатам: центры $S_n R_n^{-1}$ стремятся к конечному пределу; радиусы $\rho_c^{(n)} = S_n R_n^{-1} S_n^* - T_n$ и $\rho_d^{(n)} = R_n^{-1}$ монотонно убывают; каждый круг Вейля вложен в предыдущий.

В силу основной теоремы С. А. Орлова⁽³⁾ радиусы левого и правого радиусов предельного круга не зависят от выбора $\lambda = \lambda_j$.

Мы будем говорить, что проблема Неванлинны—Пика вполне неопределенна, если оба радиуса имеют неособенные пределы.

Имеет место теорема, являющаяся обобщением известного критерия Данжуа (запись станет более прозрачной, если считать, что независимая переменная λ меняется в единичном круге):

Для того, чтобы проблема Неванлинны—Пика была вполне неопределенной, необходимо и достаточно, чтобы сходился ряд

$$\sum_{j=1}^{\infty} (1 - |\kappa_j|) P_j J \quad (|\kappa_j| < 1).$$

* Обозначение $L_n(\lambda) \dots L_2(\lambda)L_1(\lambda) = B_n(\lambda)$ не случайно. Доказано, что матрица-функция $B_n(\lambda)$ (3) разлагается в произведение множителей $L_i(\lambda)$ вида (4).

Это условие является необходимым и достаточным для сходимости произведения Бляшке-Потапова двучленных множителей, нормированных в точке $z=0$ к J -модулю (²).

И, наконец, доказана теорема о структуре радиусов круга Вейля для любой усеченной проблемы Неванлинны—Пика. Основываясь на ней, удалось доказать следующие утверждения для предельных радиусов:

1. Если левый радиус неособенный, то и правый радиус неособенный;
2. Если правый радиус неособенный, то левый либо неособенный, либо равен нулю.
3. Можно построить проблему Неванлинны—Пика с вырожденными левым и правым радиусами любых наперед заданных рангов.

Органическая связь теории аналитических матриц-функций с другими классическими задачами составит предмет отдельных исследований.

Одесский технологический институт
холодильной промышленности

Ի. Վ. ԿՈՎԱԼԵՆԿԱ, Վ. Գ. ԳՈՏԻՍՅԱՆ

Ինդիֆինիտ մատրիկան նեանլինա-Պիկի պրոբլեմում

Ներկա հոդվածում դիտվում է նեանլինա-Պիկի հայտնի ինտերպոլյացիոն խնդիրն ավելի բնահանուր մատրիցային դրվածքով:

Հատած պրոբլեմի լուծումը բերում է հետևյալ պնդմանը՝ $\omega(\lambda)$ մատրիցա-ֆունկցիան կհանդիսանա բննարկվող խնդրի լուծում այն և միայն այն դեպքում, երբ $\omega(\lambda)$ -ն բավարարում է ըստ էության Շվարցի-Պիկի անհավասարությունը հանդիսացող հիմնական մատրիցային անհավասարությունը:

Այդ անհավասարության բնահանուր լուծումը ներկայացվում է կամայական պողիտիվ $\omega(\lambda)$ մատրիցա-ֆունկցիայից

$$\omega(\lambda) = [\omega(\lambda)b(\lambda) + d(\lambda)]^{-1}[\omega(\lambda)a(\lambda) + c(\lambda)]$$

կոտորակա-գծային ձևափոխության տեսքով, որի դործակիցների

$$B(\lambda) = \begin{pmatrix} a(\lambda) & b(\lambda) \\ c(\lambda) & d(\lambda) \end{pmatrix}$$

մատրիցան հանդիսանում է խմբային արտադրիչ, այսինքն՝ ինտերպոլյացիայի հանգույցներում բևեռներ ունեցող, աչ կիսահարթություններում J -ձգող և կեղծ առանցքի վրա J -ունիտար մատրիցա-ֆունկցիա:

Միաժամանակ ապացուցված է նեանլինա-Պիկի պրոբլեմի ադեկվատությունը լրիվ ունգի նրկանդամ էլեմենտար արտադրիչների

$$\prod_{j=1}^{\infty} \left[1 + \frac{2\sigma_j}{\lambda - \lambda_j} \rho_j \right], \quad \rho_j^2 = \rho_j, \rho_j J \geq 0$$

անվերջ արտադրյալի տրմանը:

Վերջապես, նեանլինա-Պիկի համար դիտարկված է Վեյլի շրջանների տեսությունը: Տրված է պրորիեմի լիովին անորոշության հայտանիշ, ուսումնասիրվում է աջ և ձախ սահմանային շառավիղների ստրուկտուրան:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

¹ R. Nevanlinna, Über beschränkte analytische Funktionen, (Ann. Acad. Sci. Fennicæ, A 32, 1929). ² В. П. Потанов, Тр. Московского мат. общества, т. 4, стр. 125—236, 1955. ³ В. П. Потанов, ДАН АрмССР, т. XLVIII, № 5 (1969). ⁴ А. Е. Ефимов, В. П. Потанов, Успехи мат. наук, т. XXVIII, вып. I (169), 1973. ⁵ А. Орлон, Всесоюзная конференция по теории функций комплексного переменного, Тезисы докладов, Харьков, 1971: "