УДК 581—1—036

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

А. Д. Дограмалжян, С. А. Марутян

О роли фосфолипидов в морозостойкости винограда

(Представлено академиком М. Х. Чайлахяном 29/XII 1973)

Расшифровка путей биосинтеза и распада различных компонентов живой клетки выяснила, что фосфолипиды, сосредотачиваясь главным образом в ядре, митохондриальных и микросомных мембранах, помимо выполнения скелетной функции участвуют в процессе переноса электронов. Они регулируют проницаемость мембран и поддерживают окислительное фосфорилирование (1,2). Последнее весьма важно для зимующих растений, так как в осенне-зимний период энергетические возможности растений сильно ограничены, а от проницаемости мембран и водоудерживающих сил зависит жизнь и гибель клетки при воздействии критических отрицательных температур (3-6).

В этом аспекте сведения по фосфолипидам растений в литературе единичны (7), а по винограду вовсе отсутствуют. Наши исследования, посвященные разработке метода (8) и изучения жирового обмена (9) выдвигают в настоящее время необходимость проводить исследования в области метаболизма фосфолипидов в связи с морозоустойчивостью виноградной лозы.

Имеется основание полагать, что качественные и количественные изменения фосфолипидов являются одной из внутренних регулирующих систем, причастных к повышенной морозоустойчивости растений.

Нами исследовались количественные изменения свободных и связанных фракций фосфолипидов в побегах винограда в период осенне-зимнего покоя в связи с температурными режимами и природы морозоустойчивости сорта. При этом изучался также качественный состав фосфолипидов и изменчивость компонентов методом тонкослойной хроматографии на кремневой кислоте.

Объектом исследования служили лиофилизированные одревесневшие части побегов в зоне 4—7 узла у морозостойкого сорта Русский Конкорд и неморозостойкого Спитак Араксени.

Кривые на рис. 1 показывают явное количественное преобладание связанных фосфолипидов над свободной фракцией. Поэтому характер кривой общего количества фосфолипидов в основном воспроизводит

характер кривой связанной фракции. К тому же, отмечается ритмическое изменение кривых обеих фракций в зависимости от этапов температурного режима за весь период покоя. В период резкого снижения температуры от 0° до -10° общее количество фосфолипидов сильно уменьшается. В дальнейшем длительное и более сильное воздействие отрицательных температур сопровождается возрастанием количества фосфолипидов. Интересно, что характер кривой свободной фракции у обоих сортов однотипен, тогда как в поведении связанной фракции проявляется сортовая специфичность. Так, при воздействии нулевых температур способствующих закаливанию растений, количество связанных фосфолипидов у морозостойкого сорта снижается. Вероятно, это

Рис. 1. Динамика фосфолипидов в побегах винограда в период покоя в % на сухое вещество. 1—общее количество фосфолипидов; 2—количество связанной фракции фосфолипидов; 3—количество свободной фракции фосфолипидов. Пунктирная линия—динамика минимальных температур

уменьшение во фракции связанных фосфолипидов происходит за счет их активного метаболического использования в закалочных процессах. У неморозостойкого сорта в период длительного нулевого температурного воздействия количество фосфолипидов вовсе не изменяется. Резкое снижение температуры от 0° до -10° у этого сорта вызывает значительное падение количества связанных фосфолипидов, возможно за счет усиления процесса распада липопротеидов, составной частью которых являются фосфолипиды. У морозостойкого сорта такое же резкое падение температуры не вызывает столь сильной реакции.

В дальнейшем при более длительном и сильном воздействии отрицательных температур (но не ниже порога выносливости) растения обоих сортов пытаются восстановить первоначальный уровень связанных фосфолипидов, количество которых весьма быстро возрастает. Характерное отличие морозостойкого сорта от неморозостойкого проявляется к концу зимы, когда накопленные фосфолипиды именно связанной фракции у морозостойкого сорта вновь включаются в активный метаболизм и используются растением (как это отмечалось в начале покоя при закалочных режимах 0°).

На рис. 2 сравнивается характер изменения кривой суммы трех главных компонентов жиров: сумма свободных жирных кислот+триглицериды+фосфолипиды (в процентах к сухому весу) с кривой доли фосфолипидов в этой сумме (%). Разбор кривых на рис. 2 показывает, что: а) в свободной фракции жиров относительный процент фосфолипидов в указанном комплексе находится в обратной корреляции с динамикой суммы трех компонентов и откликается на воздействия всех этапов температурного режима; б) в связанной фракции также наблюдается обратная корреляция. Однако в отличие от свободной фракции, обратная корреляция кривых не проявляет такой поэтапной ритмичности; в) привлекает внимание разнотипность характера кривых абсолютного и относительного количества фосфолипидов связанной фракции. Так, если абсолютное количество фосфолипидов у неморозостойкого сорта Спитак Араксени до декабря (рис. 2, А) возрастает, то относительное содержание в комплексе, напротив, уменьшается. У морозостойкого сорта Русский Конкорд за этот же период наблюдается полностью противоположная картина. Установленные закономерности дают возможность предположить, что сортовые и фракционные отличия фосфолипидов скорее всего связаны с наличием белкового компонента и его качественным различием (⁶). Одновременно проявляется своеобразие в поведении связанных фосфолипидов в связи с морозостойкостью растений. Повышенная морозостойкость побегов винограда хотя и сопровождается использованием фосфолипидов в процессе закалывания, однако уровень их относительного содержания в комплексе возрастает. На фоне таких своеобразных количественных изменений связанных фосфолипидов интересно было выяснить качественные различия.

На рис. 3 представлена тонкослойная хроматография фосфолипидов на кремневой кислоте при температурных режимах +10°, 0°, -10°.

Исследования показали, что в побегах винограда фосфолипиды представлены широким спектром. В состав фосфолипидов входят: фосфатидилинозит, фосфатидилсерин, фосфатидилглицерин, фосфатидилэтанолламин, диглицерофосфат, фосфатидилхоллин, моноглицерофосфат, кардиолипин. У морозостойкого сорта присутствуют еще два дополнительных неидентифицированных компонента. Наличие фосфатидилхоллина, фосфатидилсерина и фосфатидилэтанолламина само по себе весьма важный факт, так как показывает, что в побегах винограда при отрицательных температурах на фоне усиления процессов распада постоянно происходит синтез этих сложных липидов. Этот факт интересен

Рис. 2. Сопоставление динамики суммы трех компонентов свободных жирных кислот + триглицеридов + фосфолипидов в процентах на сухое вещество (1) с динамикой относительного процента фосфолипидов в сумме трех компонентов (2). Пунктирная линия — динамика минимальных температур

также тем, что по современным представлениям основной путь биосинтеза фосфатидилхолина, одного из наиболее богатого макроэнергетической компонентой фосфолипидов, следует через фосфатидилинозит и фосфатидилсерин.

Сравнение качественного состава и количества компонентов фосфолипидов в побегах исследуемых растений (рис. 3) показывает, что в зависимости от сорта превосходство при всех температурных режимах отмечается у наиболее морозоустойчивого сорта.

Рис. 3. Влияние низких температур на состав фосфолипидов. 1—фосфатидилинозит; 2—фосфатидилсерин; 3—фосфатидилглицерин; 4—фосфатидилэтаноламин; 5—диглицерофосфат; 6—фосфатидилхолин; 7—моноглицерофосфат; 8—кардиолинин

Таким образом, полученные экспериментальные данные наглядно показывают, что фосфолипиды в побегах винограда в период осенне-зимнего покоя растений метаболически динамичны. Характер их количественных изменений носит сортовой отпечаток в зависимости от природы морозоустойчивости. Становление высокой морозоустойчивости в процессе закалывания с одной стороны сопровождается использованием фосфолипидов, а с другой—возрастанием уровня их относительного содержания в жировом комплексе.

Институт виноделия, виноградарства и плодородства
МСХ Армянской ССР

Խաղողի ցրտադիմացկունության հաբցում ֆոսֆոլիպիդների դերի մասին

Ուսումնասիրվել են խաղողի շվերում ֆոսֆոլիպիդների աղասու և կապված ֆրակցիաների քանակական և որակական փոփոխությունները ձմռան հանդրստի շրջանում՝ կապված նվազագույն ջերմաստիճանների ազդեցության և բույսի ցրտադիմացկունության բնույթի հետ:

Միկրոթիմիական և քրոմատոգրաֆիկ եղանակներով ուսումնասիրելիս պարզվել է, որ ցրտադիմացկուն սորտերի մոտ կոփման պրոցեսում տեղի է ունենում մի կողմից ֆոսֆոլիպիդների օդտազործում, իսկ մյուս կողմից՝ նարայերի ընդհանուր կոմպլեքսում նրանց հարարերական մակարդակի բարձրացում:

Հայտնաբերված է նաև ֆոսֆոլիպիդների որակական կազմի և կոմպոնենտների քանակի ավելի լայն սպեկտր ցրտադիմացկուն սորտի մոտ:

ЛИТЕРАТУРА — ЦИТИРОВАНЬЕ

¹ Г. Милер, Ю. Кордес, Основы биологической химии, Изд. «Мир», М., 1970.
² Ю. Г. Молотковский, Физиол. раст., 17, 6, 1249—1264 (1970).
³ И. И. Туминов, Известия АН СССР, серия биол., 4, 469, (1969).
⁴ О. А. Кривавцев, Калориметрия растений при температурах ниже нуля, Изд. «Наука», М., 1972.
⁵ К. С. Погосян, А. Сакаи, Вестник сельхоз. науки, № 11, 78—83, 1972.
⁶ С. А. Марутян, Сб. тезисов докладов на Всесоюзной научно-техн. конференции. Основные направления исследования биохимических процессов виноделия, М., 1973, стр. 9.
⁷ К. А. Сергеева, Физиологические и биохимические основы зимостойкости древесных растений, Изд. «Наука», М., 1971.
⁸ А. Д. Лограмаджян, Сборник методик по физиолого-биохимическим исследованиям в виноградарстве, М., 164—175, 1967.
⁹ А. Д. Лограмаджян, С. А. Марутян, Ж. А. Петросян, Физиол. раст., 16, 3, 470—477 (1969).