ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

LXI 1975 5

УДК 595.768

ЭНТОМОЛОГИЯ

М. Е. Тер-Минасян

Новые виды жуков—зерновок (Coleoptera, Bruchidae)

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Э. А. Давтяном 3/VII 1975)

При обработке материалов по зерновкам были обнаружены новые виды, описание которых дается в настоящей статье.

Типы новых видов хранятся в коллекции Зоологического института Академии наук СССР.

Bruchidius megriensis Ter-Minassian, sp. n. (рис. 1).

Тело, усики кроме 1—3-го члеников, передние и средние бедра кроме их вершины, задние ноги целиком черные, 1—3-й членики усиков, вершины передних и средних бедер, передние и средние голени темно красноватые. Верх не густо, довольно равномерно покрыт короткими прилегающими серовато-желтыми блестящими волосками, не образующими явственных пятен и перевязей сверху. Пигидий равномерно и не густо покрыт такими же волосками. Усики самца заходят за середину тела, явственно пильчатые, у самки заходят за плечи, лоб выпуклый, без срединного киля, но с небольшой блестящей точкой, густо и мелко точечный. Переднеспинка явственно поперечная, почти на ⅓ шире своей

Рис. 1. Bruchidius megriensis T.-M.

длины, от основания к вершине слабо суженная, со слабо закругленными боками, заостренными задними углами, выпуклым диском, серединой основания с полукруглой лопастью, вся равномерно густо и довольно мелко точечная. Щиток полукруглый. Надкрылья у основания едва шире переднеспинки, не менее чем в 1⅛ раза длиннее общей ширины плеч, бока их очень слабо расширены назад, почти параллельносторонние, наибольшей ширины за серединой, с тонкими линиевидными точечными рядами и более широкими и плоскими промежутками, без зубчиков или бугорков у основания 3—5-го промежутков. Скульптура надкрылий скрыта под покровом волосков. Пигидий самца и самки не длиннее своей ширины у основания, у самца не более отвесный с заостренной вершиной, густо и мелко точечный, равномерно покрыт малозаметными темными волосками. Задние бедра без зубца, задние тазики густо и грубо точечные.

Длина 1,7—1,9 *мм*.

Голотип ♂ и ♀ паратип: Мегри, Армянская ССР, 27/IV 1974 г. (В. А. Рихтер).

Может быть сравнен с Bruchidius longulus Schilsky, но отличается от него явственно поперечной, сверху невыпуклой переднеспинкой, отсутствием явственных пятен на надкрыльях, сравнительно более короткими надкрыльями.

Bruchidius sugonjaevi Ter-Minassian sp. n. (рис. 2).



Рис. 2. Bruchidius sugonjaevi T.-M.

Окраска черная, 1—3-й членики усиков, передние бедра, кроме основания, передние голени и лапки, вершины средних голеней желтовато-красные, весь равномерно, довольно густо покрыт оливково-серыми блестящими тонкими волосками. Лоб без киля, но с выпуклой блестящей точкой, густо и мелко точечный, наличник, вырезка глаз покрыты густыми светлыми шерстистыми волосками. Усики (рис. 3) у самки едва заходят за плечи, у самца явственно заходят за плечи, не пильча-



Рис. 3. B. sugonjaevi T.-M. — усик

тые, начиная с 3-го членика усиков явственно продолговатые, узкие. Переднеспинка у основания слегка шире своей длины, с полукруглой лопастью у середины основания, довольно сильно сужена вперед, передний край переднеспинки по ширине не более $^2/_3$ основания, бока слабо закругленные, диск мало выпуклый, задние углы заостренные, вся пе-



Рис. 4. Bruchidius popovi T.-M.

реднеспинка очень густо и довольно мелко точечная. Скульптура не просвечивает через покров волосков. Щиток небольшой четырехугольный. Надкрылья не менее чем в $1^1/_2$ раза длиннее общей ширины плеч, по бокам слабо расширены назад, в основании 5-й бороздки имеется небольшой бугорок. Точечные бороздки узкие, довольно глубокие, промежутки широкие, плоские. Бороздки в виде темных линий хорошо заметны на надкрыльях, скульптура блестящих промежутков покрыта густыми и мелкими точками заметна лишь на потертых участках, обычно скрыта под покровом густых волосков. Пигидий самца и самки отвесный, у ♂ особенно выпуклый, густо и равномерно покрыт волосками, скрывающими скульптуру. Ноги тонкие.

Длина 2,7—3,3 *мм*.

Голотип ♂, паратипы 21 ♂ и 9 ♀; Афганистан, южный склон Гиндукуша, ниже перевала Саланг, 2700*м* 4/VII 1966 г. (Е. С. Сугоняев).

Вид назван именем нашедшего его и установившего кормовое растение известного советского энтомолога Е. С. Сугоняева.

Выведен из плодов Astragalus. Может быть сравнен с B. virescens Boh., от которого отличается продолгонатыми члениками усиков, окраской ног, удлиненной переднеспинкой, более выпуклым и отвесным пигидием самца.



Рис. 5. B. popovi T.-M. — усик

Bruchidius popovi Ter-Minassian, sp. n. (рис. 4).

Тело, усики и ноги целиком черные. Верх довольно густо покрыт серебристо серыми, тонкими, прилегающими волосками. Усики (рис. 5) едва заходят за плечи, их 5—10 членики не резко пильчатые, не поперечные, бокаловидные. Голова густо и мелко точечная, лоб без киля по середине. Ширина переднеспинки у основания почти не превышает ее длину посередине. Переднеспинка резко сужена к вершине, которая по ширине не более половины основания, отчего переднеспинка имеет

треугольный вид, задние углы ее не заострены, основание с довольно крупной полукруглой лопастью посредине, бока прямолинейно сужены к вершине, диск равномерно слабо выпуклый, скульптуру можно разглядеть под тонким покровом волосков. Вся переднеспинка равномерно и очень густо покрыта очень мелкими точками. Щиток довольно большой, четырехугольный. Надкрылья менее чем в $1^1/_2$ раза длиннее общей ширины плеч, отчего у жука почти квадратный вид, от плеч почти не расширены назад, почти параллельносторонние, с довольно глубокими точечными бороздками, промежутки широкие, плоские, скульптура их скрыта под довольно густым покровом волосков, между 3-м и 4-м промежутками, над 3-й бороздкой имеется довольно крупный двувершинный зубец. Ноги тонкие, длинные. Пигидий слабо выпуклый, не длиннее своей ширины, покрыт такими же серыми волосками, как и весь жук, скрывающими скульптуру пигидия.

Длина 3 *мм*.

Голотип ♀: Туркменская ССР, ущ. Гувен-дере, бл. Ярты-Кала, Копет даг, 15/VIII 1934 г. (В. В. Попов).

Вид назван именем крупнейшего советского энтомолога, нашедшего его, В. В. Попова.

Может быть сравнен с B. robustus Luk. et T.-M., от которого отличается более сильно удлиненной и более резко суженной у переднего края, значительно более мелко и густо точечной переднеспинкой, более тонкими волосками, покрывающими верх и пигидий.

Зоологический институт
Академии наук СССР

Մ. Ե. ՏԵՐ-ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ընդակիր բզեզների նոր տեսակներ (Coleoptera, Bruchidae)

Ներկա աշխատանքում նկարագրված են Bruchidae *բնաանիքին պատկանող 3 նոր տեսակ բզեզներ. Այդ տեսակներից* Bruchidius megriensis-*ը գանված է Մեղրիում, երկրորդ տեսակը՝* Bruchidius sugonjaevi-*ն ստացված է* Astragalus-*ի պտուղներից Ադրանստանում, Հինդուկուշի հարավային լանջ, իսկ երրորդը՝* Bruchidius popovi-*ն Թուրքմենական ՍՍՀ-ում Գուվինդերն կիրճում, Յարթի-Կալայի մոտ, Կոպետդաղում։*