

УДК 595.768.13

ЭНТОМОЛОГИЯ

А. П. Карапетян

Новый вид жуков зерновок из Армянской ССР
(Coleoptera, Bruchidae)

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Э. А. Давтяном 24/XII 1975)

Bruchidius khnzoriani Karapetian sp. nov.

Голотип: ♂ и ♀ выведены из семян *Astragalus* sp. в с. Уши Аштаракского района АрмССР 1/VIII 1973 г. Паратипы: 3 ♂ и 6 ♀ оттуда же, 1 ♂ 4/VI.1972 г. из Азизбековского района с. Азатек и 1 ♀ 2/VI 1973 г. из Джрвежа. Типы хранятся в коллекциях Института зоологии АН Армянской ССР.

Тело черное, сверху неравномерно покрыто желтыми и серовато-желтыми густыми волосками, которые на надкрыльях и у основания переднеспинки образуют нечеткие пятна и перевязи. Передние и средние ноги желто-красные, кроме основания бедер. Задние ноги черные, на вершине бедер с большим красным пятном. Усики черные, с 4 красными основными члениками. Голова почти голая, густо мелкоточечная. Лобный киль тонкий, шейная перетяжка слабо выражена. Лоб в 3,5 раза уже головы. Усики длинные, сильно пальчатые, равны 2/3 длины переднеспинки и надкрылий. Их 2-й членик в 1,7 раза короче 3-го и в 2 раза короче 4-го у обоих полов. Усики с 5-го членика почти равной длины и ширины.

Переднеспинка коническая, в 1,2 раза шире длины, мелко шагреневанная, ее бока от основания до вершины суживаются почти прямолинейно, у вершины в 2 раза уже, чем у основания, задние углы острые. Надкрылья без щитка в 1,2 раза длиннее ширины, с почти прямолинейными боками, с неглубокими точечными бороздками, у основания бороздок без бугорков. Промежутки между бороздками почти плоские, в более или менее густых мелких точках. Пигидий выпуклый, слабо поперечный, с сильно закругленными боками, отлогий, сверху хорошо виден. Задние бедра с маленьким, острым предвершинным зубцом (рис. 1,б). Задние голени прямолинейные, от основания к вершине значительно расширяются, с продольным наружным ребрышком. Членик I задних лапок слабо изогнутый, в 2,3 раза длиннее 2-го, на вершине с малень-

ким, внутренним зубцом. У ♂ усики длиннее и более пильчатые, чем у ♀ (рис. 1, в, г), последний видимый стернит брюшка с вырезкой.

Пенистая трубка слабо изогнутая, с маленьким крючковидным верхним зубцом и закругленными боковыми лопастями (рис. 1, д, е). Парамеры выпрямленные, у основания слитые, на вершине длинно волосистые.




Рис. 1 *Bruchidius khnzoriani* Karapetian sp. nov.

а—общий вид; б—задняя нога; в—усик ♂; г—то же у ♀; д—тегмен ♂; е—пенисная трубка с дорсальной стороны и сбоку; ж—урит IX ♀ с дорсальной стороны

У ♀ ложный яйцеклад короткий, генитальные пластинки в дистальной части сужены и с каждой стороны снабжены 2 зубцами, одним на вершине, другим ниже него, оба они с пучком щетинок (рис. 1, ж).

Длина: 2,9—3,7 мм.

По наружным морфологическим признакам вид ближе всего стоит к *Bruchidius femoralis* (Gyll.), от которого отличается следующими признаками.

1(2) Задние бедра с острым предвершинным зубцом, задние ноги черные, кроме вершин бедер. Усики черные, кроме основных 3—4 члеников. У ♂ вершина парамер широкая и снабжена густыми волосками (рис. 1, д). Ложный яйцеклад ♀ у вершины с боковыми волосистыми зубчиками (рис. 1, ж).

1. *B. khnzoriani* sp. nov.

2(1) Задние бедра без предвершинного зубца, задние ноги красно-желтые, кроме основания бедер или задние голени частично затемнены. Усики желто-красные, у ♂ вершинный край члеников 4—10 часто затемненный, парамеры с двухлопастной вершиной. Ложный яйцеклад ♀ у вершины без боковых зубчиков.

2. *B. femoralis* (Gyll.).

У прочих видов рода с зубцом на задних бедрах либо пигидий подогнут под надкрылья, либо у основания надкрылий имеются бугорки, либо промежутки между бороздками с рядами рашпилевидных точек.

Вид назван именем С. М. Яблокова-Хнзоряна, которому автор приносит свою глубокую благодарность за постоянную помощь в работе.

Институт зоологии
Академии наук Армянской ССР

Ա. Պ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Ընդակեր բզեզների նոր տեսակ Հայկական ՍՍՀ-ից
(Coleoptera, Bruchidae)

Ներկա աշխատանքում նկարագրված է ընդակեր բզեզների *Bruchidius* Schilsky սեռի նոր տեսակ *Bruchidius khnzoriani* Karapetian sp. nov. որը ստացված է Աշտարակի շրջանի Ուշի գյուղում, *Astragalus* sp. սերմերից, 1.8.1973 թվին:

