

УДК 595.768 23

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хинзориан

Новый вид жесткокрылых-долгоносиков рода *Апион*  
из Армянской ССР  
(Coleoptera, Curculionidae)

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Э. А. Давтяном 19/V 1977)

*Apion* (Echapton) *zangezuricus* Iablokoff-Khinzorian sp. nov.

Арм. ССР: Южный Загезур (Кафанский район), берег р. Цав между селениями Цав и Неркин Анд, на *Genista transcaucasica*, голотип, ♂ и 5 паратипов обоего пола. Голотип в коллекции института зоологии АН Армянской ССР.

Тело черное, густо покрыто сверху и снизу палочковидными белыми чешуйками, иногда сгущенными на пятом промежутке бороздок надкрылий, на нижней части тела образующими сплошной покров. Хоботок к вершине иногда осветлен. Усики и ноги желтые, средние и задние лапки, иногда и основание задних бедер затемнены. Длина (без хоботка) 1,8—2 мм. Рис. 1,а.

Лоб покрыт густыми точками и щетинками, образующими цельный ореол вокруг глаз, точечность лба продолжена узкой полосой на темени за глазами, остальная часть темени гладкая и голая. Хоботок тонкий, голый, сильно изогнутый, у ♂ такой же длины, как переднеспинка, у ♀ слегка длиннее нее, с обеих сторон с крупным основным зубцом, выступающим сбоку и снизу (рис. 1,б). Усики длиннее хоботка, их первый членик дугообразно изогнут, второй удлиненно овальный, третий узкий, вдвое длиннее ширины, последующие короче него, восьмой слегка шире длины. Переднеспинка поперечная, слабо сужена к основанию и много сильнее к вершине, спереди с вогнутым, затем с выпуклым боковым краем, основание с ямочкой. Диск густо мелко точечный на шагренированном фоне. Щиток явственный, треугольный. Надкрылья с очень слабо закругленным боковым краем до заднего ската, спадающего очень круто, покрыты густыми точками на шагренированном фоне, с тонкими бороздками и однородными, широкими, плоскими промежутками; в бороздках чешуйки тонкие и малозаметные, на промежутках—широкие, расположены в 2—3 неправильных ряда.

У ♂ передние голени в 1,2 раза длиннее задних, первый членик всех лапок удлиненный, на задних без зубца.




Рис. 1. а - б - *Arion zangezoricus* Khnz., sp. nov., голотип: а - габитус; б - голова сбоку

Этот вид типичный представитель подрода *Echarion* Bedel рода *Arion* Herbst, богато представленного в Средиземноморье и бедно на Кавказе и в Советском Союзе вообще. Отличается от всех прочих

видов подрода, кроме *A. formaneki* Wagner, строением передних ног ♂. *S. formaneki* он сходен габитуально, отличаясь от него наличием точечной полосы за глазами, поперечным, (а не продольным) восьмым члеником усиков у обоих полов, более густыми и широкими чешуйками верха и низа и более тонким хоботком. От всех прочих видов подрода, кроме половых признаков, отличается более коротким и кривым хоботком, а также габитуально.

На Кавказе до сих пор обнаружено четыре вида этого подрода, в том числе *formaneki*, упомянутый выше, *gracillitubus* Dsbr., известный и из Армении, *elongatulum* Dsbr., обычный в лесах Грузии и *sublineatum* Schilsky. Из этих трех последних видов первый отличается гладким теменем до глаз, едва изогнутым длинным хоботком с тупым основным зубцом, одеянием верха из тонких негустых волосков, второй—узким телом с узкой переднеспинкой, третий—невидимыми сверху мелкими основными зубцами красного хоботка.

Институт зоологии  
Академии наук Армянской ССР

ԱՐԼՈՆԱԿԱՆ ԿՈՒՆԻՍԻՍԿԱՆ ԵՆԶՈՐՅԱՆ

Արլոն սեռի երկարակնճիթ բզեզի նոր տեսակ Հայկական ՍՍՀ-ից  
*Arion (Exarion) zangezoricus* Khnz. sp. nov.

Նկարագրված է երկարակնճիթ բզեզի նոր տեսակ *Exarion* Bed. ենթասեռից, որը հայտնաբերվել է Ղափանի շրջանի Ոսվի և Ներքին Հանդի միջև: Նոր տեսակը նշված ենթասեռի հինգերորդ ներկայացուցիչն է հայտնաբերված Կովկասից: