

УДК 595.766.17

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хинзориан

Четыре новых вида жесткокрылых—малашек из СССР  
 (Coleoptera, Malachilidae)

(Представлено чл.-корр АН Армянской ССР Э. А. Давтяном 28/X 1977)

Статья содержит описание 4 новых видов жесткокрылых, собранных автором, голотипы которых хранятся в коллекциях Института зоологии АН Армянской ССР.

1. *Colotes anax lablokoff-Khnzorian* sp. nov.

Шатин (Ехегнадзорский р-н), 16/VII 1950, около селения на восточном склоне, поросшем скудной растительностью, голотип, ♂.

Голова с верхней губой желтая, мандибулы темные, темя черное, лоб сзади с черным треугольным пятном. Усики черные, их 2 первых членика желтые, щупики черные. Переднеспинка желтая с большим темным дискальным пятном, края которого расплывчатые. Щиток черный. Надкрылья желтые с 2 широкими черными перевязями, основная светлым оставляет лишь узкий боковой край надкрылья, задняя прервана у шва, достигает бокового края и продолжена вдоль него и вдоль эпиплевр. Низ черный, ноги желтые, основание задних бедер и вертлуги затемнены. Длина 1,7 мм. Рис. 1,е.

Лоб плоский, едва заметно мелкоточечный на шагренированном фоне. Щупики толстые. Переднеспинка с широко закругленными боками, очень нежно шагренированная, с плоскими малозаметными негустыми точками. Надкрылья равномерно, очень поверхностно точечные и очень коротко волосистые на шагренированном фоне, точки отстоят слегка больше, чем на диаметр. Шов слабо приподнят от щитка до заднего ската.

У ♂ первый членик усиков очень длинный, слабо изогнутый, расширен к вершине, его внешний край закругленный, внутренний вогнут дуговидно, сходится с внешним под острым углом, в разрезе сильно уплощен, 2-й очень мал, 3-й округлый, 4-й и последующие длиннее и уже. Передние бедра без вырезки. Задний край пигидия закруглен равномерно. Передние лапки простые, 4-члениковые (родовой признак).

Этот вид—типичный представитель рода *Colotes* Er. и подрода *Gynodyrnus* Abeille, но он резко отличается от прочих видов рода

строении усиков ♂. Сходно изогнутый 1-й членик усиков известен лишь у *C. tedjenensis* Wittmer из Туркмении и *bugakowskii* Wittmer из Монголии, но у этих видов он относительно много короче, не или едва длиннее 3 последующих, вместе взятых. У обоих этих видов передние бедра ♂ с вырезкой, надкрылья сзади с черным пятном на желтом фоне, бедра темные. У 1-го из них переднеспинка темная со светлым контуром, у 2-го—одноцветно желтая.




Рис. 1

а—*Hypedaeus altaicus* Khnz.; б—*Apalochrus armenus* Khnz.; в—*Colotesanax* Khnz.; г—*Ebaeus poecilus* Khnz.

2. *Eubaeus altatcus lablokoffi-Khnzorian* sp. nov.

Алтай. Чуйский тракт у 514-го километра, урочище Межтуерик, 22/VI 1966, 1 ♂, голотип; на горных склонах с густой травянистой и кустарниковой растительностью.

Черный, сзади голова черная, спереди до уровня глаз—желтая. Переднеспинка одноцветно черная, надкрылья желтые с большим треугольным черным пятном до плечевых бугорков, под ними надкрылья желтые до переднего края. Низ черный. Усики бурые, их 2-й и 3-й членики частично осветлены, щупики темные. Ноги желтые. Длина 3,3 мм. Рис. 1,а.

Голова шире переднеспинки. Лоб шагреневанный со следом мелкой точечности, с глубоким и широким вдавлением между глазами и ямочкой за наличником. Усики слегка заходят за плечи, их 1-й членик длинный, булавовидный, вздутый к вершине, 2-й едва длиннее ширины, 3 последующих равной длины, к вершине слегка вздуты, следующие 5 узкие, слегка короче 3 предыдущих, последние слегка длиннее них, узко веретеновидные. Переднеспинка шире длины, с закругленными боками, ее задние углы совсем закругленные, диск гладкий, блестящий, без точек, очень нежно шагреневанный. Щиток резко поперечный. Надкрылья слабо расширены кзади, едва заметно, мелко поверхностно точечные на шагреневанном фоне, с пегустой, очень короткой волосистостью, кажутся голыми.

У ♂ надкрылья с двумя парами отростков, передняя пара темная, треугольной формы, за нею на надкрыльях по темной полосе. Нижние отростки светлые, выпуклые, дугообразно и слегка угловато изогнутые (рис. 1,а), над ними с боков вершина надкрылий с удлинением, почти четырехугольным вдавлением. Пигидий желтый, с закругленной вершиной. Самка неизвестна.

От всех прочих видов рода отличается по форме и окраске отростков надкрылий ♂, а также по окраске тела.

3. *Eubaeus roecilus lablokoffi-Khnzorian* sp. nov.

Туркмения. Карлюк, на запад от Керки, в пустыне у канала, 20/IV 1968, голотип, ♂, аллотип и 3 паратипа обоего пола.

Голова черная, одноцветная (♀) или с большим желтым пятном от уровня передней трети глаз до наличника (♂). Усики двухцветные, их 3 первых членика светлые, 2 последующих черные с желтым основанием, прочие одноцветно черные. Мандибулы светлые, щупики светлые с черным последним члеником. Переднеспинка обычно одноцветно красно-желтая, у ♀ иногда с темным дискальным пятном. Надкрылья черные без металлического блеска, с общим светлым пятном у шва в его передней трети и 2 вершинными, крупными у ♂, более или менее укороченными у ♀, у которой с боков на уровне пришовного пятна узкое светлое красное пятно. Отростки надкрылий ♂ одноцветно желтые. Низ тела черный. Ноги желтые, основная часть бедер обычно зачернена, короче на передних, длиннее на задних. Длина 2,5—2,7 мм. Рис. 1,б.

Лоб слегка вдавлен, более глубоко у ♂, от наличника до уровня заднего края глаз, голый, блестящий, без точечности на шагреневанном фоне. Глаза крупные, выпуклые, выступающие. Усики с длинным

первым члеником, второй округлый, прочие удлиненные, четковидные, почти равной длины. Последний членик челюстных щупиков яйцевидный. Переднеспинка поперечная, слегка сужена кзади, с очень тонкой боковой каймой, все углы закругленные, диск очень мелко густо и поверхностно точечный на шагренированном фоне. Щиток поперечный с закругленным задним краем. Надкрылья с выступающими плечами, сильно расширены кзади, очень густо и мелко точечные на матовом, нечетко шагренированном фоне, волосистость густая, очень короткая, едва заметная. Ноги очень длинные, лапки узкие, у передних 3-й членик заметно длиннее соседних, у задних четыре первых членика с вершинным зубчиком.

У ♂ первый членик передних лапок с узким крючковатым отростком, загнутым над вторым (родовой признак). Надкрылья с вершинными отростками в виде почти четырехугольной едва выпуклой площадки (рис. 1, д), грибообразно приподнятой над скатом надкрылий, которые с боков перед ними вдавлены. У основания отростков по две поры без щетинок.

Этот вид — типичный представитель большого рода *Ebaeus* Eg. От всех видов рода легко отличается своеобразной окраской надкрылий и формой их отростков у ♂, от большинства из них — также очень длинными ногами.

#### 4. *Aralochrus armenus* Iablokoff-Khuzorlan sp. nov.

Ерасх (Арагатский район), 26/VIII 1970, на солончаках, кошенилем, 1 ♂, голотип.

Черный, наличник желтый, верхняя губа черная. Переднеспинка черная с узкой светлой каймой, расширенной вдоль всех углов. Щиток черный. Надкрылья желтые с 2 парами крупных черных пятен, оставляющими светлым узкий боковой край, переднюю половину шва до светлой срединной перевязи и вершину надкрылий. Усики желтые, их первый членик сверху с крупным черным пятном, щупики и ноги желтые. Все бедра с зачернением вдоль их верхнего канта, задние бедра затемнены. Крючок второго членика передних лапок ♂ спереди черный. Длина 2,9 мм. Рис. 1, б.

Голова едва уже переднеспинки. Лоб мелко и поверхностно точечный на шагренированном фоне с неровностями, негусто коротко волосистый. Усики перистые, такой же длины, как надкрылья, их первый членик маленький, второй очень короткий, спрятан в первом, третий почти равностороннетреугольный, четвертый с толстым отростком, у последующих отростки постепенно удлинены. Щупики узко яйцевидные. Переднеспинка шире длины, ее передние углы закруглены коротко, задние — широко. Основание с тонкой каймой. Диск мелко рассеянно точечный на блестящем, почти гладком фоне, волосистость такая же, как на лбу. Щиток резко поперечный. Надкрылья с четкими плечами, но без плечевых бугорков, едва расширены кзади, поверхностно, мало заметно рассеянно точечные на матовом и шагренированном фоне, с боков с негустыми торчащими черными волосками. Крылья развиты. Ноги длинные. Коготки с основным зубчиком.

У ♂ второй членик передних лапок с крючком (родовой признак), передние и средние голени прямые, задние слегка изогнутые. Самка неизвестна.

Этот вид принадлежит к роду *Apalochrus* Er. (= *Haralochrus* Abeille), но последний членик его челюстных щупиков уже, чем у прочих видов рода. По строению перистых усиков его можно сравнить лишь с *rectinicornis* Er. (усики темные со светлым основанием, надкрылья темные с большим светлым вершинным пятном, точечность верха гораздо грубее, ноги темные), с *flabellicornis* Er. (из Египта, верх металлически зеленый с красными пятнами, строение усиков иное) и *omega* Evers (из Монголии, голова и переднеспинка одноцветно черные, рисунок надкрылий иной, усики иной формы, в основном темные).

Институт зоологии  
Академии наук Армянской ССР

Ս. Մ. ՅԱՐԼՈՎՈՎ-ԿՆՁՈՐՅԱՆ

**Malachidae ընտանիքից չորս նոր տեսակ ՍՍՀՄ-ում  
(Coleoptera, Malachidae)**

Հոդվածը պարունակում է 4 նոր տեսակների նկարագիրը, որոնց թվում՝  
1. *Colotes anax* Khnz. Շատինից (Եղեգնաձորի շրջան): Այս տեսակը պատկանում է *Gynodypnus* Ab. ենթասեռին, արուի յուրահատուկ բնիկների հեշտությամբ տարբերվում է ենթասեռի այլ տեսակներից:

2. *Hypebaeus altaicus* Khnz. Ալթայից, Հայտնաբերված է Չուլսկի տրակտում, Մեծտուերիկ բնավայրի մոտ: Հեշտությամբ տարբերվում է սեռի այլ տեսակներից արուի վերնաթևերի վրայի սեռական ելուստների ձևով ու գույնով:

3. *Ebaeus poecilus* Khnz. Թուրքմենիայից, Հայտնաբերված է Կարլուկի մոտի սնապատում: Արդեն գույնով հեշտորեն տարբերվում է նույն սեռի այլ տեսակներից:

4. *Apalochrus armenus* Khnz. Երասխին մոտ սնապատից (Արարատի շրջան): Փետրավոր բնիկներ տնեցող ազգակից տեսակներից հեշտորեն տարբերվում է գույնով: