

УДК 595.763.77

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хинзориан

Новый вид жесткокрылых-узкотелок из Приморья
(Coleoptera, Colydiidae)

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Э. А. Давтяном 22 XI 1977)

Cicones ussuriensis Iablokoff-Khinzorian sp. nov.

Приморье: Шкотовский район, урочище Пейшула, 18/VIII 1971, голотип и 1 паратип, в лесу, заповедник Комарово-Заповедное, 10/VIII 1971, 1 паратип, Владивосток, Седанка, 5/IX 1971, в лесу, 1 паратип, ст. Приморская, 30.VIII 1971 на погорелых дубках, 30.VIII 1971, 6 паратипов. Голотип в коллекциях Института зоологии АН Армянской ССР.

Тело и конечности черно-бурые, матовые, верхняя губа, усики и лапки желто-бурые. На надкрыльях 3 пары более или менее четких пятен несколько изменчивых размеров, расположенные одна под другой. Чешуйки верха белые или черные. Длина 2,7—3,4 мм. Рис. 1.




Рис. 1. *Cicones ussuriensis* Khnz. sp. nov.
а — габитус; б — правый усик; в — выступ переднегруды

Глаза крупные, выпуклые, крупнофасеточные, виски короткие, по четкие, едва выпуклые, при осмотре сверху не обхватывают снаружи нижний край глаза. Лоб с неровностями, плоско неясно точечный на грубо шагренированном фоне, негусто усеян белыми и черными чешуйками. Наличник с прямолинейным передним краем. Усики (рис. 1,б) с постепенно укороченными члениками, первые четыре удлиненные, последующие округлые, 8-й и 9-й поперечные, булава крупная. Переднеспинка с острыми передними углами и тупыми задними, с изогнутым, посередине слабо выпуклым передним краем, с почти прямолинейным, зазубренным боковым краем, усаженным чешуйками, основание изогнуто, у середины выпуклое, к задним углам вогнуто. Диск с неровностями и вдавлениями, двумя слабыми вдоль середины и двумя широкими спереди вдоль бокового края, в такой же скульптуре как лоб, с такими же чешуйками, направленными большей частью поперек оси тела. Щиток маленький, поперечно-овальный. Надкрылья с правильными голыми рядами мелких точек, промежутки которых выпуклые, без следа ребер, с неправильными рядами крупных плоских точек на грубо шагренированном фоне. Чешуйки двух типов: вдоль контура такие же как вдоль бокового края переднеспинки, косые, темные, утолщенные к вершине, образуя густую кайму. На диске прилегающие, ланцетовидные, белые или черные, на каждом промежутке расположены в два неправильных ряда, направлены косо друг к другу. Преобладают белые чешуйки, местами сгущенные, по разному у разных особей и без образования определенного рисунка. Низ темный. Выступ переднегруди (рис. 1,в) образует почти четырехугольную площадку, слегка пригнутую к телу, без вдавлений, с прямолинейным задним краем, усаженным бахромой ресничек. Передние голени, как и прочие, у вершины косо срезаны. Все голени вдоль наружного бокового края густо покрыты приподнятыми чешуйками, такой же формы, как вдоль контура тела, остальная часть голеней волосистая.

Этот вид принадлежит к роду *Cicones* Curtis, в Палеарктике представленному 14 видами. От 4 европейских видов отличается уже скошенными (а не закругленными) у вершины передними голеними, по наличию чешуек на голених и вдоль контура тела, по форме висков и т. д. Прочие виды можно различать следующим образом:

- 1(2) Длина 1,5 мм. Тело короткое. Голени светлые. Япония. 1. *C. minimus* Sharp
- 2(1) Длина 1,9—3,8 мм.
- 3(4) Длина 2 мм. Переднеспинка очень широкая с белой боковой полосой. Надкрылья светлые с темными пятнами. Япония. 2. *C. niveus* Sharp
- 4(3) Тело обычно крупнее. Переднеспинка без белой полосы.
- 5(12) Надкрылья с рядами торчащих чешуек на каждом промежутке между глубокими бороздками, точки которых крупные и глубокие. Передние углы переднеспинки не выступающие.
- 6(7) Надкрылья такой же ширины, как переднеспинка, рыжие с чер-

- ными пятнами, их щетинки расположены неправильными рядами. Длина 2,2—2,5 мм. Япония
- 3. *C. bitomoides* Sharp
- 7(6) Надкрылья слегка шире переднеспинки, с правильными рядами щетинок. Верх одноцветно бурый. Передний край переднеспинки выпуклый. Первый членок усиков округлый.
- 8(9) Надкрылья в 1,5 раза длиннее общей ширины. Переднеспинка с закругленными задними углами. Длина 2,2—2,7 мм. Япония
- 4. *C. tokarensis* Nakane
- 9(8) Надкрылья в 1,7 раза длиннее общей ширины. Переднеспинка с тупыми задними углами.
- 10(11) Переднеспинка равной ширины спереди и сзади. 3-й членок усиков не длиннее ширины. Выступ переднегруди кзади расширен, с продольным вдавлением. Длина 1,9—2,8 мм. Япония
- 5. *C. hayashii* Sasaji
- 11(10) Переднеспинка слегка сужена кзади. 3-й членок усиков втрое длиннее ширины. Выступ переднегруди узкий, кзади сужен. Длина 3,8 мм. Япония. 6. *C. angustissimus* Nakane
- 12(5) Надкрылья без правильных рядов чешуек, с рядами плоских точек.
- 13(16) Надкрылья светлые с темными пятнами. Длина 3 мм.
- 14(15) Надкрылья желтые с темными пятнами. Тело уже, глаза плоские, передние углы переднеспинки выступают сильнее. Япония
- 7. *C. oblongus* Sharp
- 15(14) Надкрылья красные с черными пятнами. Япония
- 8. *C. oculatus* Sharp
- 16(13) Надкрылья черно-бурые, с желтыми пятнами или без них. Боковой край переднеспинки почти прямолинейный.
- 17(18) Надкрылья одноцветные. Переднеспинка с тупыми невыступающими передними углами, почти четырехугольная. На переднеспинке и надкрыльях чешуйки всюду прилегающие, не образуют бахромы, на голених отсутствуют. Длина 2,3 мм. Таджикистан (Гиссар) 9. *C. montanus* Foursov
- 18(17) Надкрылья темные с 3 парами светлых пятен (рис. 1). Переднеспинка острыми передними углами, кзади слабо, но четко сужена. Весь контур переднеспинки и надкрылий и наружный боковой край голени с бахромой полусторчащих чешуек. Длина 2,7—3,4 мм. Приморье
- 10. *C. ussurlensis* sp. nov.

Новый вид—первый представитель семейства узкотелок, обнаруженный на Дальнем Востоке, тогда как в Японии из этого семейства известно 29 видов.

Институт зоологии
Академии наук Армянской ССР

Նեղամարմին բզեզների նոր տեսակ Պրիմորիեից
(Coleoptera, Colydiidae)

Նկարագրվում է նոր տեսակ *Cicones ussuriensis* sp. nov. Պրիմորիեից, հայտնաբերված Կոմարովո-դապովեղնոյից, Պելչուլա բնավայրից, Վլադիվոստոկի մոտակայքի Սեդանկայից և Պրիմորսկայա կայարանից, Այս բնտանիքի առաջին տեսակն է՝ հայտնաբերված Հեոավոր Լերենիքից:

