

УДК 595.765 43

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хизорян

Новый вид жука-точильщика из Таджикистана  
(Coleoptera, Anobiidae)

(Представлено чл.-корр АН Армянской ССР Э. А. Давтяном 22/XI 1977)

*Xyletinus (Calypterus) tadzhika* Jablókoff-Khizorian sp. nov.

Таджикистан: Ванч (Бадахшан), на горном склоне в полынной полупустыне на высоте около 2400 м, 18/VI 1975, голотип, ♀, в коллекциях Института зоологии АН Армянской ССР.

Тело одноцветно светло каштаново-желтое, усики черные, их первый членик и ротовые органы желтые, щупики и ноги бурозато-желтые, волосистость светлая. Длина 4 мм. Рис. 1, а.

Лоб выпуклый, мелко густо и поверхностно точечный на блестящем шагренированном фоне. Наличник за маленькой верхней губой с вырезанным передним краем. Глаза цельные, мелкие, невыступающие, в 6 раз уже лба (при обмере спереди). Челюстные и губные щупики узкие с косо усеченной вершинной. Усики (рис. 1, б) пильчатые, их первый членик с цельным продольным черным кантом, второй слегка длиннее ширины, к вершине вздут, третий вчетверо длиннее ширины, к вершине слегка зубцевидно расширен, четвертый равносторонне треугольный, последующие, каждый, с острым зубцом, края которого прямолинейные, последний узко ланцетовидный.

Переднеспинка колоколообразная с равномерно закругленным боковым кантом, ее передние углы тупые с закругленной вершиной, боковой скат спадает косо прямолинейно, диск выпуклый, очень густо и мелко точечный и тонко прилегающе, очень коротко волосистый на гладком фоне, без более крупных точек к середине. Боковой кант без бахромки волосков. Щиток треугольный, голый, густоточечный. Надкрылья (со щитком) в 1,6 раза длиннее общей ширины, в такой же точечности, как переднеспинка, очень нежно и густо поперечно штрихованные с правильными цельными тонкими неточечными бороздками (от точек местами заметны лишь следы). Волосистость густая, очень короткая, всюду зачесана назад. Ноги узкие. Задние лапки в 1,3 раза короче голеней, их первый членик втрое короче лапки. Коготки простые. Заднегрудь

с цельной продольной бороздкой без кля. Первый видимый стернит брюшка с параболически закругленной передней лопастью и плоским задним краем.




Рис. 1. *Xyletinus tadzhika* Khnz.  
а—габитус; б—левый усик; в—левая задняя лапка

Этот вид принадлежит к подроду *Calypterus* Mulsant et Godart рода *Xyletinus* Latr., насчитывающему вместе с ним 5 палеарктических видов, в том числе 2 с Канарских островов. От 2 прочих видов новый вид можно отличить следующим образом:

- 1(2) На надкрыльях волосистость на двух первых промежутках вдоль шва зачесана косо, почти перпендикулярно к шву, точечность рядов крупная. Надкрылья в 1,6—2 раза длиннее общей ширины. Третий членик усиков треугольный, вдвое длиннее ширины. Длина 3,3—3,8 мм. Средиземноморье. . . . . *bucephalus* Ill.
- 2(1) На надкрыльях волосистость всюду зачесана назад.
- 3(4) Надкрылья сильно уплощенные, в 2,3 раза длиннее общей ширины, с цельными точечными рядами. Задний край первого видимого стернита брюшка по середине выпуклый. Длина 5,8 мм. Монголия . . . . . *elongatus* Logvinovskij
- 4(3) Надкрылья выпуклые, в 1,6 раза длиннее общей ширины, с тонкими цельными неточечными бороздками. Задний край первого видимого стернита брюшка плоский по всей длине. Третий чле-

չոք ւսիկո՞ւ ԵՉԵՐՈ ճԼԻՆԵՍ ԽԻՐԻՆԿ. ԸԼԻՆԱ 4 ՄՄ. ԿԱԶՅԻԿԻ-  
ՏԱՈՒ . . . . . tadzhika Khnz. sp. nov.

ԻՆՏԻԿՒԿ ԶՕՕԼՕԳԻՈՒ  
ԱԿԱԵՄԻՈՒ ՆԱՄԿ ԱՐՄՅԱՆՏԻԿՈՒ ՏՏՐ

Ս. Մ. ՏԱՐԼՈԿՈՎ-ԿՆՁՈՐՅԱՆ

Փայտափոռիկ բզիգի նոր տեսակ Տաջիկստանից

(Coleoptera, Anobidae)

Նկարագրված է Xyletinus (Calypterus) tadzhika Khnz. sp. nov. նոր  
տեսակ՝ հավաքված Բադախշանի Վանչ գյուղի մոտակայքից: Այս տեսակը  
Calypterus ենթասեռի առաջին ներկայացուցիչն է ՍՍՀՄ-ում:

