

УДК 595.763.79

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хнзорян

**Новый род и вид жесткокрылых-кокциnellид с Арала  
 (Coleoptera, Coccinellidae)**

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Э. А. Давтяном 22/ХІ 1977)

Род *Leptoscympnus* Jablokoff-Khuzorian gen. nov.

Щупики (рис. 1,е) типичного для трибы строения, усики прикреплены у края лба (как у рода *Scymnus* Kug.) десятичлениковые, с резко обособленной трехчлениковой булавой (рис. 1,ж). Голова может полностью прикрыть переднегрудь, у которой базистернум отсутствует (рис. 1,з), тазиковые впадины удлиненные, занимают всю ширину переднегрудки, выступ сведен к невыступающей перемычке между впадинами, почти квадратного очертания, отграниченной с боков продольными складками. Среднегрудь узкая. Заднегрудь с парой цельных дугообразных бедренных линий. Брюшко с широким выступом и цельными бедренными линиями, не достигающими заднего края их стернита и продолженными вдоль его бокового края почти до его передних углов. Лапки четырехчлениковые, их третий членик едва короче второго. Коготки с острым основным зубцом.

У ♂ сифон (рис. 1,б) прямолинейный с резким основным изгибом до короткой капсулы, снабженной острым зубцом, направленным внутрь. Его вершина (рис. 1,в) кончается крючком, под которым выступает перепонка. Тегмен (рис. 1,д) с двузубчатой трубкой и 2 изогнутыми параметрами, вершина которых коротко опушена. Трабес (рис. 1,г) прямолинейный, очень длинный.

Этот своеобразный род принадлежит к трибе *Scymnini*, ближе всего стоит к роду *Nephus* Muls. От всех прочих родов трибы отличается отсутствием базистернума, а по строению трехчлениковой булавы — от всех прочих кокциnellид. В нашу таблицу палеарктических родов трибы (1) он может быть включен следующим образом:

8a(8б) Базистернум отсутствует. Выступ переднегрудки сведен к почти квадратной плоской перемычке между тазиками, отграниченной 2 продольными складками. Рот может прилегать к груди. Усики

десятичлениковые с резко обособленной трехчлениковой була-  
вой . . . . .

*Leptoscympnus* Khnz. gen. nov.

86(8a) Базистернум имеется. Выступ переднегруди выпуклый, без боковых складок, с двумя клями или без них. Усчки постепенно расширены к вершине с нерезкой 4—5-члениковой булавой.

9(14) . . . *Leptoscympnus salsolae* Iablokoff-Khnzorian sp. nov.

Казахстан: Остров Барса-кельмес в Аральском море, 28/VIII 1976, на солянках (*Salsola* sp.) голотип и три паратипа. 16/VIII 1976, там же,




Рис. 1 *Leptoscympnus salsolae* Khnz. sp. nov.

а—габитус; б—сифон; в—его вершина; г—тегмен сбоку; д—его верхняя часть сбоку; е—правый челюстной щупик; ж—правый усик; з—переднегрудь, средне- и заднегрудь, брюшко  
ах30; г и зх60; б и ех120; дх180; е и жх240

1 паратип ♂. Все особи собраны Зориным. Один паратип в коллекциях Института зоологии АН Армянской ССР, прочие типы в Зоологическом институте СССР.

Тело черное, покрыто оветлыми волосками. Усики и щупики темно-бурые, бедра черные, голени и лапки желтые. Надкрылья за серединой с парой оранжевых пятен. Длина 1—1,3 мм. Рис. 1,а.

Голова вдвое уже переднеспинки, вдвое шире лба. Лоб едва заметно густо мелко точечный на блестящем шагреневанном фоне. Переднеспинка трапециевидная, в такой же скульптуре как лоб, примыкает к надкрыльям всем своим основанием. Надкрылья в такой же скульптуре, как лоб, густо покрыты волосками, обычно зачесанными назад, косо кнаружи на заднем скате вдоль шва на узкотреугольной площадке.

Институт зоологии  
Академии наук Армянской ССР

#### Ս. Մ. ՅԱՐԼՈԿՈՎ-ԿԼԻՆՅԱՆ

### Չափիկ բզեզների նոր տեսակ և սեռ Արալից (Coleoptera, Coccinellidae)

Նկարագրված է նոր սեռ *Leptoscymnus* Khnz. gen. nov. և նոր տեսակ *L. salsolae* Khnz. հավաքված Չլոտինի կողմից Արալյան ծովի մեկ կղզուց: Այս սեռը պատկանում է *Scymnini* տրիբային, սակայն տարբերվում է տրիբայի մնացած բոլոր սեռերից բազիստենոնումի բացակայությամբ: Նրա բեղիկները վերջանում են մեկուսացված եռահոդ գուրգով: Նման գուրգ մնացած պատիկների մոտ հայտնի չէ:

#### ЛИТЕРАТУРА — ԿՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

<sup>1</sup> S. M. Iablokoff-Klinzorian, Entomologia Germ., 2, 4, 374, 1976.