

УДК 595.769.12

М. Ю. Калашян

ЭНТОМОЛОГИЯ

Новый вид жужелиц из Армянской ССР
(Coleoptera, Carabidae)

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Э. А. Давтяном 10/X 1978)

Pristonychus arenicus Kalaschian sp. nov. Армянская ССР, Ехегнадзорский р-н, окрестности с. Арени, ущелье р. Гнишик, в карстовой пещере, около 50 м от входа, 9/V 1977 г. Голотип, самец, и аллотип, самка, в коллекциях Института зоологии АН Армянской ССР.




Рис. 1. а—общий вид; б, в—трубка пениса сбоку и сверху; г—правая парамера; д—левая парамера; е—коготок

Тело черно-бурое, конечности красно-бурые, длина 14,5—15,5 мм (рис. 1). Голова узкая, в 1,04 раза длиннее ширины (длина измерялась от переднего края наличника). Глаза едва выступают из контура головы, виски плоские, продолжают линию глаз, в 1,15 раза длиннее них. Лобные бороздки глубокие, доходят до уровня задней трети глаза. Предглазничная щетинка на уровне передней 1/3 глаз, надглазничная— за глазом, отстоит на 1/3 длины глаза. Переднеспинка в 1,03 раза длиннее ширины, ее боковой край спереди слабо выпуклый до передней 1/3, слабо вогнутый до задних углов, основание едва шире вершинной части и в 1,3 раза уже, чем у передней трети. Передние углы тупые. Задние заостренные, выступают в виде маленького зубчика. Контур переднеспинки окаймленный, кайма прервана у середины переднего края. Надкрылья в 1,5 раза шире переднеспинки, слабо уплощены вдоль средней части шва, ближе к основанию. Плечевой зубец отсутствует. Бороздки глубокие, четкие, промежутки слабо выпуклые. Все покровы верху тела в изодиаметральной шагреневке, более глубокой на надкрыльях. Эпистерны заднегруди в 1,5 раза длиннее ширины. Передние бедра уплощены снизу, с двумя ребрами, наружное ребро без следа зубца или бугорка, внутреннее ребро несет 5—8 щетинок. Средние и задние голени в последней трети с густой щеткой коротких волосков. Средние голени едва изогнуты у обоих полов. Задние тазики с 2 щетинконосными порами. Коготки почти гладкие, лишь у основания с 3—4 сглаженными зубчиками (рис. 1, e). Внешних половых признаков нет. Пенис: рис. 1 б—д.

Этот вид относится к подроду *Pristonychus* s. str., по окраске надкрылий близок к *P. piceus* Motsch. и *P. sericeus* Fisch., отличаясь от обоих меньшими размерами, продольной, а не поперечной переднеспинкой, узкой головой (у *P. piceus* голова шире длины в 1,1 раза, у *P. sericeus*—в 1,08 раза), более длинными висками (у *P. piceus* и *P. sericeus* виски длиннее глаз в 1,05 раза), более плоскими глазами и более светлой окраской конечностей. Кроме того, от *P. piceus* отличается более глубокими лобными бороздками, положением предглазничной щетинки (у *P. piceus* на уровне середины глаз), более глубокими бороздками надкрылий и выпуклыми промежутками, а от *P. sericeus*—выступающими задними углами переднеспинки.

Самостоятельность этого вида была подтверждена С. М. Яблоковым-Хнзоряном, которому мы рады выразить признательность за помощь, оказанную при составлении настоящего описания.

Ереванский государственный университет

Գնայուկ բզեզների նոր տեսակ Հայկական ՍՍՀ-ից
(Coleoptera, Carabidae)

Հոգվածում սրվում է գնայուկ բզեզների նոր տեսակի՝ *Pristonychus arenicus* Kalaschian sp. nov. նկարագրությունը: Այդ տեսակը գտնվել է Եղեգնաձորի շրջանի Արենի գյուղի մոտ կարստային քարանձավում:

Այս տեսակը պատկանում է *Pristonychus* s. str. ենթասեռին: Մոտ է *P. piceus* Motsch. և *P. sericeus* Fisch. տեսակներին, տարբերվելով նրանցից մի շարք կարևոր հատկանիշներով: