

УДК 595.768.23

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хизорян

Новый вид жесткокрылых-долгоносиков с Кавказа (Coleoptera, Curculionidae)

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР В. В. Фанарджяном 26/XI 1979)

Mylacus daghestanicus Iablokoff-Khnzorian sp. nov.

Дагестан, Хунзах, 23/V 1908, сборы Полторацкого, голотип ♂ и аллотип, в коллекциях Института зоологии АН Армянской ССР.

Тело черное или темно-бурое, усики желтые, голени и лапки темные или светлые, бедра темно-бурые, волосистость беловатая. Длина 3,5—3,6 мм. Рис. 1, а

Глаза выпуклые, выступающие, слегка конические, лоб покрыт довольно густыми, прилегающими волосками, расположенными вокруг глаз поперечно их оси, у середины лба слегка веерообразно, точечность мелкая и густая, за головотрубкой слабое треугольное вдавление, расширенное кзади. Голова сверху выглядит трапециевидной, кзади от глаз расширена, кпереди от них сужена постепенно, с прямолинейными боковыми краями, головотрубка со слабым продольным вдавлением, в такой же точечности и волосистости, как лоб. Расстояние между усиковыми впадинами втрое меньше ширины головы у глаз. Усики толстые и короткие, их рукоятка прямолинейная, такой же длины, как жгутик, постепенно и слабо расширена к вершине, 1-й членик жгутика вдвое длиннее 2-го и в 4 раза — коротких 3-го и 4-го, последующие 3 членика поперечные, булава слегка короче половины рукоятки. Переднеспинка в 1,65—1,70 раза шире длины, с равномерно закругленными боками, без основной ямки, в такой же точечности и волосистости, как лоб, волоски зачесаны косо назад и кнаружи, без пробора. Надкрылья в 1,2—1,35 раза длиннее общей ширины, со слабо закругленными боками, с правильными рядами точек, которые по крайней мере вдвое крупнее точек переднеспинки, промежутки между рядами плоские, мелко и очень рассеянно точечные и волосистые на гладком фоне, вдоль шва и по бокам тела имеются палочковидные чешуйки. Все бедра без зубца. Передние голени без вершинного зубца, но с зубчиком, направленным вниз.




Рис. 1. а—*Mylacus daghestanicus* Khnz., sp. nov., голотип, габитус; б—*M. turkestanicus* Schilsky, голотип, голова и переднеспинка; в—*M. mostarakii* Angelov, с Ям., то же; г—*M. verruca* Slev., из Армении (Джрвеж) то же; д—*M. rotundatus* F., из Армении (Джрвеж), то же; е—*M. globulus* Boh., из Житмира, то же; ж—*M. globosus* Oyll., из Кисловодска, то же; з—*M. murinus* Boh., из Украины, то же

Этот вид — типичный представитель рода *Mylacus* Schoenherr, насчитывающего вместе с ним 44 описанных вида, распространенных в основном по Средиземноморью, в особенности на Балканах, некоторые виды проникают в среднюю и восточную Европу до западной Сибири, на Кавказ, в Казахстан, в СССР пока обнаружено 8 видов, определительная таблица которых приводится ниже.

Все виды однородного габитуса, сходных размеров, их тело черное или бурое, ноги темные, часто со светлыми голеньями и лапками, у всех видов, известных из СССР, волосистость светлая и прилегающая.

От всех видов рода новый вид легко отличается по признакам, приведенным в таблице. Для ее установления мы осмотрели 3 типа *M. turkestanicus* Sch., любезно присланных нам из Берлина М. Улигом. Из них один выделен нами как голотип. Он несет 5 этикеток, с надписями: *Karagaitau turkestanicus* Schilsky* (рукой Шильского); *Myi-lacus* Sch. *turkestanicus* Schilsky, coll. Schilsky; *typus* (звездочкой Шильский, следуя Вейзе, отмечал свои голотипы). Этот тип тождествен особям, собранным нами около Алма-Аты. Два прочих типа несут по 3 этикетки, соответствующие 3 последним этикеткам голотипа, без указания местонахождения.

Определительная таблица видов рода *Myi-lacus* Schoenh. фауны СССР

- 1(12) Передние голени с тонким вершинным зубцом на внутреннем крае, отогнутым внутрь под прямым углом. Переднеспинка не более чем в 1,5 раза шире длины. Головотрубка не или едва шире длины. Рукоятка усиков заходит за основание переднеспинки (незначительно у *rotundatus*) Волосистость верха однородная, равномерная, густая или рассеянная, иногда потертая.
- 2(5) Голова сужена конически от основания до вершины.
- 3(4) Переднеспинка с прищитковой ямкой, усаженной прилегающими желтоватыми чешуйками (очень редко отсутствующей), в 1,2—1,3 раза шире длины (рис. 1, г), ее точечность едва мельче, чем на надкрыльях, фон которых шагренирован, а волосистость густая. Головотрубка без килей. Длина 2,5—3,4 мм. Степи европейской части СССР с Крымом, Кавказ, Анатолия
1. *M. verruca* Stev., 1829
- 4(3) Переднеспинка без следа ямок (как и у всех следующих видов), в 1,3—1,4 раза шире длины, ее точки гораздо мельче точек рядов надкрылий, фон которых гладкий, а волосистость рассеянная. Головотрубка с 2 четкими параллельными килями (рис. 1, д). Длина 2,4—3,1 мм. Юг европейской части СССР, Кавказ, средняя Европа
2. *M. rotundatus* F., 1792
- 5(2) Голова сужена более или менее конически до головотрубки, которая, по крайней мере дистально, параллельнобокая или расширена к вершине, без четких килей (с их следом у некоторых видов).
- 6(7) Головотрубка сужена к усиковым впадинам, здесь расширена и едва уже, чем у основания, слегка длиннее ширины. Глаза четко выступают из контура головы. Последние членики жгутика округлые (рис. 1, е). Переднеспинка в 1,3—1,5 раза шире длины.

наибольшей ширины за серединой, точечность слегка крупнее, чем в рядах точек надкрылий. Длина 2—2,7 мм. Юг европейской части СССР до Урала, Кавказ, средняя Европа

3. *M. globulus* Boh., 1843

7(6) Головотрубка к вершине едва расширена, почти равной длины и ширины.

8(9) Два последних членика жгутика поперечные. Голова резко сужена от шейки к глазам, которые четко выступают из ее контура (рис. 1, в). Переднеспинка в 1,3—1,4 раза шире длины, наибольшей ширины у середины, ее точечность заметно мельче, чем в рядах точек надкрылий. Длина 2,3—2,8 мм. Яйла

4. *M. moczarskii* Angelov, 1973

9(8) Последние членики жгутика округлые. Голова к глазам сужена слабее.

10(11) Переднеспинка в 1,45—1,5 раза шире длины, наибольшей ширины за серединой, ее точечность заметно мельче, чем в рядах точек надкрылий. При осмотре сверху глаза не выступают из контура головы, головотрубка четко расширена к основанию, без килей, ее впадины округлые (рис. 1, б). Длина 2,6—2,7 мм. Казахстан

5. *M. turkestanicus* Schilsky, 1912

11(10) Переднеспинка в 1,2—1,3 раза шире длины, наибольшей ширины почти у середины, ее точки не мельче точек рядов надкрылий. При осмотре сверху глаза четко выступают из контура головы, головотрубка не или едва расширена к основанию, со следом килей, сближенных кзади, ее впадины крупные, овальные (рис. 1, з). Длина 2,5—3 мм. СССР на юг от Москвы до юго-западной Сибири и Кавказа. Малая Азия

6. *M. murinus* Boh., 1843

12(1) Передние голени без зубца, но с зубчиком, направленным вниз. Переднеспинка в 1,6—1,8 раза шире длины, ее точечность вдвое мельче, чем в рядах надкрылий. Головотрубка намного шире длины. Рукоятка усиков не достигает основания переднеспинки. Волосистость надкрылий двойная, с волосками и палочковидными чешуйками. Голова сужена от основания до вершины, глаза сильно выступают из ее контура. Последние членики жгутика поперечные.

13(14) Надкрылья в основном голые и блестящие, вдоль шва и по контуру покрыты чешуйками и очень короткими, редкими волосками. У бедра с острым зубцом. Усики тонкие (рис. 1, ж). Ноги черные. Длина 2,5—3,7 мм. Юг Украины, Крым, северный Кавказ

7. *M. globosus* Gyll., 1834

14(13) Надкрылья густо волосистые, по бокам и вдоль шва также с чешуйками. Бедра темные, без зубца. Усики толстые и короткие,

с едва изогнутой рукояткой (рис. 1, а). Длина 3,5—3,6 мм. Да-
гестан

8. *M. daghestanicus* Khnz. sp. nov.

Институт зоологии
Академии наук Армянской ССР

В. И. ГАБРИЕЛ-БЕНДИС

Երկաթակենիք-կալթրաքների նոր տեսակ Կովկասից (Coleoptera,
Curculionidae)

Հետ 2002 թվ. Կենդանաբանության ինստիտուտի նյութերի, նկարագրված
է երկաթակենիքների նոր տեսակ — *Myiatus daghestanicus* Khnz., որը խիստ
տարբերվում է այս սեռի մյուս 43 տեսակներից: Տրված է որոշիչ աղյուսակ
ՍՍՀՄ-ից հայտնի բոլոր 8 տեսակների համար:

