

УДК 595.762.12

ЭНТОМОЛОГИЯ

М. Ю. Калашян

Новый вид рода *Pristonychus* Dej. из Армении
(Coleoptera, Carabidae)

(Представлено чл.-корр. АН АрмССР С. О. Мовсесяном 2/IX 1982)

Pristonychus khnzoriani Kalaschian sp. nov.

АрмССР, Ехегнадзорский р-н, окрестности с. Вернашен, в развалинах церкви Спитакавор, 1700 м над ур. моря, 3.VI.1979. Голотип, самец, хранится в коллекциях Института зоологии АН АрмССР. Рис. 1.

Тело черно-бурое, конечности красно-бурые, длина 12,9 мм (рис. 1,а). Голова узкая, в 1,02 раза длиннее ширины (длина измерялась от переднего края наличника). Глаза едва выступают из контура головы, виски плоские, продолжают линию глаз и в 1,08 раза длиннее их. Лобные бороздки нерезкие, достигают уровня середины глаза. Предглазничная щетинка расположена на уровне передней 1/3 глаза, надглазничная—за глазом, отстоит на 1/6 его длины. Переднеспинка едва длиннее ширины (в 1,05 раза), ее боковой край слабо выпуклый до передней 1/3, слабо вогнутый до основных углов, эти последние острые, передние углы довольно сильно выступают вперед, притупленные. Основание в 1,07 раза шире передней части и в 1,25 раза уже, чем у самого широкого места в передней 1/3. Контур переднеспинки окаймленный, кайма прервана у середины переднего края. Надкрылья в 1,6 раза шире переднеспинки, плечевой зубец не обособлен, бороздки четкие, промежутки спереди слабо, сзади сильно выпуклые. Эпистерны заднегруди в 1,5 раза длиннее ширины (длина измерялась по наружному, ширина—по внутреннему краям). Передние бедра уплощены снизу, с двумя ребрами, наружное ребро с четким бугорком, внутреннее—с немногочисленными щетинками. Средние голени едва изогнуты. Средние и задние голени с густой щеткой коротких рыжих волосков у вершины. Задние тазики с 2 щетинконосными порами. Первый членик задних лапок сверху в густой округлой точечности. Коготки мелко, но явственно зазубрены. Пенис—рис. 1,б—г.

Этот вид относится к подроду *Cryptoxenus* Motsch. рода *Pristonychus* Dej., близок к *P. hepaticus* Fald. и *P. onthoporus* Khnz., отличается от них обоим острыми основными углами переднеспинки (у *P. hepaticus* эти углы тупые, у *P. onthoporus*—прямые, притупленные); от первого из них—также выпуклыми промежутками надкрылий, скульптурой первого членика задних лапок (у *P. hepaticus* она образована негустыми вытянутыми продольно точками) и более длинными




Рис. 1. *Pristonychus khnzoriani* Kalaschian sp. nov. а—общий вид; б—трубка пениса сверху и сбоку; в—левая парамера; г—правая парамера

эпистернами заднегруди (у *P. hepaticus* эпистерны длиннее ширины в 1,33 раза). От *P. onthorogus* отличается едва изогнутыми средними голеньями самца, слабыми лобными бороздками и более короткими эпистернами заднегруди (у *P. onthorogus* эпистерны длиннее ширины в 1,8 раза).

Самостоятельность этого вида подтверждена С. М. Яблоковым-Хизоряном, оказавшим большую помощь при составлении настоящего описания.

Ереванский государственный университет

**Pristonychus Dej. սեռի նոր տեսակ Հայաստանից
(Coleoptera, Carabidae)**

Հողվածում տրվում է գնալուկ բզեզների նոր տեսակի՝ *Pristonychus khnzoriani* Kalaschian sp. nov. նկարագրությունը: Այդ տեսակը գտնվել է Եղեգնաձորի շրջանի Վերնաշեն գյուղի մոտակայքում՝ Սպիտակավոր եկեղեցու ավերակներում:

Այս տեսակը պատկանում է *Pristonychus* Dej. սեռի *Cryptoxenus* Motsch. ենթասեռին: Մոտ է *P. hepaticus* Fald. և *P. onthoporus* Khnz. տեսակներին, տարբերվելով նրանցից մի շարք կարևոր հատկանիշներով: