

УДК 595.767.29

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хизорян

Новый вид жуков-чернотелок из Армянской ССР
(Coleoptera, Tenebrionidae)

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР С. О. Мовсисяном 2/IX 1982)

Laena bogatschevi Iablokoff-Khuzorian, sp. nov.

АрмССР: Шамлуг, в лесу у границы Грузии, 3.VI.1949, под камнем. Голотип, ♀, хранится в коллекциях Института зоологии АН АрмССР.

Тело и бедра черно-бурые, усики бурые, щупики, голени и лапки желто-бурые, волосистость светлая. Длина 6,5 мм. Рис. 1.

Голова поперечная, лоб густо грубо и неравномерно точечный, в негустых коротких волосках на гладком и блестящем фоне, расстояние между точками в среднем меньше их диаметра. Боковой край лба над местом прикрепления усиков приподнят блестящим бугорком, из-




Рис. 1. *Laena bogatschevi* Khnz., sp. nov.,
голотип, габитус

нутри отграниченным вдавлением. Глаза слабо выпуклые, виски очень короткие, кзади не суженные, очень слабо выпуклые. Верхняя губа узкая мелкоточечная и волосистая. Последний членник челюстных щупиков типичной для этого рода формы, крупный и равносторонне-треугольный. Усики толстые, коротковолосистые, все их членики удлиненные и тем более, чем они ближе к вершине. Переднеспинка слабо выпуклая, с дугообразно вырезанным передним краем до острых передних углов, ее боковой край слабо закругленный, с цельной каймой, без бороздки, задние углы тупые и резкие, основание слабо дуговидно изогнутое, без каймы. Диск коротко мелко негусто волосистый и грубо густо неравномерно и вдавленно точечный на гладком фоне, в среднем точки отстоят на диаметр. Щиток широко треугольный, расположен на шейке надкрылий, которая резко отграничена от их отвесно спадающего переднего ската. Плечи широко закругленные. Надкрылья почти овальные, слабо расширены за серединой, без зубчиков или бугорков, мелко коротко и почти прилегающе волосистые, с равномерными рядами глубоких, голых мелкоточечных бороздок. Между бороздками промежутки выпуклые, с одним неправильным рядом точек и с дополнительной точечностью, вдоль бокового края с несомненно равномерным рядом крупных точек на гладком и блестящем фоне. Кзади надкрылья сужены треугольно, пришовный угол острый, с вогнутым боковым краем, первая бороздка цельная, вторая и третья слегка укорочены, следующие бороздки укорочены сильно. Все бедра толстые, без зубцов, голени изогнуты дугообразно, без зубцов или зазубрин.

Этот вид—типичный представитель подрода *Laena* s. str. рода *Laena* Latr., в Армении представленного кроме него лишь двумя видами. От всех видов подрода, кроме *L. starcki* Reitt. с Черноморского побережья Грузии, легко отличается габитуально, острыми передними углами переднеспинки и волосистостью, от *L. starcki* отличается уже более широким и коренастым телом и не приподнятыми волосками на надкрыльях. Этот вид также обнаружен покойным А. В. Богачевым в центральной Грузии и назван его именем.

Институт зоологии
Академии наук Армянской ССР

Ս. Մ. ՅԱՐԼՈՒՈՎ-ԽԵՉՈՐՅԱՆ

ՍԵՎԱՐՄԻՆ-ԲԳԵՂՆԵՐԻ ՆՈՐ ՍԽՍԱԿ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ԻՑ
(Coleoptera, Tenebrionidae)

Նկարագրված նոր տեսակը՝ *Laena bogatschevi* Klnz. հայտնաբերվել է Շամլուղի մոտակայքի անտառում Վրաստանի սահմանի մոտ։ Այս տեսակը սնվածնել ենք հանգուցլալ Ս. Վ. Բոգաչևի անունով։ Նկարագրված տեսակը Հայկական ՍՍՀ-ում ալդ սևոի երրորդ ներկայացուցիչն է։