ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

УДК 581.522.4

В. В. Казарян, С. А. Саркисян

Сезонные количественные изменения АТФ и углеводов
 в древесных интродуцентах

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. О. Казаряном 18/V 1983)

Адаптивная реакция древесных интродуцентов на зимние неблагоприятные факторы, как известно, выражается в накоплении в тканях растений значительного количества трофических соединений, которые служат энергетическим материалом и, расходуясь в процессе дыхания, способствуют повышению зимостойкости растений (1, 2). Существенная роль в обеспечении зимостойкости и жароустойчивости растений принадлежит также фосфорорганическим соединениям, в частности АТФ (3-5).

Эти энергетические материалы накапливаются во всех живых тканях, но гораздо больше в однолетних побегах, которые будучи новообразованными и молодыми органами сравнительно слабо адаптированы к экстремальным условиям и больше нуждаются в защитных веществах, особенно в неблагоприятный для вегетации сезон—зимой.

Исходя из прежних наших работ (6-8) мы предположили, что активность адаптивных реакций древесных, интродуцированных в Ереванский ботанический сад из различных географических широт, должна соответствовать амплитуде изменения климатических условий старого и нового местообитаний, иначе растения, перенесенные из более теплых географических местностей, должны показать большую предзимнюю подготовку, чем те виды, условия природных местообитаний которых больше схожи с новыми.

С целью экспериментальной проверки этого предположения нами изучены 14 видов древесных растений, интродуцированных в Ереванский ботанический сад. Для сравнения наряду с интродуцентами исследовались местные кавказские растения, обитающие в природной флоре Армении.

Изучаемые интродуценты мы разделили на три группы: в первую группу вошли виды, связанные своим происхождением с Юго-Восточной и Средней Азией; во вторую—виды, широко распространенные в европейской части СССР; третью группу составили виды, распространенные на Кавказе.

I группа: *Populus bolleana* Lauche (тополь Болое), *Broussonetia papyrifera* (L.) L. Herit (бруссонетия бумажная), *Catalpa ovata* G. Don (катальпа овальная), *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. (хеномелес японский);

II группа: *Quercus robur* L. (дуб черешчатый), *Ulmus laevis* Pall. (ильм гладкий), *Lonicera tatarica* L. (жимолость татарская), *Acer tataricum* L. (клен татарский), *Populus deltoides* auct. non Marsch (тополь дельтовидный);

III группа: *Quercus macranthera* Fisch. et Mey. (дуб крупнопольниковый), *Tilia caucasica* Rupr. (липа кавказская), *Lonicera caucasica* Pall. (жимолость кавказская), *Betula litwinowii* A. Doluch. (береза Литвинова), *Populus gracilis* Crossh. (тополь стройный, встречающийся на Кавказе только в культуре).

Аналізу подвергались однолетние побеги интродуцентов. В них определялось как содержание АТФ люциферин-люциферазным методом (9), так и разных форм углеводов и азота (10).

Проведенные исследования по определению содержания углеводов в тканях однолетних побегов интродуцентов показали, что количество сахаров всегда больше в побегах среднеазиатских видов, которые будучи менее холодостойкими в новых условиях существования, где зима характеризуется сравнительно большей продолжительностью и низкой температурой, приобрели новую адаптивную реакцию — в их тканях накапливается больше сахаров для повышения зимостойкости (рис. 1). В этом отношении кавказские и европейские представители почти не отличаются друг от друга.

Рис. 1. Динамика содержания растворимых (а) и суммы (б) углеводов в однолетних побегах древесных интродуцентов. Заштрихованная часть — I группа, темная часть — II группа, светлая часть — III группа

Аналогичная закономерность обнаружена в содержании общей суммы углеводов в опытных растениях в летний и осенний периоды.

Интересные на наш взгляд данные были получены в отношении содержания АТФ в однолетних побегах древесных интродуцентов. АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) принадлежит решающая роль в энергетическом обмене растительных организмов. Молекула АТФ способна запасать энергию, которая в дальнейшем потребляется в процессах обмена веществ (11, 12).

Как видно из рис. 2, содержание макроэргических соединений оказалось в минимуме весной, и существенной разницы в их количестве у интродуцентов разных групп не обнаружено. Летом количество АТФ значительно увеличивается у европейских представителей и гораздо меньше у среднеазиатских. Осенью их содержание достигает максимума, т. е. увеличивается в 10,2 раза у европейских видов, у среднеазиатских—в 5 и у кавказских—в 1,5 раза.

Таким образом, следует допустить, что для повышения приспособляемости к зимним температурам в тканях европейских и среднеазиатских представителей накапливается больше АТФ, тогда как кавказские виды будучи более приспособленными к местным условиям заблаговременно прекращают рост и подготавливаются к обычным для них зимним условиям. Представители европейской флоры в отношении общей зимостойкости, разумеется, больше отличаются от кавказских, однако наследственно у них выработана сильно выраженная приспособительная реакция, и хотя они в новых условиях проявляют гораздо более повышенную устойчивость, но продолжают реализовывать своиственные им наследственные особенности и накапливают в тканях больше макроэргических соединений.

Рис. 2. Динамика содержания АТФ в однолетних побегах древесных интродуцентов

Рис. 3. Динамика содержания белкового азота в однолетних побегах древесных интродуцентов

В зимний период эти соединения энергично расходуются, и их количество у среднеазиатских и кавказских представителей почти выравнивается, в то время как в тканях европейских содержание АТФ остается чуть больше.

В отношении же белкового азота (рис. 3) обнаружена иная картина: летом его содержание у среднеазиатских и европейских видов больше, чем у кавказских. Осенью его количество у представителей I и III групп понижается, а зимой обнаруживаются лишь следы. Однако у кавказских видов отмечается их преобладание. В данном случае белковые соединения наравне с углеводами и АТФ также принимают активное участие в повышении зимостойкости растений, что показано еще раньше (13, 14).

Таким образом, как мы видим из приведенных данных, трофические соединения, участвующие в повышении зимостойкости древесных интродуцентов, в осенне-зимний период претерпевают неравномерные количественные изменения. Наибольшая амплитуда подобного изменения обнаруживается у макроэргических соединений, наименьшая — у белков. Углеводы в этом отношении занимают промежуточное положение. Величина указанных амплитуд у определенных нами в растениях соединений по сути дела может являться определяющим показателем степени их участия в процессах повышения зимостойкости растений. Исходя из этого положения мы вправе констатировать, что макроэргическим соединениям следует приписать преимущественное значение в повышении зимостойкости.

Подобное заключение в отношении белковых соединений, однако, может с первого взгляда вызвать законное возражение, если учитывать, что именно белки являются основой жизни. В данном случае речь идет не о конституционных белках, являющихся структурными компонентами живой клетки, а о тех запасных фондах белков, которые накапливаются в тканях и служат энергетическим источником для жизнедеятельности растений в неблагоприятных условиях их существования.

Институт ботаники
Академии наук Армянской ССР

Վ. Վ. ՂԱԶՈՐՅԱՆ, Ս. Ի. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԱԵՖ-ի և ածխաջրերի սեզոնային փոփոխությունները ինտրոդուկցված ծառատեսակների մոտ

Ծառաթփային ինտրոդուցենտների հարմարողականության ուսումնասիրության շրջանում անհրաժեշտ պայմանների նկատմամբ արտահայտվում է բույսի հյուսվածքներում կուտակվող տրոֆիկ միացությունների քանակով, որն օգտագործվում է որպես էներգիայի նյութ և ծախսվում է շնչառության պրոցեսում, նպաստելով բույսերի ձմռանը հարմարողականությանը:

Մեծ դեր է խաղում բույսերի ձմռանը հարմարողականության բարձրացման պրոցեսում նաև ԱԵՖ-ի քանակությունը:

Մեր ուսումնասիրություններն աշխարհագրական տարբեր ծագում ունեցող 14 տեսակի ինտրոդուկցված ծառատեսակների հետ ցույց են տվել, որ բույսերի ձմռանը հարմարողականության բարձրացմանը առավելագույն դեր է խաղում մակրոէրգիկ միացությունների (ԱԵՖ) պարունակությունը միամյա ճյուղերում, համեմատած ածխաջրերի և սպիտակուցային միացությունների քանակության հետ:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- ¹ И. И. Туманов, Физиологические основы зимостойкости культурных растений, Сельхозгиз, М.—Л., 1940. ² В. З. Гулисашвили, А. А. Камделак, Е. Е. Капанадзе, Превращение запасных веществ у древесных растений в связи с зимостойкостью, Мецниереба, Тбилиси, 1979. ³ О. К. Северова, в сб.: Физиологические основы приемов

повышения продуктивности и устойчивости растений в Сибири, Наука, Новосибирск, 1963. ⁴ Г. Д. Боржковская, И. В. Страхов, в сб.: Устойчивость растений к низким положительным температурам и заморозкам и пути ее повышения, Наука, М., 1969. ⁵ В. Ф. Альтергот, К. П. Волгина, А. Н. Новоселова и др., в сб.: Физиологические механизмы регуляции приспособления и устойчивости у растений, Наука, Новосибирск, 1966. ⁶ В. В. Казарян, Бюллетень ГБС, вып. 11 (1979). ⁷ В. В. Казарян, С. О. Закарян, Л. Н. Оганесян, Биол. журн. Армении, т. 35, № 8 (1982). ⁸ В. В. Казарян, С. О. Закарян, ДАН АрмССР, т. 67, № 1 (1978). ⁹ М. Е. Ладыгина, А. Б. Рубин, в сб.: Биофизические методы в физиологии растений, Наука, М., 1971. ¹⁰ А. И. Белозерский, И. И. Проскуряков, Практическое руководство по биохимии растений, Советская наука, М., 1951. ¹¹ А. И. Кретович, Основы биохимии растений, Высшая школа, М., 1971. ¹² Б. А. Рубин, Физиология растений, Советская наука, М., 1961. ¹³ Л. И. Сергеев, К. А. Сергеева, В. К. Мельников, Морфо-физиологическая периодичность и зимостойкость древесных растений, Уфа, 1961. ¹⁴ И. В. Кандарова, в сб.: Физиология зимостойкости древесных растений, Наука, М., 1964.