

УДК 595.772

ЭНТОМОЛОГИЯ

В. А. Рихтер

**Новый вид ктырей рода *Andrenosoma* Rd. (Diptera, Asilidae)
из Закавказья**

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР С. О. Мовсисяном 25/V 1984)

Переданный автору на определение материал по ктырям, выведенным из куколок в ветках астрагала в Нахичеванской АССР, оказался принадлежащим к ранее не описанному виду рода *Andrenosoma* Rd. Его описание приводится ниже. Весь типовый материал, включая голотип, хранится в коллекции Зоологического института АН СССР, в Ленинграде. Автор глубоко признателен Н. П. Кривошеиной за предоставление ценного материала.


Andrenosoma valentinae V. Richter, sp. n.

Глазковый бугорок сзади, поверхность темени вокруг него и верхняя часть задней поверхности головы черные, блестящие. Лоб, глазковый бугорок спереди, темя по бокам и задняя поверхность головы в нижней части покрыты густой белой пылью. Лицо также покрыто густой белой пылью, за исключением продольной срединной блестящей черной полосы, достигающей основания усиков. Лоб по бокам в желтовато-белых или белых волосках; глазковые щетинки белые. Лицевая борода желтовато-белая, с примесью одной (голотип) или нескольких черных длинных щетинок в ее верхней части. Хоботок снизу в длинных белых волосках; щупики в черных, смешанных с белыми волосках; бакенбарды белые; затылочные щетинки белые, смешанные с черными. Усики черные; их базальные членики в белых, смешанных с черными волосках и щетинках. 1-й членик усиков в 1,7—2 раза длиннее их 2-го членика; 3-й членик в 1,5—1,8 раза длиннее 1—2-го члеников, вместе взятых, у 1 самки дорсально с 1 щетинкой (рис. 1, 1').

Среднеспинка черная, блестящая, преимущественно белых коротких стоячих волосках, не образующих густого покрова, с 2 довольно узкими продольными полосами белой пыли, изогнутыми медно-красно к переднему краю среднеспинки и достигающими его; их задний край доходит до уровня основания крыльев. Развиты также короткая боковая полоса белой пыли по боковому краю среднеспинки над основанием крыльев и поперечная полоса белой пыли вдоль заднего края среднеспинки. Боковые щетинки черные. Щиток черный, блестящий, узко окаймлен полосой белой пыли по переднему краю, перед задним краем с несколькими стоячими белыми или черными во-

лосками, по заднему краю с 5—6 белыми или черными тонкими щетинками. Бочки груди, за исключением желтых гипоплевр, черные, а торчащих белых волосках, покрыты густой белой пылью; лишь мезоплевры черные, блестящие, с полосой белой пыли по их верхнему краю.

Передние и средние ноги черные, в белых волосках и белых, смешанных с черными щетинках. Задние тазики и вертлуги буровато-желтые. Задние бедра сильно утолщены, желтые, с черной вершинной третью. Голени также утолщены, черные, с красноватой вентральной полосой. Лапки черные; коготки черные, пультвиллы желтые.



Крылья (рис. 1, 2) слегка сероватые, стебелек первой радиальной ячейки удлинённый. 1-я заднискрайняя ячейка узко открытая; 4-я заднискрайняя и апальная ячейки стебельчатые. Жужжальца желтые.

Брюшко полностью красновато-желтое, блестящее, в коротких тонких волосках, вдоль середины тергитов с преобладанием черных, по бокам—с преобладанием белых волосков. 2—5-й тергиты по бокам на уровне середины длины с 1 черной или желтой дискальной щетинкой. У 1 самки 2—5-й тергиты по бокам с буроватой каймой.

Гипопигий повернут на 180°, желтый, с бурыми церками и дистальными члениками гонопод. Дистальный членик гонопод на вершине широко полукругло вырезан, с более узким вентральным и более широким дорсальным выступами (рис. 1, 3).

Длина тела 6—8,2 мм.

Материал. Нахичеванская АССР, Бичнек, на личинках златки *Anthaxia Igockii* Obenberger в ветках астрагала, 12. VII 1982, 1♂—голотип, 1♀ (Холина). Там же, с такой же этикеткой, 9. VII 1982, 1♀, 13. VII 1982, 1♀ (Холина).

От известных палеарктических видов рода *Andrenosoma* *A. valentinus* sp. n. отличается полностью красным брюшком и формой дистального членика гонопод (1).

Вид назван именем энтомолога В. Н. Логвиненко.

Зоологический институт
Академии наук СССР

Andrenosoma Rd. սեռի գիշաճանճների (Diptera, Asilidae)
նոր տեսակ Անդրեյովկայից

Հոգվածում նկարագրվում է գիշաճանճների նոր տեսակ — *Andrenosoma valentinae* sp. n. որը համեմատվում է հարակից տեսակների հետ: Բերված են հիմնական հատկանիշների նկարները:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- ¹ Э. Cezu, Rev. Franc. Ent., v. 19, p. 192—196 (1952).