

УДК 595.792

ЭНТОМОЛОГИЯ

К. А. Джанокмен, Е. К. Эртевян


Новый для фауны СССР вид рода *Systasis* Walker
 (Hymenoptera, Pteromalidae)

(Представлено чл.-корр. АН АрмССР С. О. Мовсисяном 5/III 1986)

Из Англии в 1834 г. был описан *Systasis annulipes* (¹). Грэхем (²) свел в синоним этого вида описанный Боучеком (³) из Чехословакии *Systasis* (*Systasina*) *clavicornis* Bouček. Поскольку в отечественной литературе отсутствуют какие-либо сведения об этом виде, а описание, сделанное Уокером в прошлом веке, предельно коротко, мы сочли возможным привести здесь переописание *Systasis annulipes* (Walker).

Systasis (*Systasina*) *annulipes* (Walker, 1934) (рисунок, а—в)

С а м к а. Голова в 2 раза шире длины. Расстояние между задними глазками в 2,8 раза больше расстояния между задним глазком и краем



а—*Systasis* (*Systasina*) *annulipes* Walker—♀: а—усик; б—взрослое насекомое; в—переднее крыло

глаза. Успки (рисунк. а) 12-члениковые (11253). булавовидные, при-
членяются значительно выше уровня нижнего края глаз, ближе к перед-
нему краю наличника, чем к срединному глазку. Основной членик не
достигает уровня срединного глазка, в 3,7 раза длиннее своей наиболь-
шей ширины и в 1,8 раза длиннее поворотного членика. Колечки сильно
поперечные. 1-й членик жгутика усика равен половине длины 2-го чле-
ника жгутика. 2-й—5-й членики жгутика поперечные, особенно 5-й.
Булава по длине равна четырем предшествующим членикам жгутика.
Второй шов булав кривой. Передний край наличника усеченный. Ман-
дибулы 3-зубые, с усеченным верхним зубом.

Тело стройное (рисунк. б). Переднеспинка закругленная, очень
короткая. Параспидальные борозды полные и глубокие. Щитик без
френальной борозды, в 4,5 раза длиннее промежуточного сегмента.
Диск передних крыльев равномерно опущенный (рисунк. в), без голых
участков между радиальной и постмаргинальной жилками и ниже
стигмы. Зеркальце большое, снизу закрытое. На верхней поверхности
крыла оно простирается до радиальной жилки в виде узкой полоски
ниже маргинальной жилки. Базальная жилка опущенная. Базальная
ячейка с несколькими щетинками на вершине и с рядом щетинок вдоль
кубитальной жилки. Ряд длинных щетинок расположен ниже марги-
нальной жилки на нижней поверхности крыла. Костальная ячейка с
рядом щетинок по наружному краю и с несколькими щетинками в
дистальной трети. Краевая бахромка длинная. Маргинальная жилка в
1,4 раза длиннее постмаргинальной, последняя в 2 раза длиннее ра-
диальной.

Брюшко ланцетовидное, в 3,4 раза длиннее своей наибольшей ши-
рины, длиннее головы с грудью. Ножны яйцеклада заметно выступают
за вершину брюшка. Выступающая часть ножен длиннее 1-го членика
задних лапок. Пигостилярные щетинки одинаковой длины.

Тело зеленое, с металлическим блеском. Основной членик зеленый
с сильным металлическим блеском. Поворотный членик и жгутик усика
бурые со слабым зеленым металлическим отблеском. Тазики цвета
тела. Вершины бедер и основания голеней желтовато-белые, остальные
части бедер и голеней буро-зеленые, металлически блестящие. Лапки
светло-бурые. Скульптура головы и груди сетчатая, скульптура брюш-
ка, в том числе его 1-го видимого тергита, кожистая. Промежуточный
сегмент и бока заднегруди со сглаженной сетчатой скульптурой, блестя-
щие. Эпистерны и эпимеры среднегруди гладкие и блестящие со сле-
дами стертой кожистой скульптуры.

Длина тела 2,3 мм.

Биология неизвестна.

Распространение. Армения: Абовянский р-н, Каладиби, 9/VII 1982,
(1 ♀), Горисский р-н, Тасский перевал, 12/VII 1983, (1 ♀) (Эртевян).
Англия, Чехословакия, Венгрия.

Институт зоологии
Академии наук Армянской ССР

ՍՍՀՄ ֆաունայի համար Systasis Walker (Hymenoptera,
Pteromalidae) սեռի նոր տեսակ

Հոգվածում տրվում է Հալաստանում հայտնաբերված ՍՍՀՄ ֆաունայի
համար նոր տեսակի՝ Systasis (Systasina) annulipes Walker նկարագրու-
թյունը:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- ¹ F. Walker, Entomol. Mag., v. 2, p. 148—179, 286—309, 340—369 (1834) ² M
W. R. de V. Graham, Bull. Brit. Mus. (natur. Hist.). Entomol., suppl. 16, p. 1—908
(1969). ³ Z. Bouček, Sb. ent. Odd. nár. Mus. Praze, v. 30, p. 305—330 (1955).