ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

LXXXIII 1986 4

УДК 595.792

энтомология

К. А. Джанокмен, Е. К. Эртевцян

Виды рода Callocleonymus Masi (Hymenoptera, Chalcidoidea, Pteromalidae) в фауне СССР

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР С. О. Мовсесяном 26/V 1986)

Род Callocleonymus описан Мази [1] из Африки (Сомали). Типовым видом этого рода является Callocleonymus pulcher Masi. Керич [2] описал второй вид рода—Callocleonymus ferrierei Kerrich, выведенный в Китае из Curculionidae. Впоследствии, исследуя два котипа C. pulcher, обнаруженные Доменикини в музее в Генуе, Керич [3] уточнил дифференциальный диагноз вида. Экземпляры из Наталя (ЮАР), выведенные из предкуколки Pseudagrilus dubius Ob. (Buprestidae), Керич определил как C. pulcher.

Первая находка представителя этого интересного рода в нашей стране была сделана в Армении. Будучи в СССР, чешский хальцидолог Боучек определил обнаруженную в Ереване, в ходах с личинками златки Tropeopeltis anthaxoides Reitt., самку как Callocleonymus sp. aff ferrierei Kerrich [4].

Учитывая своеобразную морфологию рода Callocleonymus Masi, его определенную связь с ксилофагами и отсутствие сведений о видах рода в отечественной литературе, кроме краткого упоминания в статье А. С. Аветян и др. [4], мы сочли возможным привести здесь описание экземпляра из Туркмении, определенного нами как C. pulcher. К сожалению, у экземпляра Callocleonymus sp. aff ferrierei Kerrich из Армении отсутствует голова, что не позволяет дать описание этой формы.

Callocleonymus pulcher Masi (рисунок, *а—в*)

Материал. Туркмения: Ашхабадский р-н, 40 лет ТССР, паразит златки (Buprestidae) на лохе, 15 VIII 1983, 1 ♀ (Васьков).

Самка. Голова почти в 2 раза шире длины. Расстояние между задними глазками (POL) в 2,6 раза больше расстояния между задним глазком и краем глаза (OOL). Усики причленяются чуть ниже уровня нижнего края глаз. Лоб выпуклый. Щеки вздутые. Внутренние края глаз книзу расходятся почти под углом в 45°. Передний край наличника ровный. Усик 11-члениковый (11171) (рисунок, *а*). Колечко поперечное, в 2 раза шире длины. 1-й членик жгутика несколько длиннее ширины, в 2 раза длиннее колечка, около 2/3 длины 2-го членика жгутика. 2-й членик жгутика около 3/4 длины 3-го членика жгутика, 3-й—5-й членики жгутика одинаковой длины и в 2 раза длиннее своей ширины; 6-й и 7-й членики жгутика квадратные.

Булава заостренная, ее вершина в виде маленького коготка. Палочковидная сенсилла булавы почти достигает уровня ее вершины. Палочковидная сенсилла на вершине 7-го членика жгутика слегка короче длины этого членика.

Грудь сильно уплощенная. Переднеспинка длинная, слегка ко-

Callocleonymus pulcher Masi —♀: *а*—усик; *б*—переднее крыло; *в*—общий вид тела

роче своей ширины, длиннее среднеспинки, измеренной посредине. Среднеспинка плоская, без выраженных парапсидальных борозд, почти одной длины со щитиком. Щитик плоский, в основании суженный, без френальной борозды. Промежуточный сегмент почти одной длины со щитиком, без шейки, с очень слабыми боковыми складками. Переднее крыло на рисунке, *б*. Маргинальная жилка в 3,5 раза длиннее радиальной, которая равна постмаргинальной. Базальная жилка голая. Базальная ячейка с продольным рядом щетинок. Костальная ячейка очень узкая, в 22 раза длиннее ширины, с щетинками на вершине и в основании. Диск крыла за зеркальцем в густом опушении.

Брюшко стебельчатое, овальное, в 1,6 раза длиннее ширины, немного длиннее груди. Общий вид тела на рисунке, *в*.

Окраска тела черно-зеленая. Голова и грудь с сильным бронзовым блеском. Темя, промежуточный сегмент и брюшко с фиолетовым отблеском. Жгутик усика коричневый с постепенным потемнением к вершине. Булава почти черная. Основной членик рыжеватый. Передние крылья с большим темным пятном ниже маргинальной и стигмальной жилок вплоть до заднего края крыла. Тазики рыжие. Остальная часть ног, кроме лапок средней и задней пар, тоже рыжие, но с присутствием коричневого тона в окраске задних бедер и всех пар голеней. Средние и задние лапки, кроме их последнего членика, белые. Задние голени с двумя шпорами. Стебелек брюшка бледно-желтый.

Скульптура головы и груди сетчато-пунктированная. Скульптура

темени более сглаженная и более блестящая по сравнению с остальной частью головы. Переднеспинка и щитик с более мелкояченистой скульптурой. Аксиллюлы гладкие и блестящие. Проксимальная треть средней зоны промежуточного сегмента грубоскульптированная, остальная часть средней зоны зеркально-блестящая, гладкая. Бока груди сетчато-пунктированные, с гладкими и блестящими участками ниже места прикрепления передних и задних крыльев. 1-й и 2-й видимые тергиты брюшка гладкие, остальные—с кожистой скульптурой. Длина тела 2,6 мм.

Институт зоологии
Академии наук Армянской ССР

Կ. Ա. ՋԱՆՈԿՄՆՆ, Ե. Կ. ՀԵՐԹԵՎՑՅԱՆ

Gallocleonymus Masi (Hymenoptera, Pteromalidae) սեռի տեսակներ՝ ՍՍՀՄ ֆաունայում

Հոդվածում տրվում է Gallocleonymus Masi *սեռի տեսակներ ՍՍՀՄ ֆաունայում և* C. pulcher Masi *տեսակի նկարագրությունը։*

ЛИТЕРАТУРА—ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

[1] *L. Masi*, Boll. Lab. Ent. agr. Portici, v. 3, p. 247—324 (1940). [2] *J. G. Kerrich*, Eos, t. 33, cuad. 1—4, p. 269—273 (1957). [3] *J. G. Kerrich*, Eos, t. 36, cuad. 3, p. 373—374 (1940). [4] *А. С. Аветян, В. А. Тряпицын, Е. К. Эртевцян*, Зоол. сб. АН АрмССР, вып. 17, с. 33—86 (1976).