

УДК. 595.766.17

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хнзорян

Новый вид жесткокрылых-малашек с Алтая  
(Coleoptera, Malachidae)

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР С. О. Мовсисяном 6/VII 1987)

*Trog'ocolops eversti* Jabl'okoff-Khnzorian sp. nov.

Голотип: самка: РСФСР, Алтай, Чуйский тракт, км 490. около Курая, на высоте около 2000 м над ур. м., 23/VI 1966, в колл. Ин-та зоологии АН Армянской ССР. Рис. 1 и 2.




Рис. 1. *T. eversti* nov. Рис. 2. *T. obscuricornis* Motsch.

Тело и усики черно-бурые, матовые, волосистость светлая, надкрылья со слабым фиолетовым отливом. 3 первых членика усиков осветлены, верхняя губа желтая, бедра черно-бурые, голени и лапки слегка осветлены. Длина 6 мм.

Лоб уплощен. очень густо точечный на шагренированном, но блестящем фоне, покрыт короткими прилегающими волосками, длинные виски с пучком длинных торчащих волосков. Последний членик че-

люстных щупиков сильно треугольно расширен. Усики узко четковидные, кажутся, как обычно у этого рода, 10-члениковыми, так как 2-членик спрятан под 1-м. Все членики удлиненные, 1-й изогнут слабо, у вершины обрублен, 4-й слегка короче 3-го и 5-го, который расширен треугольно. Переднеспинка поперечная, почти 4-угольная, со слабо выступающими передними и закругленными задними углами, с выпрямленным боковым краем, в такой же скульптуре и волосистости, как лоб. Щиток маленький, прикрыт краем переднеспинки. Надкрылья расширены кзади, с закругленными, но выраженными плечами, без плечевых бугорков, их боковой край почти прямолинейный до косо закругленной вершины, с бахромой косо торчащих щетинок, пришовный угол закруглен, шов узко приподнят по всей длине, у вершины коротко зияющий. Покровы очень густо и нежно поперечноморщинистые, со следами точечности, в короткой приподнятой волосистости. Из-под надкрылий выступают пигидий и пропигидий.

Ноги типичного для этого рода строения, задние голени изогнуты дугообразно, прочие прямые, коготки с острым основным зубцом.

Этот вид является типичным представителем рода *Troglocolops* Wittmer, 1965, распространенного от Средней Азии до Камчатки, согласно последней ревизии (1) насчитывающего 12 видов; экология неизвестна, но имаго считается пыльцеедом, встречается обычно на горных лугах, летом на разных цветах. От нового вида большинство прочих отличается уже по окраске, но трое из них окрашены сходно. Некоторые виды описаны по самцам, лоб которых несет специфические рельефы, но усики у обоих полов одинаковые, что позволяет определять и самок. От сходно окрашенных видов новый отличается по следующим признакам:

- 1(2) Переднеспинка со срединной бороздкой. 3,8—4 мм. Монголия, Восточная Сибирь до Амура . . . . . *T. sulcithorax* Pic, 1914
- 2(1) Переднеспинка без бороздки, но иногда с вдавлениями.
- 3(6) Виски голые и очень короткие. 3-й членик усиков сильно закругленно расширенный. Боковые края переднеспинки закругленные, с закругленными углами.
- 4(5) 3-й членик усиков расширен сильно, последующие расширены меньше, постепенно сужены до предпоследнего, 2-й членик заметен. 3,8 мм. Лена . . . . . *T. niger* Wittmer, 1979
- 5(4) 3-й членик усиков лишь немного крупнее 4-го, последующие до 10-го сходные, короче длины (рис. 2). 4—4,5 мм. От Алтая до Камчатки . . . . . *T. obscuricornis* Motsch., 1860
- 6(3) Виски длинные, с пучком волосков. Все членики усиков удлиненные, 3-й и 4-й узкие, почти цилиндрические, 5-й шире прочих. Боковой край переднеспинки выпрямлен, со слабо выступающими передними углами (рис. 1). 6 мм. Алтай ... *T. eversti* Klinz.sp. nov.

Институт зоологии  
Академии наук Армянской ССР

Կարծրարև-մալախիդների նոր տեսակ Ալթայից  
(Coleoptera, Malachidae)

Հստ մեկ էգի Ալթայից նկարագրված է նոր տեսակ՝ *Troglocolops ever-*  
*si* Khnz. sp. nov.: Այս տեսակը շատ մոտ է Ալթայում սովորական *T. obs-*  
*curlicornis* Motsch. տեսակին:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

<sup>1</sup> A. M. V. Evers, Synopsis der Gattung *Apalochrus* Er. und der verwandten Gattungen der Welt. Musée r. Afrique Centrale, Tervuren, Sci. Zool., p. 253 (1987).

