УДК 517.53

МАТЕМАТИКА

В. И. Гаврилов, В. С. Захарян

Признаки нормальности семейств голоморфных отображений

(Представлено академиком АН Армянской ССР С. Н. Мергеляном 19/XII 1987)

Классическая теорема Монтеля утверждает, что множество $\mathcal{F}$ мероморфных функций образует в плоской области G нормальное семейство, если можно указать такие три различные значения $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ на сфере Римана Ω , что уравнения $f(z) = \omega_i, i = 1, 2, 3$, не имеют решений в G для любой функции $f \in \mathcal{F}$. Известные доказательства этой теоремы существенно опираются на результаты теории функций комплексного переменного. В настоящей статье мы показываем, что в действительности теорема Монтеля имеет топологический характер и ее суть сводится к тому, что комплексное многообразие $\Omega \setminus \Gamma$, получаемое удалением из сферы Римана Ω замкнутого множества $\Gamma = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$, является гиперболическим многообразием. Это обстоятельство позволяет распространить утверждение теоремы Монтеля на голоморфные отображения в гиперболические многообразия.

1. Пусть M и N — произвольные многообразия, снабженные функциями расстояния δ_M и δ_N (в дальнейшем мы будем предполагать M гиперболическим многообразием, и поэтому в качестве δ_M будем выбирать функцию расстояния Кобаяси d_M (см. (1)). Обозначим через $E(M, N)$ и $\mathcal{H}(M, N)$ соответственно пространства непрерывных и голоморфных отображений из M в N с топологией равномерной сходимости на компактах из M .

Напомним, что множество $\mathcal{F} \subseteq E(M, N)$ называется равномерно непрерывным в точке $p \in M$, если для любого числа $\epsilon > 0$ существует такая окрестность U точки p , в которой $\delta_N(f(p), f(q)) < \epsilon$ для всех $q \in U$ и всех $f \in \mathcal{F}$. Множество $\mathcal{F} \subseteq E(M, N)$ является равномерно равномерно непрерывным семейством, если для любого числа $\epsilon > 0$ существует такое число $\delta > 0$, что при всех $p, q \in M$, у которых $\delta_M(p, q) < \delta$, выполняется $\delta_N(f(p), f(q)) < \epsilon$ для каждого $f \in \mathcal{F}$.

Непосредственно видно, что множество $\mathcal{F} \subseteq E(M, N)$ не образует равномерно равномерно непрерывного семейства в том и только в том случае, когда можно указать такие две последовательности точек (p_ν) и (q_ν) на M и такую последовательность функций (f_ν) из $\mathcal{F}$, что $\delta_M(p_\nu, q_\nu) \rightarrow 0$, но $\delta_N(f_\nu(p_\nu), f_\nu(q_\nu)) \not\rightarrow 0$ при $\nu \rightarrow \infty$.

Последовательность точек (p_ν) назовем P -последовательностью семейства отображений $\mathcal{F}$.

Это свойство семейства отображений переносится на индивидуальное отображение в терминах P -последовательностей, которые впервые возникли для мероморфных функций (см. (2)) и распростра-

нены на голоморфные отображения в эрмитовы многообразия в (3). Мы вернемся к этому понятию в пункте 4.

2. Напомним, что множество голоморфных отображений $\bar{F} \subset \mathcal{H}(M, N)$ образует нормальное семейство в смысле B_v (4), если любая последовательность отображений из $\bar{F}$ содержит такую подпоследовательность (f_ν) , которая либо равномерно сходится на компактах из M к некоторому голоморфному отображению f , либо (f_ν) компактно расходится в M . Последнее означает, что для любого компакта $K \subset M$ и любого $K' \subset N$ существует такой натуральный номер $\bar{\nu}$, что $f_\nu(K) \cap K' = \emptyset$ для всех $\nu \geq \bar{\nu}$. Известно, (см. (4); с. 197), что если N — полное эрмитово многообразие и множество $\bar{F} \subset \mathcal{H}(M, N)$ образует на M равномерно непрерывное семейство, то $\bar{F}$ будет нормальным семейством. Этот результат мы используем для доказательства следующей общей версии теоремы Монтеля.

Теорема 1. Пусть M — произвольное гиперболическое многообразие и N — компактное многообразие. Пусть $\Gamma_1, \dots, \Gamma_s$ — такие замкнутые подмножества в N , что для каждого $i, i=1, \dots, s$ множество $N \setminus \Gamma_i$ является полным гиперболическим многообразием и $\bigcap_{i=1}^s \Gamma_i$ состоит из конечного числа точек. Если множество $\bar{F} \subset \mathcal{H}(M, N)$ обладает свойством, что ни одно из отображений $f \in \bar{F}$ не принимает значений из $\bigcup_{i=1}^s \Gamma_i$, то $\bar{F}$ — нормальное семейство.

3. Доказательство теоремы 1. Заметим сначала, что множество $\bar{F}^*$, состоящее из отображений $f \in \bar{F}$, как отображений $f \in \mathcal{H}(M, N \setminus \Gamma_i), i=1, \dots, s$, образует на M равномерно непрерывное семейство при каждом $i, i=1, 2, \dots, s$, поскольку голоморфные отображения обладают свойством невозрастания расстояния относительно функций расстояния Кобаяси d_M и $d_{N \setminus \Gamma_i}$. Поэтому с учетом полноты гиперболических многообразий $N \setminus \Gamma_i, i=1, 2, \dots, s$, и отмеченного выше результата B_v заключаем, что семейство $\bar{F}$ нормально в $\mathcal{H}(M, N \setminus \Gamma_i), i=1, 2, \dots, s$. Осталось показать, что если $(f_\nu) \subset \bar{F}$ является компактно расходящейся последовательностью отображений $f_\nu: M \rightarrow N \setminus \Gamma_i$ для каждого $i, i=1, 2, \dots, s$, то (f_ν) содержит подпоследовательность, которая равномерно сходится на компактах к некоторому отображению $f \in \mathcal{H}(M, N)$.

Рассмотрим такую последовательность (K_n) связанных компактных подмножеств в N , для которой $M = \bigcup_n K_n$ и $K_n \subset \text{Int} K_{n+1}, n \in \mathbb{N}$. Пусть

$\bigcap_{i=1}^s \Gamma_i = \{y_1, \dots, y_m\}$ и $V_1, \dots, V_m$ — взаимно не пересекающиеся окрестности точек $y_1, \dots, y_m$ в N . Рассмотрим такие открытые покрытия U_i замкнутых множеств $\Gamma_i, i=1, 2, \dots, s$, что $\bigcup_{j=1}^m V_j = \bigcap_{i=1}^s U_i$. Так как $N \setminus U_i$ являются компактными подмножествами в $N \setminus \Gamma_i, i=1, 2, \dots, s$, то существует такое натуральное число $\bar{\nu}(K_n, i)$, что $f_\nu(K_n) \cap (N \setminus U_i) = \emptyset$ для всех $\nu \geq \bar{\nu}(K_n, i)$. Следовательно, $f_\nu(K_n) \subset \bigcap_{i=1}^s U_i = \bigcup_{j=1}^m V_j$ для

всех v , $v \geq \bar{v}_1 = \bar{v}(K_1) = \max_{1 \leq i \leq s} \bar{v}(K_1, i)$. Так как K_1 — связное множество, от-
существует такая подпоследовательность последовательности (f_s) , ко-
торую мы опять обозначим через (f_s) , и такой номер $\bar{j}$, что $f_s(K_1) \subset$
 $\subset V_{\bar{j}}$, $v \geq \bar{v}_1$.

Применяя к подпоследовательности (f_s) и множеству K_2 анало-
гичные рассуждения, мы найдем такое натуральное число $\bar{v}_2$, что
 $f_s(K_2) \subset \bigcup_{j=1}^m V_j$ для всех $v \geq \bar{v}_2$. Так как K_2 — связное множество и
 $f_s(K_1) \subset V_{\bar{j}}$, то $f_s(K_2) \subset V_{\bar{j}}$ — для всех $v \geq \bar{v}_2$. Итак, для каждого $n \in \mathbb{N}$
существует такой натуральный номер $\bar{v}_n$, что $f_s(K_n) \subset V_{\bar{j}}$ при всех
 $v \geq \bar{v}_n$.

Выберем теперь окрестность $V_{\bar{j}}^*$ точки $y_{\bar{j}}$, $V_{\bar{j}}^* \subset V_{\bar{j}}$, и выберем от-
крытое множество $U_{\bar{j}}^*$ так, чтобы $W = \bigcap_{i=1}^s U_i \cap U_{\bar{j}}^* = \bigcup_{j=1, j \neq \bar{j}} V_j \subset V_{\bar{j}}^*$.

Для достаточно больших полярных v имеем $f_s(K_1) \subset W$ и $f_s(K_1) \subset$
 $\subset V_{\bar{j}}$. Значит, $f_s(K_1) \subset V_{\bar{j}}^*$. Продолжая рассуждения, получим, что
для каждого $n \in \mathbb{N}$ справедливо $f_s(K_n) \subset V_{\bar{j}}^*$ при всех достаточно боль-
ших номерах v . Это значит, что последовательность (f_s) содержит
подпоследовательность, равномерно сходящуюся на компактах из M
к постоянному отображению $f \equiv y_{\bar{j}}$, что заканчивает доказательство
теоремы 1.

4. Пусть M — гиперболическое многообразие с функцией рассто-
яния Кобаяси d_M и N — эрмитово многообразие. Последовательность
точек $(p_s) \subset M$ называется P -последовательностью для отображения
 $f \in \mathcal{H}(M, N)$, если существует такая другая последовательность $(q_s) \subset$
 $\subset M$, что $d_M(p_s, q_s) \rightarrow 0$, но $d_N(f(p_s), f(q_s)) \rightarrow 0$ при $s \rightarrow \infty$ (см. (3)). Это
определение в случае мероморфных функций равносильно определе-
нию понятия P -последовательности, впервые введенного и изученно-
го в статьях (2) и (3).

Аппарат P -последовательностей оказался удобным для изучения
распределения значений мероморфных функций и голоморфных отоб-
ражений.

Определение 1. Пусть N — компактное комплексное мно-
гообразие и Γ — замкнутое подмножество в N , для которого $N \setminus \Gamma$
является гиперболическим многообразием. Множество Γ обладает
 K -свойством, если для любой точки $y \in \Gamma$ и любой окрестности U
точки y в N существует такая окрестность V точки y , замыка-
ние $\bar{V}$ которой содержится в U , что расстояния между $N \setminus U$ и
 $(N \setminus \Gamma) \cap V$ относительно функции расстояния Кобаяси $d_{N \setminus \Gamma}$ поло-
жительное.

Понятие K -свойства появляется в более общей ситуации при
обсуждении проблемы продолжимости голоморфных отображений (см.
(1), с. 91).

Следующий результат связывает понятия P -последовательности
и K -свойства.

Теорема 2. Множество Γ обладает K -свойством в том и только в том случае, когда отображение вложения $\lambda: N \setminus \Gamma \rightarrow N$ не имеет P -последовательностей.

Доказательство. Пусть отображение вложения $\lambda: N \setminus \Gamma \rightarrow N$ обладает P -последовательностью $(p.)$ и пусть $(q.)$ — последовательность точек из определения P -последовательности. Так как N — компактное многообразие, то можно считать, что $p. \rightarrow p, q. \rightarrow q, d_{N \setminus \Gamma}(p., q.) \rightarrow 0$ при $v \rightarrow \infty$ и $q \neq p$. Рассмотрим непересекающиеся окрестности U и U' точек p и q , соответственно. Так как Γ обладает K -свойством, то можно найти такую окрестность V точки p , что $V \subset \bar{V} \subset U$ и $d_{N \setminus \Gamma}(N \setminus U; (N \setminus \Gamma) \cap V) > 0$. С другой стороны, поскольку $q. \in U' \subset N \setminus U$ и $p. \in V$ для всех достаточно больших номеров v и $d_{N \setminus \Gamma}(p., q.) \rightarrow 0$ при $v \rightarrow \infty$, то $d_{N \setminus \Gamma}(N \setminus U; (N \setminus \Gamma) \cap V) = 0$. Противоречие.

Обратно допустим, что некоторая точка $y \in \Gamma$ имеет такую окрестность U , что для любой окрестности V точки y , $\bar{V} \subset U$, справедливо $d_{N \setminus \Gamma}(N \setminus U; (N \setminus \Gamma) \cap V) = 0$. Рассмотрим счетную базу окрестностей $V_1 \supset \dots \supset V_n \supset \dots$ точки y и выберем точки $p_n \in V_n$ и $q_n \in N \setminus U$ так, чтобы $d_{N \setminus \Gamma}(p_n, q_n) < \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$. Так как $N \setminus U$ — компактное многообразие, то можно считать, что $q_n \rightarrow q \in N \setminus U$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда (p_n) является P -последовательностью для отображения вложения λ .

5. Результаты, полученные в пунктах 1, 2 и 4, позволяют доказать другое обобщение признака Монтеля для семейства голоморфных отображений в следующей форме.

Теорема 3. Пусть M — гиперболическое многообразие и N — компактное комплексное многообразие. Пусть Γ — такое замкнутое подмножество в N , что $N \setminus \Gamma$ является гиперболическим многообразием и Γ обладает K -свойством. Если ни одно из отображений семейства $\bar{F} \subset \mathcal{H}(M, N)$ не принимает значений из Γ , то $\bar{F}$ является нормальным семейством.

Доказательство. Мы покажем, что семейство $\bar{F}$ не обладает P -последовательностями, откуда в силу результатов из пунктов 1 и 2 следует, что $\bar{F}$ является нормальным семейством.

Прежде всего заметим, что семейство $\bar{F}^*$, состоящее из отображений $f \in \mathcal{H}(M, N \setminus \Gamma)$, образует на M равностепенно непрерывное семейство, поскольку голоморфные отображения обладают свойством невозрастания расстояния относительно функций расстояния Кобаяси d_M и $d_{N \setminus \Gamma}$. Допустим теперь, что семейство $\bar{F}$ обладает P -последовательностью $(p.)$. Значит, существуют такая последовательность точек $(q.) \subset M$ и такая последовательность отображений $(f.) \in \bar{F}$, что $d_M(p., q.) \rightarrow 0$ и $d_{N \setminus \Gamma}(f.(p.), f.(q.)) \rightarrow 0$ при $v \rightarrow \infty$. Так как $d_{N \setminus \Gamma}(f.(p.), f.(q.)) \leq d_{N \setminus \Gamma}(f.(p.), f.(q.))$, то последовательность точек $(f.(p.))$ из $N \setminus \Gamma$ обязана быть P -последовательностью для отображения вложения $\lambda: N \setminus \Gamma \rightarrow N$, что противоречит теореме 2.

Հոլոմորֆ արտապատկերումների բնատեխնիկ նորմալությունների կայունիզեր

Մոնտելի դասական թեորեմը պնդում է, որ մերոմորֆ ֆունկցիաների F բազմությունը հարթության G տիրույթում կազմում է նորմալ բնատեխնիկ. եթե կարելի է ցույց տալ այնպիսի երեք իրարից տարրեր $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ արժեքներ Ռիմանի գնդի վրա, որ $f(z) = \omega_i, i = 1, 2, 3$ հավասարումները չունենան լուծում G -ում ցանկացած $f \in F$ ֆունկցիայի համար:

Ցույց տալով, որ այս թեորեմը իրականում ունի տոպոլոգիական բնույթ, ներկա հոդվածում մենք տարածում ենք Մոնտելի թեորեմի պնդումը հիպերբոլիկ բացմաձևություններում հոլոմորֆ արտապատկերումների վրա:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- ¹ S. Kobayashi, Hyperbolic manifolds and holomorphic mappings. Pure and Appl. Math., 2, V. Dekker, 1970. ² В. Н. Гаврилов, ДАН СССР, т. 151, № 1 (1963). ³ K. T. Hohm, Canad. J. Math., v. 36, № 4 (1984). ⁴ H. H. Wu, Acta Math., v. 119, № 3—4 (1967). ⁵ В. Н. Гаврилов, Мат. сб., т. 67, вып. 3 (1965).