

УДК 595.765.8

ЭНТОМОЛОГИЯ

М. Ю. Калашян


Два новых вида рода *Anthaxia* Eschsch. (Coleoptera, Buprestidae) из Армении

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР С. О. Мовсисяном 3/XII 1987)

1. *Anthaxia brevisformis* Kalashian sp. nov.

Арм ССР, Мегринский р-н, окр. с. Ньювади, около 700 м н. ур. м. в можжевелевом редколесье, 29.IV. 1954, С. М. Яблоков-Хнзорян. Голо-тип, самка, в коллекциях Института зоологии АН АрмССР. Рисунок, а.

Верх пестрый—лоб, бока переднеспинки и 2 пятна у ее середины—широкое полукруглое у переднего края и узкое продольно-овальное—у основного, а также узкое прищитковое пятно надкрылий, достигающее вдоль шва приблизительно 1/4 длины надкрылий и узко продолженное вдоль их основания почти до плеч, темно-зеленые; пара широких, кле-



а—*Anthaxia brevisformis* sp. nov., контур тела;  
 б—*A. tractata* Ab., пенис; в—*A. Khnzorlani* sp.  
 nov., пенис. Длина масштабных линеек соответ-  
 ствует 1 мм

реди расширенных и расходящихся продольных пятен на переднеспинке и щиток черные, расплывчатые пятна надкрылий—пара по бокам от прищиткового и овальное, продолженное приблизительно до вершинной 1/6 надкрылий, пришовное позади прищиткового—черно-бурые, остальная часть надкрылий грязно-красная. Низ тела черный с зеленоватым блеском. Лоб плоский, вдоль середины и между основаниями антенн

слабовогнутый, в многоугольных ячейках с гладким дном и слабыми мелкими центральными зернами, в светлых довольно густых и длинных волосках. Темя в 1,5 раза шире глаза. Переднеспинка в 1,7 раза шире длины, едва двувыемчатая спереди и сзади, слабо выпуклая, с продольной бороздкой, наибольшей ширины немного позади передней 1/3, с выпуклыми почти по всей длине и едва вогнутыми перед почти прямыми основными углами боками. Скульптура по бокам ячеистая с мелкими центральными зернами, остальная часть диска морщинистая, морщинки сглаженные, образуют полукруглую концентрическую структуру в передней половине у середины диска, пару почти округлых концентрических структур у середины его основания позади первой и пару групп длинных продольных, кпереди расходящихся морщинок по бокам этих структур. Морщинки довольно изреженные, в особенности в группах продольных морщинок, где расстояние между ними слегка меньше диаметра боковых ячеек переднеспинки; между морщинками местами имеются вытянутые продольно ячейки, отделенные слабыми ребрышками, и мелкие зерна, промежутки морщинок и дно боковых ячеек мелкосетчатые. Щиток слегка поперечный, пятиугольный, слабовогнутый, мелкосетчатый. Надкрылья в 1,65 раза длиннее общей ширины, едва расширены до вершинной 1/3, затем почти прямолинейно сужены к порознь закругленным вершинам, выпуклые, резко узко вдавлены вдоль основного края, с сильным поперечным вдавлением у основных 2/5 и с округлыми вдавлениями по бокам от шва у вершинной 1/4; боковой край в вершинной 1/3 до пришовного угла четко зазубрен. Скульптура черепитчатая, у самой вершины надкрылий с немногими притупленными бугорками, сглажена на пришовном пятне, с рядами мелких точек, более явственных на сглаженном участке. Низ тела в ячеистой скульптуре, с мелкими центральными зернами, эта скульптура сглажена кзади и к середине тела. 7-й уростернит у самки коротко закруглен и слегка отогнут дистально. Длина 4,5 мм. Самец не известен.

Этот вид близок к *A. brevis* Lap., *A. ephippata* Redt. и *A. kreuzbergi* Richt. и может быть определен при помощи следующей таблицы:

- 1(4) Бока переднеспинки золотисто-оранжевые, ее морщинки очень густые. Пришовное пятно надкрылий четкое, сзади срезано или закруглено, узко продолжено вдоль шва до пришовного угла.
- 2(3) Пришовное пятно сзади срезано почти прямолинейно. Переднеспинка у середины синяя . . . . . *A. ephippata* Redt.
- 3(2) Пришовное пятно сзади закруглено. Переднеспинка у середины золотисто-зеленая . . . . . *A. kreuzbergi* Richt.
- 4(1) Бока переднеспинки синие или зеленые, ее морщинки изреженные. Пришовное пятно надкрылий сзади закруглено, не вытянуто вдоль шва, часто расплывчатое.
- 5(6) Надкрылья в 1,5—1,55 раза длиннее общей ширины, их скульптура грубее, на пришовном пятне почти не сглаженная. Морщинки переднеспинки грубее и гуще, их промежутки гладкие. Передне-

спинка, кроме темных продольных пятен, и низ тела синие или синие-зеленые

6(5) Надкрылья в 1,65 раза длиннее общей ширины, их скульптура нежнее, на пришовном пятне сильно сглаженная. Морщинки переднеспинки нежнее и реже, их промежутки в мелкосетчатой шагренировке, с немногочисленными мелкими зернами. Переднеспинка темно-зеленая, низ тела черный с зеленым блеском.

А. brevisformis nov.  
(А. kreuzbergi, в природе нам не известная, включена в таблицу согласно ее описанию (<sup>1</sup>), с. 144—145).

2. А. khnzoriani Kalashian sp. nov.

АрмССР, Ехегнадзорский р-н, окр. с. Шатин, около 1500 м над ур. м., 17.VII. 1950, С. М. Яблоков-Хнзорян. Голотип, самец, в коллекциях Института зоологии АН АрмССР.

Тело бронзовое, со слабым зеленоватым блеском, более заметным у переднего края лба. Покровы в мелкосетчатой шагренировке. Лоб широкий, слабо сужен назад, плоский, у середины слабо продольно вдавленный, в сильно сглаженных больших ячейках, едва заметных на фоне шагренировки, без следа центральных зерен. Лоб спереди с немногими светлыми короткими волосками. Темя в 2,4 раза шире глаза. Переднеспинка в 1,8 раза шире длины, четко двувыемчатая спереди и едва—сзади, ее бока слабовыпуклые, у самых тупых основных углов едва вогнутые. Скульптура ячеистая, сильно сглаженная, как на лбу, но с очень мелкими центральными зернами. Щиток плоский, пятиугольный, почти равной длины и ширины. Надкрылья в 1,8 раза длиннее общей ширины, почти параллельнобокные до вершинной 1/3, затем почти прямолинейно сужены к слегка порознь закругленным вершинам, несущим 3—4 очень маленьких зубчика у шовного угла. Надкрылья выпуклые, у основания с поперечно-треугольным вдавлением, глубоким спереди и постепенно сходящим на нет у основной 1/5 шва, слабо вдавлены у основной 1/3 латерально от шва, с рядами мельчайших точек, более заметных у шва. Низ тела в сглаженных ячейках, еще явственных на груди и почти совсем скрытых шагренировкой на брюшке. 7-й уростернит у самца коротко закруглен дистально. 3,6 мм. Пенис—рисунок, в. Самка не изучалась.

Этот вид близок к *A. funerula* Illig. и *A. tractata* Ab., от первого из них легко отличается отсутствием у вершинной 1/3 бокового края надкрылий ряда глубоких точек, от *A. tractata*—мелкими размерами (у *A. tractata* длина 4—5 мм), формой вдавления у основания надкрылий (у *A. tractata* это вдавление узкое, у шва едва шире, чем у плеч) и, особенно, строением гениталий самца (у *A. tractata* пенис заметно длиннее и уже, чем у нашего вида—рисунок, б).

Мы с благодарностью посвящаем этот вид нашему научному руководителю С. М. Яблокову-Хнзоряну, оказывающему постоянную всестороннюю помощь в нашей работе.

Институт зоологии  
Академии наук Армянской ССР

**Anthaxia Eschsch. (Coleoptera, Buprestidae) սեռի Երկու  
նոր տեսակ Հայաստանից**

Նկարագրվում են *Anthaxia brevisformis* sp. nov. *Մեղրու*<sup>1</sup> և *A. khnzoriani* sp. nov.<sup>1</sup> Եղեղնաձորի շրջաններից: Ինոպիին տեսակը մոտ է *A. ephippata* Redt., *A. kreuzbergi* Richt. և *A. brevis* Lap. & Gory տեսակներին: Իյդ տեսակները տարբերելու համար տրվում է աղյուսակ: *A. khnzoriani* sp. nov. մոտ է *A. funerula* Illig. և *A. tractata* Ab. տեսակներին և համեմատվում է նրանց հետ:

ЛИТЕРАТУРА—ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

<sup>1</sup> *A. A. Рухтер*, Фауна СССР. Жесткокрылые. т. 13, вып. 2. Златки—Buprestidae. ч. 2. Изд. АН СССР, М.—Л., 1949.