

УДК 595.765.8

ЭНТОМОЛОГИЯ


М. Ю. Калашян

Новый вид златки рода
Cylindromorphus Klesw. из Азербайджана (Coleoptera, Buprestidae)

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР С. О. Мовсисяном 30/XII 1988)

Cylindromorphus talyshense Kalashian, sp. nov. — АзССР, Талыш — Зуванд, 13/VII 1986, соб. О. Горбунов. Голотип, самка, в коллекциях Института зоологии АН АрмССР.

Тело темно-бронзовое, слабо блестящее, в редких коротких светлых волосках, покровы в мелкосетчатой шагреневке. Длина 4,2 мм (рисунок, а). Наличник приблизительно равной длины и ширины, глубоко дуговидно вырезан спереди. Лоб в передней половине у середины едва вдавлен, в глубоких крупных негустых точках, как в темя. Голова слегка уже переднеспинки, виски (см. сбоку) в 1,3 раза длиннее глаз. Переднеспинка у основания в 1,1 раза шире длины, едва



а — 1 мм
б, в — 0,5 мм

а, б — *Cylindromorphus talyshense* sp. n.;
в — С. ророві Мпnh. а — коч ур тела; б, в — средняя голень

расширена к передней $1/3$, затем слабо едва вогнуто сужена к почти прямым основным углам, ее краевой киль (см. сбоку) слабо, но явственно изогнут. Скульптура образована густыми грубыми точками, которые едва крупнее точек головы, эти точки образуют местами спутанные ряды, у середины поперечные, по бокам—косые. Надкрылья в 2,75 раза длиннее общей ширины у плеч, в 3,35 раза длиннее передне-спинки, почти параллельнобокне в основной $1/6$; слабо сужены к основной $1/3$, затем расширены к вершинной $1/3$, где они наибольшей ширины, затем почти прямолинейно сужены к коротко порознь закругленным вершинам, несущим несколько очень маленьких зубчиков. Надкрылья в многочисленных поперечных извилистых морщинках и слегка спутанных продольных рядах точек, образующих как бы черепитчатую скульптуру, кзади сглаженную. Низ тела в крупных точках, на переднегруди глубоких, кзади и к середине сглаженных. Голеня слабо изогнутые, явственно расширены дистально (рисунок, б). 7-й уростернит почти прямолинейно срезан дистально.

Из всех палеарктических видов рода к нашему виду наиболее близок *C. porovi* Munn. из степей СССР и Монголии; он отличается сильнее вдавненным лбом, более мелкой пунктировкой головы, которая заметно мельче, чем на передне-спинке, более узкими и сильнее изогнутыми голенями (рисунок, в). Известные из Закавказья *C. filum* Gyll. и *C. araxidis* Kll. легко отличаются от описываемого вида более узким и длинным телом (у обоих надкрылья по крайней мере втрое длиннее общей ширины у плеч).

Мы считаем своим приятным долгом выразить признательность О. Г. Горбунову, передавшему нам материал по новому виду.

Институт зоологии
Академии наук Армянской ССР

Մ. ՅՈՒ. ՔԱՂԱՇԱՆ

Cylindromorphus Kiesw. սեռի նոր տեսակի սկզբգեղ Ադրբեջանից
(Coleoptera, Buprestidae)

Նկարագրվում է *Cylindromorphus talyshense* sp. nov. տեսակը Քաղաշից (Չուվանդ):

Նոր տեսակը համեմատվում է *hU2U*-ի և Մոնղոլիայի տափաստաններում տարածված պալեարկտիկական մոտ կանգնած *C. porovi* Munn. տեսակի, ինչպես նաև Անդրկովկասից հայտնի *C. araxidis* Kll. և *C. filum* Gyll. տեսակների հետ: