УДК 517.5

МАТЕМАТИКА

Э. А. Даниелян, Г. С. Мовсисян

Уточнение теоремы Каратеодори—Рисса

(Представлено академиком АН Армянской ССР Р. В. Амбарцумяном 16/V 1989)

При изучении связанных с обобщенной конечной проблемой моментов экстремальных задач на классе всех функций распределения (ФР) $\mathcal{F}_0$ на $[a, b]^*$ ($-\infty < a < b < +\infty$) важную роль играет теорема Рисса (см. (1)), с. 30), утверждающая, что для любой системы непрерывных функций

$$u_1(t), u_2(t), \dots, u_n(t), n \geq 1, t \in [a, b]$$

моментное пространство

$$M(\mathcal{F}_0) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ c = (c_1, \dots, c_n) : \int_a^b u_k(t) d\sigma(t) = c_k, k = \overline{1, n}, \sigma \in \mathcal{F}_0 \right\}$$

совпадает с замкнутой выпуклой оболочкой множества точек кривой

$$U = \{ u(t) = (u_1(t), \dots, u_n(t)) : t \in [a, b] \} \subset R^n.$$

Классическая теорема Каратеодори (см., например (2), с. 169) занимает центральное место в выпуклом анализе. Она дает представление точек выпуклого множества в R_n в виде выпуклой комбинации не более чем $n + 1$ крайних точек данного выпуклого множества.

Объединение вышеупомянутых двух утверждений приводит для класса $\mathcal{F}_0$ к следующему утверждению, называемому в (1), с. 31, теоремой Каратеодори—Рисса.

1) Каждая точка $c \in M(\mathcal{F}_0)$ представима в виде

$$c = \lambda_1 u(t_1) + \dots + \lambda_n u(t_n) + \lambda_{n+1} u(t_{n+1}),$$

где $t_i \in [a, b], \lambda_i \geq 0, (i = \overline{1, n+1}), \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1.$

2) Если $c \in \partial M(\mathcal{F}_0)$, то

$$c = \lambda_1 u(t_1) + \dots + \lambda_n u(t_n),$$

где $t_i \in [a, b], \lambda_i \geq 0, (i = \overline{1, n}), \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1.$

Во многих вопросах выпуклого анализа важно иметь выпуклое

* ФР σ на $[a, b]$ — неубывающая, непрерывная слева функция, не имеющая точек роста вне $[a, b]$ и такая, что $\sigma(a) = 0, \sigma(b+) = 1.$

линейное представление $c \in M(\mathcal{F}_0)$ через возможно меньшее число точек кривой u .

Во всех примерах удается построить представление для c через не более чем n точек кривой u . Рассмотрим простейший пример. Пусть $n=2$, $u_1(t)=t$, $u_2(t)=t^2$. Тогда моментным пространством согласно теореме Рисса будет замкнутая выпуклая оболочка кривой $u(t)=\{(t, t^2) : t \in [a, b]\} \subset R^2$ (рисунок).

Из рисунка видно, что каждая точка $c \in \text{Int} M(\mathcal{F}_0)$ может быть представлена в виде выпуклой комбинации ровно двух точек кривой U .

Цель настоящей заметки—доказать следующую теорему.

Теорема. Каждая точка $c \in M(\mathcal{F}_0)$ представима в виде

$$c = \lambda_1 u(t_1) + \dots + \lambda_n u(t_n),$$

где $t_i \in [a, b]$, $\lambda_i \geq 0$, $(i = \overline{1, n})$, $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$.

Отметим, что утверждение теоремы не может быть улучшено.

Замечание. Без ограничения общности можно считать, что $c=0$. В противном случае можно перейти к вектор-функции $u(t)-c$. Согласно теореме Каратеодори—Рисса имеем

$$0 = \lambda_1 u(t_1) + \dots + \lambda_n u(t_n) + \lambda_{n+1} u(t_{n+1}). \quad (1)$$

Доказательству теоремы предположим доказательство двух лемм. Обозначим через S выпуклую оболочку множества $\{u(t_i)\}_{i=1}^{n+1} \subset R^n$, а через K наименьший выпуклый конус, содержащий точки $-u(t_1), \dots, -u(t_n)$. Очевидно, что K замкнутый конус.

Лемма 1. Пусть точки $u(t_1), \dots, u(t_n), u(t_{n+1})$ не лежат в одной гиперплоскости в R^n и $0 \in \text{Int} S$. Тогда

1) $u(t_i) \in K$, $(i = \overline{1, n})$;

2) $u(t_{n+1}) \in K$.

Доказательство 1). Рассмотрим гиперплоскость $(a, x) = h$,

проходящую через точки $u(t_1), \dots, u(t_n)$. Допустим, что эта гиперплоскость проходит через точку o , т. е. $h=0$. Пусть $(a, u(t_{n+1})) > 0$, тогда $(a, x) \geq 0$ для всех $x \in S$, т. е. гиперплоскость является опорной к S , что противоречит условию $o \in \text{Int} S$ ((¹), с. 20). Таким образом $h \neq 0$. Рассмотрим параллельную гиперплоскости $(a, x) = h$ гиперплоскость $(a, x) = 0$. Пусть $(a, u(t_i)) > 0, (i = \overline{1, n})$. Тогда $(a, x) < 0$ для всех $x \in K$ и $u(t_i) \in K, (i = \overline{1, n})$.

2) Допустим, что $u(t_{n+1}) \in K$. Проведем гиперплоскость $(b, x) = 0$, отделяющую конус K от точки $u(t_{n+1})$ ((¹), с. 25). Пусть $(b, u(t_{n+1})) > 0$ и $(b, x) \leq 0$ для всех $x \in K$. В частности $(b, u(t_i)) \geq 0, (i = \overline{1, n})$. Тогда $(b, x) \geq 0$ для всех $x \in S$, что противоречит условию $o \in \text{Int} S$. Лемма 1 доказана.

Как известно ((²), с. 31), каждая точка $x \in K$ представляется в виде

$$x = -\mu_1 u(t_1) - \dots - \mu_n u(t_n), \quad (2)$$

где $\mu_i \geq 0, (i = \overline{1, n})$.

Лемма 2. Пусть точки $u(t_1), \dots, u(t_n), u(t_{n+1})$ не лежат в одной гиперплоскости, $o \in \text{Int} S$ и в представлении (2) все $\mu_i > 0, (i = \overline{1, n})$. Тогда точка $x \in \text{Int} K$.

Доказательство. Допустим противное — пусть $x \in \partial K$. Проведем через x гиперплоскость $(d, x) = 0$, опорную к K ((¹), с. 25). Тогда $-\mu_1(d, u(t_1)) - \dots - \mu_n(d, u(t_n)) = 0$. Так как все $\mu_i > 0$, то $(d, u(t_i)) = 0, (i = \overline{1, n})$ и точки $u(t_1), \dots, u(t_n)$ лежат в гиперплоскости, проходящей через точку o , что противоречит условию $o \in \text{Int} S$. Лемма 2 доказана.

Доказательство теоремы. Пусть точки $u(t_1), \dots, u(t_n), u(t_{n+1})$ лежат в одной гиперплоскости. Тогда множество S лежит в некотором подпространстве пространства R^n размерности не более $n-1$. В этом случае утверждение теоремы является прямым следствием классической теоремы Каратеодори.

Рассмотрим теперь тот случай, когда точки $u(t_1), \dots, u(t_n), u(t_{n+1})$ не лежат в одной гиперплоскости. Тогда S является телом в R^n ((¹), с. 18). Если точка $o \in \partial S$ и так как S замкнутое множество, то утверждение теоремы следует из теоремы Каратеодори для замкнутых выпуклых множеств (см. например (¹), с. 21).

Остается тот случай, когда $o \in \text{Int} S$. Рассмотрим точки $u(t_1)$ и $u(t_{n+1})$. По лемме 1 $u(t_1) \in K, u(t_{n+1}) \in K$. Так как эти точки лежат на непрерывной кривой U , то найдется точка $t' \in [a, b]$ такая, что $u(t') \in \partial K$. Тогда

$$u(t') = -\mu_1 u(t_1) - \dots - \mu_n u(t_n),$$

где $\mu_i \geq 0, (i = \overline{1, n})$. Но по лемме 2 хотя бы один из $\mu_i, (i = \overline{1, n})$ равен нулю. Пусть для определенности $\mu_n = 0$. Таким образом

$$u(t') + \mu_1 u(t_1) + \dots + \mu_{n-1} u(t_{n-1}) = 0,$$

т. е. $0 = \lambda_1 u(t_1) + \dots + \lambda_{n-1} u(t_{n-1}) + \lambda_n u(t')$,

где $\lambda_l = \frac{\mu_l}{1 + \sum_{j=1}^{n-1} \mu_j}$, $(l = \overline{1, n-1})$, $\lambda_n = \frac{1}{1 + \sum_{j=1}^{n-1} \mu_j}$, $\lambda_k \geq 0$, $(k = \overline{1, n})$,

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1.$$

Теорема доказана

В заключение приведем другую формулировку доказанной нами теоремы.

Теорема*. Если $c_1, \dots, c_n$ — обобщенные моменты некоторой ФР на $[a, b]$, то существует ступенчатая ФР на $[a, b]$ с не более чем n скачками, имеющая те же моменты.

Ереванский государственный университет

Է. Ա. ԳԱՆԻԵԼՅԱՆ, Գ. Ս. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ

Կարաբեղորի—Խիսի բերեմի նշգրտումը

Իրացուք $\mathcal{F}_0$ -ը $[a, b]$ հատվածի վրա բոլոր բաշխման ֆունկցիաների դասն է, իսկ

$$u_1(t), \dots, u_n(t), n \geq 1, t \in [a, b]$$

անընդհատ ֆունկցիաների համակարգ է:

$$c_i = \int_a^b u_i(t) d\sigma(t), \quad i = \overline{1, n}, \quad \sigma \in \mathcal{F}_0$$

ինտեգրալները կոչվում են $\sigma(t)$ բաշխման ֆունկցիայի ընդհանրացված մոմենտներ:

Աշխատանքում ապացուցված է հետևյալ թեորեմը:

Թեորեմ. Իթե $c_1, \dots, c_n$ -ը $[a, b]$ հատվածի վրա ինչ որ բաշխման ֆունկցիայի ընդհանրացված մոմենտներն են, ապա գոյություն ունի ոչ ավելի քան n թռիչքներով թռիչված բաշխման ֆունկցիա $[a, b]$ հատվածի վրա նույն ընդհանրացված մոմենտներով:

ЛИТЕРАТУРА—ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

¹ М. Г. Крейн, А. А. Нудельман, Проблемы моментов Маркова и экстремальные задачи, Наука, М., 1973. ² Р. Рокафеллар, Выпуклый анализ, Мир, М., 1973.