

УДК 595.763.3

ЭНТОМОЛОГИЯ

М. Ю. Калашян

**Новый вид рода *Margarinotus* (Mars.) Wenz.
 (Coleoptera, Histeridae) из Армении**

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР С. О. Мовсисяном 12/IV 1989)

Margarinotus pseudomirabilis Kalashian, sp. nov.


АрмССР, окр. Еревана, п. Советашен, из растительных отбросов на муравейнике *Messor caducus caucasicola* Arnoldi, 31.03.88 г. Голотип, самка, в коллекциях Института зоологии АН АрмССР.

Тело овальное, выпуклое, красно-бурое, как ротовые части и конечности, голова и пара маленьких округлых пятен у середины внутренней боковой бороздки переднеспинки черные, основание надкрылий узко зачернено. Длина 6,5 мм, длина от переднего края переднеспинки до вершины надкрылий—4,5 мм.

Лоб слабо выпуклый, в мелкой редкой двойной пунктировке, лобная бороздка четкая, едва изогнута у середины. Переднеспинка с закругленными боками, слабо сужена к выступающим передним углам, ее скульптура такая же, как на лбу, ее краевая бороздка четкая, спереди прервана позади головы, сзади слегка заходит за основные углы переднеспинки. Внутренняя боковая бороздка цельная, слегка изогнута у середины, спереди продолжена вдоль переднего края переднеспинки и здесь не прервана, наружная боковая цельная, спереди изогнута и упирается во внутреннюю боковую, сзади почти достигает основного края переднеспинки. Обе бороздки глубокие и точечные. Проплевры голые, в немногочисленных мелких точках, усиковые впадины глубокие и гладкие. Надкрылья наибольшей ширины у слабо обособленных плечевых бугорков, слабо сужены кзади. Все 6 дорсальных бороздок цельные, 5-я и 6-я немного не достигают основания надкрылий и здесь соединены между собой; наружная подплечевая бороздка четкая, слегка укорочена спереди, внутренняя подплечевая представлена несколькими вытянутыми точками в вершинной половине надкрылий. Скульптура надкрылий такая же, как на лбу.

Пропигидий слабо выпуклый, в густых плоских глазчатых точках, в промежутках между которыми имеются почти столь же многочисленные мелкие вдавленные точки; на пигидии скульптура приблизительно такая же, но глазчатые точки мельче и немного глубже, кзади изреживаются и мельчают и здесь не отличаются от мелких точек промежутков. Переднегрудь между передними тазиками слегка вдавлена; кайма воротничка цельная. Среднегрудь спереди с глубокой выемкой, с четкой цельной краевой бороздкой. Бока средне- и заднегруды голые,

в крупных глубоких густых точках. Боковые линии заднегруди и первого видимого стернита брюшка четкие, цельные. Передние голени у наружного края с 4 зубцами, 3 передних крупные, задний маленький; внутренняя поверхность голеней груботочечная. Средние и задние голени по наружному краю с крупными зубцами и многочисленными длинными желтыми щетинками, внутренняя поверхность голеней точечная и волосистая.



Margarinotus pseudomirabilis sp.
нов. — переднеспинка, надкрылья и
вершина брюшка.

Этот вид относится к подроду *Eucalohister* Keitt.; наличие шести цельных дорсальных бороздок сближает его с *M. mirabilis* (Khnz.) и некоторыми особями *M. kurdistanus* (Mars.). От них новый вид отличается уже окраской (тело *M. mirabilis* черное, с просвечивающей желтым вершинной каймой надкрылий; у *M. kurdistanus*, судя по его описанию ((¹), с. 377), тело черное, надкрылья от черных до темно-красных или красно-бурых). От нового вида *M. mirabilis* отличается также более выпуклым и широким телом, более мелкой пунктировкой лба, переднеспинки и надкрылий, строением внутренней краевой бороздки переднеспинки, которая более резко изогнута у середины, а сзади сближена с наружной краевой. Пунктировка пропигидия и пигидия у *M. mirabilis* представлена более мелкими, редкими и глубокими однородными глазчатыми точками, средние голени без щетинок по наружному краю, задние — с немногочисленными короткими щетинками. *M. kurdistanus*, помимо окраски, отличается укороченной наружной краевой бороздкой переднеспинки, обычно не заходящей за середину ее бокового края, а также волосистыми боками средне- и заднегруди.

Институт зоологии
Академии наук Армянской ССР

Margarinotus (Mars.) Wenz. (Coleoptera, Histeridae)

սեռի նոր տեսակ Հայաստանից

Հոդվածում նկարագրվում է *Margarinotus pseudomirabilis* Kalashian sp. nov. տեսակը Երևանի շրջակայքից (Սովետաշեն):

Այս տեսակը պատկանում է *Eucalohister* Reitt. ենթասեռին և մոտ է *M. mirabilis* (Khnz.) և *M. Kurdistanus* (Mars.) տեսակներին, տարբերվելով նրանցից մի շարք կարևոր հատկանիշներով:

ЛИТЕРАТУРА—ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1 О. Л. Крыжановский, А. Н. Рейхардт, Жуки надсемейства Histeroidea (семейства Sphaeritidae, Histeridae, Syntelidae). Фауна СССР, т. V, вып. 4, Наука, Л 1976.