УДК: 579.842.:579.253.08

МИКРОБИОЛОГИЯ

Ж. А. Кцоян, Н. Д. Константинова, И. Н. Саркисян, В. И. Черноп

Морфология и ультраструктура клеток штамма *S. derby* К 89

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР К. Г. Карагезяном 10/X 1988)

Известно, что в семействе *Enterobacteriaceae* бактерии рода *Salmonella* отличаются большой патогенностью для человека и животных. В настоящее время среди кишечных инфекций у детей раннего возраста самым распространенным инфекционным заболеванием являются сальмонеллезы. Известно также, что за последние годы в распространении внутрибольничных инфекций ведущую роль приобрели грамотрицательные бактерии, чему в немалой степени способствуют характерные для этих микроорганизмов так называемые конъюгативные R-факторы, придающие клеткам устойчивость к различного рода антибиотикам. Обнаружение R-плазмид объясняет ряд чрезвычайно важных в медицинском отношении характеристик патогенных и условно-патогенных бактерий, затрудняющих эффективное лечение инфекционных заболеваний.

До недавнего времени природный условно-патогенный штамм *S. derby* К 89, лизогенный по фагу ϕ p9 *S. derby*, выделенный впервые из клинического материала (1), изучался лишь в отношении его иммунологических, биохимических и физиологических свойств (2-3), исследовался характер взаимодействия его фагов с клеткой хозяина (4-5).

Целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение морфологических и ультраструктурных особенностей *Salmonella derby*.

В работе использовали дикий штамм *S. derby* К 89. Культуру выращивали на МПА в течение 18 ч при 37°С, смывали фиксатором, содержащим глютаровый альдегид, параформальдегид и пикриновую кислоту по методу Ито и Карновски (6). Клетки фиксировали в течение 1 ч при комнатной температуре, отмывали 0,15 М фосфатным буфером рН 7,3—7,4 и дофиксировали 1%-ным OsO_4 в течение 18 ч при той же температуре. Трижды отмытые тем же буфером, а также 0,2 М малеатным буфером рН 5,2 клетки обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и 100%-ном ацетоне и заливали в аралдит (Serva). Срезы получали на ультрамикротоме III IKB—8800 и просматривали в электронном микроскопе IEM—100В при инструментальном увеличении в 15000 и 3000.

При просмотре колоний *S. derby* в световом микроскопе наблюдали гетерогенные по размерам и форме клетки. В культуре преобладали палочковидные и удлиненные клетки, размеры которых составляли 1—3,5 мк.

При просмотре препаратов в электронном микроскопе гетерогенность культуры исследуемого штамма сальмонелл была выражена еще отчетливее. В препаратах можно было наблюдать округлые, палочковидные и удлиненные клетки, встречались клетки неправильной формы (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид культуры клеток *S. derby*. Видны округлые, удлиненные и неправильной формы клетки. $\times 38000$

Клетки *S. derby* окружены слегка извилистой клеточной стенкой, общая толщина которой достигала 24—26 нм. Следует отметить, что у большинства грамотрицательных бактерий клеточная стенка значительно тоньше и составляет 11—15 нм (?). Однако необходимо учитывать то обстоятельство, что результаты были получены при использовании других методов фиксации и заливочных сред. Тем не менее, даже с применением новых фиксирующих смесей и заливочных смол, у многих грамотрицательных бактерий толщина клеточной стенки не превышает 15—18 нм. Таким образом, такая мощная клеточная стенка хорошо защищает клетки *S. derby* от неблагоприятных воздействий и, в частности, может объяснить высокую устойчивость клеток этого вида к некоторым сульфаниламидам и антибиотикам, особенно к стрептомицину. С другой стороны, повышенная резистентность исследуемых сальмонелл к последнему антибиотику определяется детерминантой устойчивости к стрептомицину, локализованной на плазмиде, по-видимому, за счет изменения проницаемости поверхностных структур к этому антибиотику (⁸ ⁹).

Цитоплазматическая мембрана имела трехслойное строение и хорошо выявлялась по всему периметру клетки, отделяя клеточную стенку от цитоплазмы (рис. 2).

Цитоплазма более или менее равномерно заполнена рибосомами и полирибосомами, иногда выявляются участки повышенной электронной плотности. У многих клеток в цитоплазме, главным образом по ее периферии, наблюдали светлые зоны, свободные от рибосом и не ограниченные мембраной (рис. 1, 2). Такие светлые зоны встречаются и у других грамотрицательных бактерий и, возможно, являются очагами начинающегося лизиса.

Рис. 2. а—ультраструктура клетки *S. derby*: кс—клеточная стенка, цм—цитоплазматическая мембрана, н—нуклеотид, пр—полирибосомы, сз—светлые зоны. $\times 60000$, б—фрагмент клеточной стенки той же клетки. $\times 120000$

Нуклеонид, как и у других грамотрицательных бактерий, выявлялся в виде небольших светлых участков по всей цитоплазме и представлял собой прозрачную для электронов зону, заполненную электронно-плотными нитями ДНК (рис. 2).

Деление клетки, как и у остальных грамотрицательных бактерий, происходит путем образования перетяжки (рис. 3).

Рис. 3. Делящаяся клетка *S. derby*. п—перетяжка. $\times 90000$

Таким образом, в ультраструктуре клеток изученного штамма *S. derby* К 89 обнаружена особенность, отличающая ее от структуры многих других грамотрицательных бактерий: большая толщина клеточной стенки, почти в два раза превышающая толщину стенки других грациликутов. Возможно, в филогенетически стабилизированном постоянстве липид-липидных и липид-белковых соотношений биологической мембраны клеток *S. derby* К 89 имеются нарушения⁽¹⁰⁾, что, вероятно, определяет высокую резистентность клеток данного штамма к ряду антибактериальных препаратов. Их изучение представляет самостоятельный интерес.

Институт экспериментальной биологии
Академии наук Армянской ССР

S. derby K89 շտամի բջիջների մորֆոլոգիան և ուլտրաստրուկտուրան

S. derby K89 շտամի բջիջների ուլտրաստրուկտուրայում հայտնաբերված է առանձնահատկություն, որը տարբերում է նրան մյուս գրամբացասական բակտերիաներից: Այն է՝ այդ բջիջների բջջաթաղանթի համարյա կրկնակի հաստությունը մյուս գրացիլիկոտների հետ համեմատած: Այս հանգամանքը, ըստ երևույթին, պայմանավորում է S. derby K89 բջիջների բարձր կայունությունը մի շարք հակաբակտերիալ պրեպարատների նկատմամբ:

ЛИТЕРАТУРА—ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

¹ М. К. Вартанян, Б. П. Карабеков, Материалы II Науч. конф. ИЭБ АН Арм. ССР, Ереван, вып. 22 (1968). ² М. К. Вартанян, Б. П. Карабеков, Тезисы докл. конф. ИЭБ АН АрмССР, Ереван, 97 (1970). ³ М. К. Вартанян, Ж. А. Кцоян, Б. П. Карабеков, Биол. журнал Армении, т. 30, № 9, 145 (1977). ⁴ М. К. Вартанян, Ж. А. Кцоян, Б. П. Карабеков, Биол. журнал Армении, т. 31, № 1, 14 (1978). ⁵ Ж. А. Кцоян, Л. М. Ханбекян, Н. Н. Саркисян и др., Генетика, т. 24, № 5, 953 (1988). ⁶ S. Ito, M. Y. Karpovskii, J. cell Biology, v. 39, № 168 (1968). ⁷ А. А. Авакян, Л. Н. Кац, И. Б. Павлова, Атлас анатомии бактерий, патогенных для человека и животных, Медицина, М., 1972. ⁸ Н. Н. Саркисян, Р. Г. Антоян, М. П. Светлова и др. Биохимия, т. 50, вып. 4, с. 673 (1985). ⁹ Ж. А. Кцоян, А. С. Таисова, Н. Н. Саркисян и др., Антибиотики и мед. биотехнология, т. 33, (1988). ¹⁰ Е. Б. Бурлакова, Биохимия липидов и их роль в обмене веществ. Наука, М., 1981.