

УДК 595.763.23

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хнзорян

Новый вид жесткокрылых-долгоносиков рода
Larinus Germ. из Туркмении (Coleoptera, Curculionidae)

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР С. О. Мовсисяном 24/XI 1989)

Larinus turcmenus Iablokoff-Khnzorian sp. nov.

Туркменская ССР: Кушка, Урочище Агашлы у границы СССР, голо-
тип, ♂ и 4 паратипа обоих полов.

Тело и конечности черные, волосистость белая, прилегающая, ±
сгущенная по бокам переднеспинки и дистально вдоль ее оси, на 3-м
промежутке бороздок надкрылий и вдоль ее боков. Длина 7,5 мм. Рис.
1,1.

Головотрубка (рис. 1,4) вдвое короче переднеспинки, на треть
длиннее толщины, слегка длиннее ширины у обоих полов (ее длина из-
мерена от нижнего края глаз), без вдавлений, со следом кия или без
него, расширена к вершине, иногда сверху с двумя бороздками, схо-
дящимися у ее основания, снизу со слабым вздутием, без щетинок.
Усики (рис. 1,2) короткие, их 1-й членик в 2,8 раза короче ширины го-
ловы у глаз, 3-й шире длины. Глаза яйцевидные, слегка выпуклые,
вдвое длиннее ширины, с венцом из густых щетинок. Переднеспинка
(измеренная без ее выступа) в 1,5—1,7 раза шире длины (рис. 1,1), с
прямыми задними углами, равномерно грубо густо и вдавленно точеч-
ная на мелкоточечном фоне, между точками покровы гладкие. На дис-
ке волосистость зачесана вперед, а в передней части косо к оси, вдоль
которой сгущена. Заглазничные лопасти выпрямленные, с бахромой из
коротких щетинок. Плечи скошены. Надкрылья (измеренные от плеч)
в 1,3—1,4 раза длиннее общей ширины, с рядами негустых точек, про-
межутки которых мелкоточечные и поперечноморщинистые на гладком
фоне. Низ тела в довольно густой простой прилегающей волосистости.
Голени и бедра без щетинок. Передние голени вдоль внутреннего края
с рядом крупных и острых зубцов.

Этот вид принадлежит к небольшой, габитуально характерной
группе видов, развивающихся, насколько известно, на *Cousinia*. У нее
головотрубка прямая или очень слабо изогнутая, в поперечном разрезе
не округлая, короткая. 1-й членик усиков в 2,3—4 раза короче ши-
рины головы у глаз. Глаза слабо выпуклые, окружены венцом из ко-
ротких густых щетинок. Переднеспинка без бугорков или морщинок, с
двойной точечностью и прямыми задними углами. Надкрылья в 1,2—
1,4 раза длиннее общей ширины, с закругленно выступающими или
лишь намеченными передними углами, сзади закруглены коротко и

поэтому выглядят несколько четырехугольными. Волосистость, всюду кроме щек, нерасщепленная. Передние голени четко зазубрены. Длина 5—8 мм.

Даже у одного и того же вида головотрубка сверху может быть




Рис. 1. Детали строения видов из рода *Larinus* Germ.: 1—*L. turcmenus* Iablokoff-Khnzorian, голотип; 2—его правый усик; 3—7—голова самцов видов рода *Larinus* Germ.; 3—*L. reitteri* Faust.; 4—*L. turcmenus* nov.; 5—*L. aeruginosus* Hochh.; 6—*L. brevirostris* Hochh.; 7—*L. ochroleucus* Cap.

гладкой, с киями или вдавлениями. К этой группе близок, по-видимому, *L. fuscatus* Fst, 1891, описанный из Ордубада. Согласно описанию его головотрубка вдвое длиннее ширины, с 3 киями, переднеспинка нависает над головой, по бокам с бугорками или морщинками, с 2 свет-

лыми волосистыми полосами. Надкрылья с такими же полосами вдоль шва, на 3-м промежутке бороздок и с боков, с едва заметными бугорками. Длина 7 мм. Таинственный *L. anceps* Reitt; 1896, также описанный из Ордубада, сведен в синонимы с *L. minutus* Gyll., 1836, что, однако, совсем не соответствует его описанию. Длина 4 мм. К этой группе также близки *L. sibiricus* Gyll., 1836, и *terminassiani* Fremuth 1987, но у обоих плечи не выступающие, у первого из них надкрылья овальные, у 2-го переднеспинка по бокам с блестящими зернышками. С этой группой можно также сблизить *L. rejteri* Faust, 1889, из долины Аракса и Средней Азии, развивающегося на полыни. У него передние голени гладкие, головотрубка слегка короче ширины, на треть длиннее толщины (рис. 1,3), 1-й членик усиков в 3,5 раза короче ширины головы у глаз, тело в довольно густых и длинных волосках, часто сгущенных по краям переднеспинки, а на надкрыльях—в боковые пятна. Длина 4,5—5 мм.

Определительная таблица для видов группы, известных из СССР.
1(2) 3-й членик усиков удлинённый, 1-й втрое короче ширины головы у глаз. Головотрубка к вершине расширена, у ♂ в 1,9, у ♀ в 2,1 раза длиннее толщины, у ♂ едва (рис. 1, 5), у ♂ четко изогнутая, снизу с щетинками, с ± четким килем, часто окаймленным проксимально парой вдавлений. Глаза в 2,2 раза длиннее ширины. Переднеспинка в 1,4 раза шире длины, с 3 волосяными полосами. Зубцы передних голеней густые и длинные (могут стираться). 6,5—8 мм, на *Cousinia*, Средиземноморье, юг европейской части СССР, Кавказ 1. *L. aeneuginosus* Hochh., 1851.

2(1) 3-й членик усиков шире длины. Головотрубка короче, снизу без щетинок.

3(6) Головотрубка к вершине не расширена, сверху слабо выпуклая. Зубцы передних голеней мелкие и негустые.

4(5) Головотрубка примерно вдвое длиннее толщины (рис. 1,7). 1-й членик усиков в 4 раза короче ширины головы у глаз. Глаза вдвое длиннее ширины. Переднеспинка в 1,4 раза шире длины. Надкрылья в 1,4 раза длиннее общей ширины. Тело сверху покрыто густым стирающимся налетом, переднеспинка вдоль оси и по бокам, надкрылья на 3-м промежутке бороздок и по бокам с волосистыми полосами. 5—7 мм. На *Cousinia*. Закавказье, Иран, Средняя Азия.. . . . 2. *L. ochroleucus* Car., 1874.

5(4) Головотрубка ♂ едва (рис. 1, 6), у ♀ слегка длиннее толщины. 1-й членик усиков втрое короче ширины головы у глаз. Глаза в 2,2 раза длиннее ширины. Переднеспинка в 1,6—1,8 раза шире длины. Надкрылья едва крапчатые, густоволосистые, в 1,2—1,4 раза длиннее общей ширины. Зубцы передних голеней очень мелкие. 6—6,5 мм. На *Cousinia*. Закавказье.. 3. *L. brevistris* Hochh., 1851.

6(3) Головотрубка плоская, в вершине расширена, на треть длиннее толщины (рис. 1, 4), без вдавлений, со следом киля или без него. Зубцы передних голеней резкие. 1-й членик усиков в 2,8 раза короче ширины головы у глаз. Тело сверху покрыто негустыми короткими волосками, на переднеспинке слегка сгущенными по бокам и

дистально по оси, на надкрыльях—по бокам и вдоль 3-го промежутка бороздок. 7,5—8 мм. Кушка. Рис. 1, 1..... 4. *L. turcmenus* nov.

Институт зоологии

Академии наук Армянской ССР

II. Դ. ՅԱՐԼՈՆԻՎ-ԿԵՉՈՐՅԱՆ

Larinus Germ. սեռի երկարակնճիթ բզեզների նոր տեսակ Թուրքմենիայից (Coleoptera, Curculionidae)

Եկարագրված է երկարակնճիթ բզեզների *Larinus* սեռի նոր տեսակ հա-
վարված Կուշկայում, ԽՍՀՄ սահմանի մոտ (Թուրքմենիա): Ինչն պատկանում է
Cousinia սեռի տատասկափշերի վրա զարգացող տեսակների ոչ մեծ խմբին: