

***Bracon buprestivorus* sp. n. как паразит *Anthaxia Igockii*.
Обенб в Армении**

(Представлено чл.корр. АН Армянской ССР С. О. Мовсисяном 25/XII 1989)

Среди насекомых, на личинках которых развиваются наездники рода *Bracon* F., представители жуков сем. *Buprestidae* встречаются очень редко (^{1,2}). Поэтому представляет несомненный интерес описываемый в данной статье новый вид *Bracon buprestivorus*, выведенный М. Ю. Калашяном (которому автор искренне признателен за предоставленный материал) из личинок *Anthaxia Igockii* Obenb., развивающихся на *Astragalus* (*Tragacantha*) sp.

Новый вид по укороченной радиальной ячейке, скульптуре брюшка и окраске наиболее близок к *B. (Lucobracon) fumatus* Szépl. Отличается заметно более маленькой и округлой ротовой выемкой, сильно затемненными щупиками, наличием морщинистой скульптуры на проподеуме, широким брюшком, более коротким и широким 2-м тергитом брюшка, наличием четких морщин на 2-м и 3-м тергитах, темной окраской ног и птеростигмы.

Типовой материал нового вида хранится в Зоологическом институте АН СССР, Ленинград, один паратип—в Институте зоологии АН АрмССР, Ереван.

Bracon (Lucobracon) buprestivorus Belokobylskij, sp. n. (рис. 1—7)

Самка. Длина тела 4.0 мм. Ширина головы в 1,5 раза больше ее длины посредине, немного больше ширины мезонотума, за глазами голова сначала параллельносторонняя, затем округленно суженная. Длина висков немного меньше поперечного диаметра глаза. Глазки маленькие, в равностороннем треугольнике, POL в 1,3 раза больше Od, в 2,2 раза меньше OOL. Глаза в относительно густых волосках; продольный диаметр в 1,3 раза больше поперечного, в 2,6 раза больше высоты щеки, почти равен ширине лица. Высота щеки в 1,2 раза меньше базальной ширины жвал. Ширина лица в 1,5 раза больше его высоты посредине с наличником. Ширина ротовой выемки в 1,25 раза больше расстояния от края выемки до глаза. Тенториальные ямки и клипеальный шов слабые. Голова ниже глаз сильно и почти прямолинейно суженная. Длина максиллярных щупиков в 1,5 раза меньше высоты головы. Усики нитевидные, максимальное число сохранившихся члеников равно 24. Длина скапуса в 1,3 раза больше его максимальной ширины. Длина 1-го членика жгутика в 2,2 раза больше его ширины на дистальном крае, в 1,2 раза больше длины 2-го членика. К вершине членики слабо укорачиваются.

Длина груди в 1,7 раза больше высоты. Нотаули неглубокие, но заметные. Предщитковое вдавление кренулированное. Субалярное




Рис 1—7 *Vlasop burzetivorus* sp. n.: 1—голова спереди, 2—голова сверху; 3—4 базальных членика усика, 4—заднее бедро; 5—брюшко, вид сверху; 6—переднее крыло, 7—заднее крыло

вдавление глубокое и узкое. Пропедеум выпуклый. Передние крылья по длине немного короче тела. Радиальная ячейка заметно укороченная, метакарп в 1,4 раза длиннее птеростигмы, в 3,1 раза длиннее расстояния от вершины ячейки до вершины крыла. Радиальная жилка отходит от середины птеростигмы, ее 2-й отрезок в 3,1 раза длиннее 1-го, почти в 2 раза короче 3-го, в 1,3 раза длиннее 1-й радиомедиальной жилки. Длина 2-й радиомедиальной ячейки в 2,4 раза больше ее ширины. Проксимальная сторона дискондальной ячейки в 1,5 раза длиннее дистальной. Длина заднего бедра в 3,4 раза больше его максимальной ширины. Внутренняя шпора задней голени в 2,8 раза короче заднего базитарзуса. Задние лапки равны задним голеним, их 2-й членик в 1,8 раза короче 1-го, почти равен 5-му (вместе с претарзусом).

Брюшко по длине немного больше головы и груди, вместе взятых. 1-й тергит с четкими дыхальцевыми бугорками перед серединой, с выпуклой срединной площадкой, ограниченной глубокими и грубокренулированными бороздками, до дыхалец сильно расширен, затем—слабо. Ширина тергита на заднем крае в 1,2 раза больше ширины у дыхалец, в 1,7 раза больше ширины на переднем крае, немного меньше его длины. Длина посредине 2-го тергита в 2 раза меньше его ширины спереди, немного больше длины 3-го; шов между ними глубокий, широкий, кренулированный, изогнутый, посредине с надломом вперед. 2-й тергит в основании посредине со слабоочерченным треугольником. Яйцеклад в 1,2 раза короче тела, в 1,6 раза длиннее брюшка.

Голова и грудь гладкие, лишь щеки густозернистые. Проподеум посредине на узком продольном участке в четких расходящихся морщинках. 1-й тергит брюшка почти сплошь неправильно морщинистый. 2-й и 3-й тергиты, кроме заднего края, в продольных четких морщинах, между которыми (особенно в задней половине) развита густая мелкая пунктировка. 4-й тергит густо и мелко пунктированный, лишь в основании со слабыми морщинками. Остальные тергиты гладкие. Тело почти сплошь в густых белых волосках.

Тело светло-красновато-коричневое. Усики, щупики, глазковый треугольник, пятна на мезонотуме, задняя треть щитика, низ среднегруди, проподеум, 1-й тергит брюшка, середина 2-го тергита и пятна на дистальных тергитах черные или темно-коричневые. Ноги черные или темно-красновато-коричневые, передние бедра в дистальных 2/3, передние голени и лапки, средние бедра дистально и средние голени в основании, задние бедра в дистальных 2/3 красновато-коричневые, иногда затемненные. Крылья дымчатые. Птеростигма и жилки темно-коричневые.

Самец. Длина тела 3,0—3,4 мм. Высота щеки в 3,4—4,2 раза меньше продольного диаметра глаза, в 1,4 раза меньше базальной ширины жвал. Ширина лица в 1,25—1,5 раза больше его высоты посредине с наличником. Усики 27—29-члениковые. Длина предвершинного членика в 1,7—1,8 раза больше его ширины, в 1,4—1,5 раза меньше длины вершинного. Метакarp в 2,2—2,5 раза длиннее расстояния от вершины радиальной ячейки до вершины крыла. 2-й отрезок радиальной жилки в 2,2—2,8 раза длиннее 1-го, в 1,2—1,3 раза длиннее 1-й радиомедиальной жилки. Проксимальная сторона дискоидальной ячейки в 1,5—1,7 раза длиннее дистальной. Ширина 1-го тергита брюшка на заднем крае в 1,1—1,2 раза меньше его длины. 2-й тергит по длине равен 3-му, оба тергита более грубо, чем у самки, морщинистые. Грудь и дистальные тергиты брюшка на большей части с черной окраской. Средние и задние бедра иногда почти сплошь черные, редко и передние ноги затемненные. В остальном похож на самку.

Голотип: ♀, Армения, Ехегнадзор, Малишка, из личинки *Anthaxia idoskii* Obenb на *Astragalus* (*Tragacantha*) sp., 12.VI.1987 (Калашян). Паратипы: 3 ♂ с этикеткой как у голотипа.

**Bracon buprestivorus sp. n. որպես Anthaxia Igockii Obenb.
մակարույծ Հայաստանում**

Հայաստանի իդեգնաձորի շրջանից նկարագրվում է *Bracon buprestivorus* sp. n. տեսակը, որը հանդիսանում է որպես սուտրագալների վրա զարգացող *Anthaxia Igockii* Obenb. ոսկեբզեզի մակարույծ: Նոր տեսակը մոտ է *Lucobracon* ենթասեռին պատկանող *B. (L.) fumatus* Szépl. տեսակին, տարբերվելով նրանից մի շարք կարևոր հատկանիշներով:

ЛИТЕРАТУРА—ԿՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

¹ В. И. Тобиас, Определитель насекомых европейской части СССР. Перепончатокрылые. Л., т. 3, № 4, с. 94—149 (1986). ² R. D. Skenesfelt, Hymenopterorum Catalogus. Braconidae. Gravenhage, v. 10, p. 1425—1872 (1978).