

УДК 595.768.23

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хизорян

Новые виды жуков-долгоносиков из рода
Larinus Germ. (Coleoptera, Curculionidae)

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР С. О. Мовсисяном 5/II 1990)

1. *Larinus reitterianus* Iablokoff-Khnzorian sp. nov.

Голотип с этикеткой: Persien Luristan, v. Bodemeyer, var. onopordinis, v. densidentatus mihi in lit., *Larinus* sp., Coll. Reitter.

Тело и конечности черные, в очень короткой беловатой простой прилегающей волосистости, местами отсутствующей или стертой. Головотрубка и темя густоволосистые, переднеспинка голая, с боков с широкой волосистой полосой, испещренной голыми точками, внутренний край ее извилистый. Надкрылья с широкой передней и узкой резко извилистой срединной перевязью. Низ тела, в особенности брюшко, густоволосистые, на брюшке с многочисленными голыми точками. Беловатых налетов нигде нет. Длина 18 мм. Рис. 1, 1.

Голова в двойной точечности, крупные точки неоднородные, как и мелкие распределены неравномерно, фон гладкий. Головотрубка (рис. 1, 2) сверху с уплощениями, с двумя продольными кантами до вершины, следом срединного кия и основного расширенного седловидного уплощения, снизу без бороздки, с боков слегка сдавлена к середине, ее верхний край едва выпуклый, нижний—прямой, без щетинок, ее длина в 3,7 раза больше ширины у вершины и втрое—толщины. Усиковые бороздки плоско дуговидные, у вершины отделены друг от друга плоским полем. 1-й членик усиков вдвое короче ширины головы, в 1,7 раза уже головы у глаз, в 2,5 раза длиннее 2-го. Лоб с ямочкой и с тонкой продольной бороздкой. Глаза едва выпуклые, втрое длиннее ширины.

Переднеспинка на треть шире длины, с боков с четкой вершинной перетяжкой за длинной шейкой, в очень грубой, почти равномерной точечности на густо и мелко точечном фоне, с цельной продольной бороздкой и длинной основной лопастью. Переднегрудь с широкой и плоской подглоточной вырезкой и мелкими тупотреугольными заглазничными лопастями, с густой бахромкой щетинок.

Надкрылья яйцевидные, в 1,35 раза длиннее общей ширины, со скошенными плечами и густоточечными цельными бороздками, точечность которых сглажена дистально, промежутки между бороздками очень густо и мелко точечные на гладком фоне. Боковой край надкрылий плавно закруглен до тупого и закругленного пришовного угла.

Бока переднегруди очень грубо и густо точечные на мелкоточечном фоне. Передние бедра с четкой вершинной перетяжкой. Передние голени с густым рядом острых зубчиков.

2-й членик лапок в 1,5 раза шире длины.

Этот вид близок к группе *L. oporordi*, от всех прочих видов рода отличается густой и равномерной волосистостью надкрылий, отсут-




Рис. 1 *Larinus reitterianus* nov. — голотип. 1—габитус; 2—головотрубка сбоку и сверху

вующей на двух извилистых перевязях, а от многих видов группы—отсутствием даже следов меловидного пятнистого белого налета.

Голотип, по-видимому, самка, так как его брюшко полностью изъедено антренами, хотя пенис обычно ими не поедается.

2. *Larinus turanicus* Petrl.

1907. Verhändl. Naturforsch. Vereins in Brünn, 45: 2 sub *L. inaequalicollis* Cap., var. *turanicus* Petrl.

Голотип. Boukharia EST Ch. Bartschewski, Etc 1891.

3 паратипа: Turkestan, Ussch-tjube, Turkestan, Kyndyr-T., Buchara.

Обильный материал в Институте зоологии АН АрмССР в Ереване, собранный в Таджикистане в июне-июле, на мордовниках (Комсомолабад, Ганиноб, Ньюльванд).

Тело и конечности черные, волосистость белая, образует по бокам переднеспинки крупное нерезкое пятно, внутренний край которого извилистый, на надкрыльях—многочисленные пятна и крапинки неправильного очертания и разных размеров. Длина 11—13 мм. Рис. 2, 1

Головотрубка прямолинейная, параллельнобокая, слегка короче переднеспинки, густо неоднородно мелко точечная на гладком фоне, с двумя ±четкими плоскими, дистально укороченными вдавлениями, у




Рис. 2 Виды рода *Larinus* Germ. 1—*L. turanicus* Petri самка-губитус. 2—11—пенисы у видов из рода *Larinus* Germ.: 2—*L. turanicus* Petri из Таджикистана — пенис сверху; 3—то же, пенис сбоку; 4—*L. cynarae* F. из Франции (Beziers)—пенис сверху и сбоку; 5—то же, вершина пениса сверху; 6—*L. oporordi* F. из Армении—пенис сверху и сбоку; 7—то же, вершина пениса сверху; 8—*L. inaequalicollis* Cap. из Армении—пенис сверху и сбоку; 9—то же, вершина пениса сверху; 10—*L. vulpes* Ol. из Поволжья—пенис сверху и сбоку; 11—то же, вершина пениса сверху. Масштаб: рис. 3, 4, 6, 8, 10, а 2 мм, рис. 2, 5, 7, 9, а 1 мм

основания соединенными подковообразно, густо коротко волосистая, у ♂ в 3, у ♀ 3,5 раза длиннее толщины и ширины, с неровностями, снизу

с короткими косыми щетинками, иногда и с продольными килем, их усиковые бороздки выпрямлены, у основания загнуты вниз и здесь отделены друг от друга узким килем. Глаза в 2,8 раза длиннее ширины, слегка сужены книзу. Лоб иногда с ямкой. Усики тонкие, их 1-й членик такой же длины, как ширина головы у основания глаз, длиннее члеников 2—7, вместе взятых, 2-й едва длиннее 3-го, виски плоские. Переднеспинка в $1 \frac{2}{3}$ раза шире длины, покрыта крупными густыми плоскими точками и мелкими, очень густыми, на гладком фоне. Ее задние углы сверху выглядят острыми, диск иногда с тонким килем. Надкрылья овальные, с выступающими закругленными плечами, примерно в $1 \frac{1}{4}$ раза длиннее общей ширины, с тонкими густоточечными бороздками, с часто грубыми, в основном поперечными морщинками на гладком фоне, у вершины двух 1-х бороздок точки исчезают. Низ тела в негустых простых волосках. Голени и бедра с цельной бахромой из коротких косых щетинок. Передние бедра со слабой дистальной перевязкой. Передние и средние голени дугообразно изогнутые, передние голени вдоль внутреннего края очень мелко и тонко зазубренные. Все членики лапок удлинненные. Пенис (рис. 2,2) с заостренной вершиной.

От родственных этот вид можно отличить с помощью следующей таблицы:

- 1(2) Головотрубка без щетинок, у ♂ в 2,2, у ♀ в 2,3—2,6 раза длиннее толщины, без вершинного сужения. Переднеспинка в 1,7 раза шире длины. Надкрылья в 1,7 раза длиннее общей ширины, с многими мелкими крапинками, сгущенными к вершине надкрылий, часто полностью стертыми. Бедра без щетинок. Пенис: рис. 2,3. 12—16 мм. На мордовниках. Поволжье, Кавказ, Передняя и Средняя Азия 1. *L. inaequalicollis* Cap.
- 2(1) Головотрубка снизу с косыми щетинками. Переднеспинки в 1,6— $1 \frac{2}{3}$ раза шире длины. Надкрылья в $1 \frac{1}{4}$ —1,4 раза длиннее общей ширины, с волосистыми пятнами различной формы, от которых остаются по крайней мере следы. Бедра снизу с щетинками. 11—13 мм. На мордовниках.
- 3(4) Головотрубка у вершины сужена, у ♂ в 1,8, у ♀ в 2,8 раза длиннее толщины. Пенис: рис. 2, 4. Средиземноморье, юг европейской части СССР, Средняя Азия, Сибирь 2. *L. vulpes* (O.).
- 4(3) Головотрубка трубчатая до вершины, у ♂ в 3, у ♀ в 3,5 раза длиннее толщины. На надкрыльях пятна мельче, обильнее и иного очертания. Пенис: рис. 2, 2 (основной отличительный признак) 3. *L. turanicus* Petri

В статье длина головотрубки измерена от нижнего края глаз до вершины и без мандибул. Все типы находятся в Естественно-историческом музее Венгрии в Будапеште (нам любезно присланы О. Мерклем).

**Երկարակնիք բզեզների նոր տեսակներ *Larinus* Germ. սեռից
(Coleoptera, Curculionidae)**

Նկարագրված է երկարակնիք բզեզների նոր տեսակ— *L. reitterianus* Khn. Իրանից և *L. turanicus* Petr. տեսակը բարձրացվել է նոր սանգ, որը նկարագրված էր որպես *L. inaequalicollis* Cap. վարիտես *Տաջիկստանից*: Երկու տեսակների տիպերը նկարագրված են Օ. Մերկլի կողմից, Բուդապեշտում պանվոզ Հունգարիայի բնուպատմական թանգարանից ուղարկված նյութի հիման վրա. որտեղ էլ պահպանվում են տիպերը: