

УДК 595.763.34

ЭНТОМОЛОГИЯ

М. Ю. Калашян

Новый вид рода *Zibus* Saulcy (Coleoptera, Pselaphidae)
 из окрестностей Еревана

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР С. О. Мовсисяном 8/II 1990)


Zibus vuponiae Kalashian, sp. nov.

АрмССР, окр. Еревана, п. Советашен, из растительных отбросов на муравейнике *Messor caducus caucasicola* Arnoldi, 31.03.88 г., эк-лекторная проба. Голотип, самец, в коллекциях Института зоологии АН АрмССР.

Тело узкое, выпуклое, красно-бурое, конечности и придатки голо-вы светлее. Длина 1,1 мм (рисунок, а).

Голова почти треугольная, слегка шире длины, заметно уже пе-реднеспинки, спереди оттянута в узкую лобную лопасть, несущую ма-ленькую округлую срединную ямку, от которой идут тонкие бороздки к краю лба над основанием антенн. При осмотре сбоку голова выгля-дит треугольной, слегка длиннее высоты, сочленовные ямки антенн рас-положены в неглубоких вдавлениях, сверху и сзади отграниченных тонкой бороздкой, эта бороздка затем отогнута назад и продолжена к нижнему краю глаз. На нижней поверхности головы в передней части имеется несколько грубых простых щетинок. Скапус маленький, педи-целлюм крупный, заметно длиннее ширины, III—VIII членики антенн сходных размеров, почти округлые, IX шире предыдущих, поперечный, X резко асимметричный, с резко выступающей передней частью, XI крупный, слегка неравномерно сужен дистально. Переднеспинка вы-пуклая, слегка поперечная, сердцевидная, наибольшей ширины между передними $1/4$ и $1/3$, у середины основания с округлой ямкой, от ко-торой вперед и вбок отходят две четкие изогнутые бороздки, достигаю-щие бокового края переднеспинки, который здесь выглядит слегка вдавленным. Позади этих бороздок имеется пара нерезких округлых ямок по бокам от срединной. Вдоль основания переднеспинки прохо-дит бороздка, несущая несколько грубых точек. Надкрылья слегка шире длины, каждое с двумя ямками у основания, из них медиальная продолжена вдоль шва узким вдавлением, кзади сглаживающимся, но почти достигающим вершины надкрылий, латеральная продолжена ко-ротким вдавлением, немного не достигающим середины надкрылий. Видимая сверху часть брюшка длиннее и слегка шире надкрылий. 3-первых видимых тергита поперечно прямоугольные, приблизительно сходных размеров, вершинный маленький, резко сужен дистально. Зад-

негрудь выпуклая, вдоль середины уплощенная. Голени слегка расширены дистально; коготковые членики лапок без шипика у основания коготка. Генитальная крышечка (рисунок, в) треугольная, с почти прямолинейными боковыми и широко закругленным вершинным кра-



Zibus yuotae sp. nov. а—общий вид (левые конечности не показаны); б—пенис; в—генитальная крышечка

ем. Пенис (рисунок, б) слабо хитинизированный, с пучком филаментов, полностью втянутых в капсулу пениса.

К роду *Zibus* Sauley относится еще один средиземноморский вид—*Z. liocerphalus* Aube, известный по немногим особям из ряда пунктов от южной Франции до Сирии, Ливана. Судя по его описанию ((¹), с. 364), он отличается от нашего вида наличием «головчатых» щетинок (*capitulate setae*) на нижней поверхности головы, отсутствием точечной бороздки вдоль основания переднеспинки, наличием шипика у основания коготков, формой генитальной крышечки с закругленными боковыми и почти прямолинейным вершинным краем, а также строением гениталий самца с более длинными филаментами, выступающими из капсулы.

Назван в честь Ю. Р. Ханбекян, передавшей нам материал по новому виду. Мы выражаем также нашу признательность Г. Р. Аракелян, определившему муравьев, с которыми найден этот вид.

Институт зоологии
Академии наук Армянской ССР

**Zibus saulgy (Coleoptera, Pselaphidae) սեռի նոր տեսակ
նրեանի շրջակայքից**

Նկարագրվում է *Zibus yunonae* sp. n տեսակը նրեանին կից Սովետա-
շեն տվանի մոտակայքից: *Zibus Saulcy* սեռին պատկանում է ևս մեկ միջ-
երկրածովային տեսակ— *Z. Hocephalus* Aubé, որը տարբերվում է նոր տե-
սակից մի շարք կարևոր հատկանիշներով, ինչպես արտաքին կառուցված-
քով, այնպես էլ արուի գենիտալներով:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

¹ *C. Besuchet*, Mitteln. Schweiz. Ent. Gesellsch., v. 21 (1), p. 363—372
(1956).