

УДК 595.765.8

ЭНТОМОЛОГИЯ

М. Ю. Калашян

Sphenoptera khosrovica sp. nov.
новый вид златки из Армении
(Coleoptera, Buprestidae)

(Представлено академиком АН Армянской ССР С. О. Мовсесяном 12/III 1990)


Sphenoptera khosrovica Kalashian, sp. nov.

АрмССР, Араратский р-н, Вединский участок Хосровского заповедника, 1—10.06.1986 г., К. Н. Еранян. Голотип, самец, в коллекциях Института зоологии АН АрмССР.

Тело бронзовое, выпуклое, довольно широкое, верх голый, кроме немногочисленных коротких светлых волосков в передней части лба, низ в недлинных блестящих прилегающих волосках, довольно густых на боках груди и брюшка, к середине изреженных, отросток переднегруди и узкое продольное вдавление у середины заднегруди в густых торчащих волосках. Длина 11,6, ширина 4,4 мм.

Антенны пильчатые, начиная с 4-го членика, их 2-й членик заметно короче 3-го и приблизительно равен по длине 4-му. Лоб выпуклый, едва сужен назад, у середины с парой слабых неправильных рельефов, отграничивающих очень неглубокое вдавление, начинающееся от переднего края лба и треугольно сужающееся между рельефами; позади рельефов имеется пара нерезких почти округлых маленьких вдавлений. Пунктировка лба образована глубокими округлыми точками, сгущенными во вдавлениях и почти отсутствующими на рельефах. Темя в 4,5 раза шире глаза, его пунктировка мельче, чем на лбу. Голова в мелкосетчатой шагреневке, матовая. Переднеспинка в 1,45 раза шире длины, наибольшей ширины приблизительно у основной трети, вперед сужена заметно сильнее, чем назад, к острым притупленным основным углам, перед которыми боковой край слегка вогнут. Передний край переднеспинки слабо двувыемчатый, между ее передними углами и уровнем внутреннего края глаза со слабо обособленной краевой бороздкой. Боковые кили переднеспинки достигают ее передней трети, на большей части длины почти прямолинейные, сзади отогнуты вниз, к основным углам (см. сбоку). Основание переднеспинки двувыемчатое, с коротко срезанной перед щитком срединной лопастью. Диск у середины с большим овальным слабо выпуклым полем, достигающим ее переднего и заднего краев, полностью разделенным узким срединным продольным вдавлением; латерально это поле отграничено слабым продольным вдавлением, впереди почти совсем сглаженным, у передней трети разделенным

слабым косым узким рельефом, направленным от бокового края овального поля к передним углам переднеспинки, которых он далеко не достигает. Кнаружи от вдавления край переднеспинки в основных $2/3$ приподнят в виде слабого широкого бортика. Срединное вдавление переднеспинки густоточечное на фоне мелкосетчатой шагренировки, слегка выходящей за пределы вдавления, овальное поле гладкое, блестящее, с немногочисленными грубыми округлыми точками, бока переднеспинки шагренированные, матовые, латеральные вдавления в густых округлых точках, кнаружи от вдавления точки более или менее вытянуты продольно, сильнее вдавлены у своего наружного края, сглажены у внутреннего и при косом освещении выглядят полулунными. Приблизительно вдоль основных $2/3$ внешнего края латеральных вдавлений расположена группа четких извилистых длинных морщинок, спереди прерванная вышеописанным косым рельефом, кпереди эта структура продолжена группой коротких изогнутых черточек. Помимо описанной скульптуры, переднеспинка в почти равномерных редких мельчайших точках (заметны при увеличении $\times 30$). Щиток небольшой, поперечный, его основная часть полукруглая со слегка угловатыми боками. Надкрылья в 1,9 раза длиннее ширины, с выступающими плечевыми буграми, слабо слегка вогнуто сужены к вершинным $2/5$, затем резко и почти прямолинейно — к порознь угловато закругленным вершинам; имеется четкий пришовный зубчик. Ряды надкрылий образованы короткими четкими черточками, четные промежутки плоские, местами со слабыми поперечными морщинками, нечетные резко килевидно приподнятые,



Sphenoptera sp., пеннсы. а — *Sph. sculpticollis* Heyd. (синтип); б — *Sph. Khosrovica* sp. n. (синтип) Длина масштабной линейки соответствует 1 мм

кили 5-го и 9-го промежутков слиты дистально, киль 7-го достигает приблизительно вершинной трети надкрылий. Надкрылья в немногочисленных мелких слегка вытянутых продольно точках, расположенных на четных промежутках в 2, на нечетных—в 1 слабо различимый ряд. Покровы на плечевых буграх, приподнятой прищитковой области и первых трех киях надкрылий почти совсем гладкие, блестящие, остальная поверхность мелкосетчатая, матовая. Киль бокового края надкрылий четкий до их вершины. Бока груди в неравномерных густых точках, частью сливающихся в извилистые морщинки, брюшко в округлых негустых точках. Отросток переднегруди слабо выпуклый, с параллельными боками, окаймленными четкой бороздкой, прерванной у его задних боковых углов и отграничивающей узкие блестящие бортики, середина отростка в густых округлых точках и длинных торчащих волосках; заднегрудь вдоль середины узко вдавлена, на это вдавление с отростка переднегруди продолжена густо точечная и волосистая полоска. Анальный стернит коротко срезан дистально. Передние голени резко изогнуты, средние в вершинной трети внутреннего края с дуговидной вырезкой, дистально отграниченной четким коротким зубцом. Пенис—рисунок, б.

Новый вид наиболее близок к *S. sculpticollis* Heyd., отличается формой переднеспинки и надкрылий (у *S. sculpticollis* переднеспинка наибольшей ширины приблизительно у середины, сильнее, чем у нового вида, сужена назад, надкрылья в основных 2/3 почти параллельнобокне), более четким и широким продольным срединным вдавлением переднеспинки, а также строением гениталий самца (пенис *S. sculpticollis* — рисунок, а).

Институт зоологии
Академии наук Армянской ССР

Մ. Յու. ՔԱՆԵՅԱՆ

Sphenoptera khosrovica sp. nov. սկիւրգեզի նոր տեսակ
Հայաստանից (Coleoptera, Buprestidae)

Նկարագրվում է *S. khosrovica* sp. nov. նոր տեսակը խոսրովի արգելանոցի վեդի տեղամասից: Նոր տեսակը մոտ է *S. sculpticollis* Heyd. տեսակին, տարբերվելով նրանից արտաքին կառուցվածքի և արուի գենիտալների որոշ առանձնահատկութուններով: