

УДК 595.422:592/599:001.4

АКАРОЛОГИЯ

Э. С. Арутюнян

Новый вид рода *Hypoaspis* Canestrini, 1884 s. l.
(Parasitiformes, Mesostigmata: laelaptidae)

(Представлено академиком АН Армении С. О. Мовсесяном 20/IV 1990)


При изучении фауны паразитиформных клещей Армении в Гугаркском районе (окрестности г. Кировакана) в почве был собран новый вид клеща из семейства Laelaptidae Berlese, 1892, описание которого приводится ниже. Номенклатура щетинок в тексте дается по Эвансу (¹) и Ванштейну (^{2,3}) с некоторыми изменениями. Размеры указаны в микронах (мкм). Ширина дорсального щита измерялась на уровне щетинок D_5 .

Hypoaspis marianuchi Arutunjan sp. nov.

Материал. Голотип: ♀, Армянская ССР. Гугарский район, почва 10.10.1984, препарат № 2348. Паратипы: тот же препарат (№ 2348) 3 ♀.

Типы хранятся в лаборатории акарологии Института зоологии АН Армении.

Самка (рис. 1—6). Дорсальный щит сужен к заднему концу.



Hypoaspis marianuchi sp. nov. Самка (1—6): 1—сверху; 2—снизу; 3—нога II; 4—нога III; 5—нога IV; 6—хелицера

На щите 39 пар щетинок, кроме первой и седьмой пары меднальных щетинок ($M_{1,2}$) и седьмой, восьмой и десятой пары спинных щетинок ($D_{7,8,9}$) остальные щетинки в конце булавовидно расширены. Длина дорсального щита 715, а ширина—405. Стернальный щит удлиненный с округленным задним краем, несет 3 пары щетинок. Генитальный и анальный щиты узкие. Щетинки сзади вентральной стороны в основном булавовидные. Неподвижный палец хелицер, кроме игловидного придатка, вооружен 2 большими и 10 мелкими зубцами, а подвижный—двумя зубцами. На лапках II пары ног 3 толстые игловидные щетинки, из которых две расположены близ вершины лапки. Щетинки II, III, IV ног шиповидные, щетинковидные и, в основном, булавовидные.

Самец неизвестен.

По количеству щетинок и по строению дорсального щита вид близок к *Hypoaspis* (*Geolaelaps*) *aculeifer* (Canestrini, 1883), но по строению дорсальных и вентральных щетинок, строению щетинок I—IV ног и количеству зубцов неподвижного пальца хелицер и другим особенностям эти виды хорошо различаются.

Институт зоологии Академии наук
Армении

Է. Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Նոր տեսակ *Hypoaspis* Canestrini, 1884 սեռից (Parasitiformes, Mesostigmata: Iaelaptidae)

Ներկա հոդվածում նկարագրվում է Հայաստանում տղերի ուսումնասիրության ընթացքում հայտնաբերված *Laelaptidae* ընտանիքին պատկանող տղերի մի նոր տեսակ: Տեսակը.— *Hypoaspis marianuchi* sp. nov. հայտնաբերված է 1984 թ. հոկտեմբերին Կիրովական քաղաքի շրջակայքի հողային նմուշից: Այս նոր տեսակը նման է *Hypoaspis* (*Geolaelaps*) *aculeifer*-ի և բայց մեջքային և փորային խողանների կառուցվածքով ու չափսերով, առաջինից շորրորդ ոտքերի խողանների ձևով, խելիցների անշարժ մատի ատամիկների քանակով և մի շարք այլ հատկանիշներով նրանից տարբերվում է:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- ¹ G. O. Evans, J. Linn. Soc. London, Zool., v. 43 (291), p. 203—259 (1957).
- ² B. A. Wainstein, Acarologia, v. 4 (1), p. 5—30 (1962). ³ Б. А. Вайнштейн, Зоол. журн., т. 52, № 2, с. 274—277 (1973).