УДК 577.152.24

Л. В. Карабашян, Д. Л. Арутюнян, А. Г. Мхитарян

Активация (АДФ-рибоза) полимеразы олигодезоксинуклеотидными комплексами

((Представлено чл.-корр. НАН Армении К. Г. Карагезяном 8/IV 1994)

(АДФ-рибоза) полимеразы (КФ 2.4.99) — ядерный фермент, катализирующий посттрансляционную модификацию ядерных белков, используя НАД в качестве донора модифицирующей группы (1). Данный фермент вовлечен в ряд биологических процессов, сопровождающихся разрывом и восстановлением цепей ДНК, таких как структурные перестройки хроматина, репарация и репликация ДНК, клеточная пролиферация и дифференциация (2).

(АДФ-рибоза) полимеразы проявляет каталитическую активность при взаимодействии с ДНК, содержащей разрывы одной или обеих цепей (3). Несмотря на ряд исследований, посвященных изучению взаимодействия (АДФ-рибоза) полимеразы с различными типами ДНК (3,4), механизм активации этого фермента остается невыясненным. Отчасти это связано со сложностями при интерпретации и обобщении результатов исследований, ввиду того, что в этих работах использовалась ДНК различного происхождения, состава, структуры и химического строения концевых участков. Для удобства интерпретации полученных данных представляется целесообразным использование в качестве активаторов (АДФ-рибоза) полимеразы синтетических ДНК известного состава и строения.

В настоящем сообщении приведены результаты исследования особенностей активации (АДФ-рибоза) полимеразы синтетическими дуплексами, сформированными из гомологичных олигомеров дезоксиаденозинфосфата и дезокситимидинфосфата — $d(pA)_{530}$, $d(pA)_{16}$, $d(pT)_{16}$.

В работе использовали НАД, гистон Н1, ДНК тимуса теленка производства «Sigma», [аденин- $U-^{14}C$] НАД — «Amersham», нуклеазу S 1 — «Serva», олигодезоксинуклеотиды $d(pA)_{16}$, $d(pT)_{16}$, а также $d(pA)_{530}$ длиной 530 ± 50 нуклеотидных остатков, которые были предоставлены Е. А. Невинским (Новосибирский институт биоорганической химии).

(АДФ-рибоза) полимеразу из семенников быка получали по методу, описанному в работе (5). Активность фермента определяли по реакции автоАДФ-рибозилирования (5). Олигодезоксинуклеотидные дуплексы получали смешиванием соответствующих компонентов в 5 мМ

трис-НСI буфере (рН 8,0), содержащем 5 мМ MgCl₂, 0,05 М NaCl, и 0,5 мМ дитиотрейтол. Смесь прогревали на водяной бане до 50°С, инкубировали в течение 3—5 мин, затем выдерживали в течение 1 ч. при 25°С. При получении дуплексов типа d(pA)₅₃₀:[d(pT)₁₆]_n концентрация d(pA)₅₃₀ составляла 10⁻⁵ М, концентрация d(pT)₁₆ — n × 10⁻⁵ М, где 0 < n < 30. При получении остальных дуплексов компоненты смешивали в эквимольной пропорции в концентрациях 10⁻⁶—10⁻⁵ М. Гидролиз дуплексов нуклеазой S1 проводили в 50 мМ натрий-ацетатном буфере (рН 4,5), содержащем 0,2 М NaCl, 1 мМ ZnCl₂, 0,5% глицерин при 25°С. Концентрация d(pA)₅₃₀:[d(pT)₁₆]₁₀ в реакционной смеси составляла 10⁻⁵ М. Содержание нуклеазы S1 составляло 3—5 ед. на 1 мкг олигодезоксинуклеотида. Уровень гидролиза дуплексов контролировался методом электрофореза в ПААГ.

Исследования показали, что ни один из испытанных олигодезоксинуклеидов d(pA)₅₃₀, d(pA)₁₆, d(pT)₁₆ в концентрациях до 10⁻⁵ М вне комплекса не активирует (АДФ-рибоза) полимеразу. Указанные нуклеотиды в тех же концентрациях не оказывают влияния на реакции, катализируемые ферментом в присутствии высокомолекулярной тимусной ДНК. Эти данные свидетельствуют о том, что однонитевые олигодезоксинуклеотиды не взаимодействуют с (АДФ-рибоза) полимеразой и не конкурируют с ДНК за место связывания. Вместе с тем эквимольные смеси комплементарных олигодезоксинуклеотидов [d(pA)₅₃₀:d(pA)₁₆]; [d(pA)₁₆:d(pT)₁₆] при концентрациях в интервале 10⁻⁸—10⁻⁶ М, обработанные описанным выше методом, являются эффективными активаторами (АДФ-рибоза) полимеразы в реакции автоАДФ-ряболизирования. Эти данные свидетельствуют об образовании из комплементарных олигодезоксинуклеотидов дуплексов, являющихся активаторами фермента.

Анализ зависимостей скоростей ферментативной реакции от концентрации дуплексов d(pA)₅₃₀:[d(pA)₁₆]_n в координатах Лайнуивера—Берка при различных n показал, что повышение n до 30 не отражается на V_{max} реакции, составляющей 1200 нмоль/мин на 1 мг белка. В то же время увеличение n сопровождается понижением K_m дуплекса. На рис. 1а представлена зависимость K_m дуплексов d(pA)₅₃₀:[d(pA)₁₆]_n от n, из которой следует, что при повышении n до 15 понижение происходит по обратнопропорциональной зависимости. Дальнейшее увеличение n не отражается на значении K_m. Поскольку дуплексы указанного типа моделируют ДНК с однонитевыми разрывами, а параметр n представляет собой количество d(pT)₁₆, связанных с комплементарными d(pA)₅₃₀, и соответствует числу этих разрывов, следует предположить, что наблюдаемое понижение K_m дуплексов обусловлено фактическим увеличением количества активирующих участков дуплексов.

На рис. 1,б показана зависимость K_m активирующих участков дуплекса от n, представленная в виде K_m d(pT)₁₆. Видно, что K_m активирующих участков не зависит от n при n < 15. Дальнейшее повышение n до 30 сопровождается линейным ростом K_m d(pT)₁₆. Неизменность V_{max} и K_m от n (для K_m в интервале 0 < n < 15) позволяет заключить, что разрывосодержащие участки дуплексов d(pA)₅₃₀:[d(pT)₁₆]_n обладают как одинаковой активирующей эффективностью, так и одинаковым сродством к (АДФ-рибоза) полимеразе. При этом активирующая эффективность не зависит от размера однонитевого фрагмента дуплекса во всем исследованном интервале n, а сродство к ферменту—только в

Рис. 1. Зависимость K_m дуплексов $d(pA)_{530} : [d(pT)_{16}]_n$ от значения n . а— K_m , рассчитанная по концентрации $d(pA)_{530}$; б— K_m , рассчитанная по концентрации $d(pT)_{16}$.

K_m олигодезоксинуклеотидных дуплексов и V_{max} реакции автоАДФ-рибозилирования

Дуплексы	$K_m d(pT)_{16}$, нМ	V_{max} , нмоль · мин ⁻¹ на 1 мг белка
$d(pA)_{530}:d(pT)_{16}$	8	1200
$d(pA)_{530}:[d(pT)_{16}]_{10}$	8	1200
$d(pA)_{16}:d(pT)_{16}$	12	1100
$d(pA)_{16}:d(pT)_{16}^*$	16	1100

* Дуплексы, полученные путем гидролиза дуплексов $[d(pA)_{530}]:[d(pT)_{16}]_{10}$ нуклеазой S1.

интервале $0 < n < 15$. Не исключено, что уменьшение размера однонитевого фрагмента дуплекса при $n > 15$ может отразиться на значении K_m . Однако наблюдаемое повышение K_m при $n > 15$ скорее всего связано со стерическими факторами. Очевидно, что дуплекс ограниченного размера может связывать ограниченное число молекул фермента. Пренебрегая возможным влиянием однонитевого фрагмента на K_m , можно заключить, что исследованный дуплекс может связывать одновременно не более 15 молекул (АДФ-рибоза) полимеразы. Это заключение подтверждается тем фактом, что аналогичные закономерности наблюдались при исследовании зависимости K_m активирующих центров от n для дуплексов $d(pA)_{530}:[d(pT)_{10}]_n$.

Для получения информации об активирующей эффективности концевых двухцепочечных разрывов в качестве моделей активирующей ДНК были использованы дуплексы, сформированные из эквимольных количеств $d(pA)_{16}$ и $d(pT)_{16}$, а также гидролизаты дуплекса $d(pA)_{530}:[d(pT)_{16}]_{10}$, полученного путем его обработки нуклеазой S1, строго специфичной к однонитевым участкам ДНК.

В табл. 1 приведены K_m активирующих участков различных дуплексов, а также V_{max} реакции автоАДФ-рибозилирования. Видно, что двухцепочечные разрывы по сравнению с одноцепочечными обладают несколько худшим сродством к (АДФ-рибоза) полимеразе. Однако, судя по незначительной разнице в значениях V_{max} (не более 10%), активирующая эффективность одно- и двухцепочечных разрывов практически не различается при неизменности нуклеотидного состава и химической структуры концевой участка.

Институт молекулярной биологии
НАН Армении

Լ. Վ. ԿԱՐԱՔԱՇՅԱՆ, Գ. Լ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Ա. Գ. ՄԵՒԹԱՐՅԱՆ

(ԱՒՖ-ի ռիբոզ) պոլիմերազի ակտիվացումը օլիգոդեզօսինուկլեոտիդային կոմպլեքսներով

Օլիգո- և պոլիդեզօսինուկլեոտիդներից ձևավորվել են երկշղթայանի կոմպլեքսներ, որոնք մոդելավորում են մի- և երկշղթայանի կարավածքներ պարունակող ԴՆԹ:

Ցույց է տրված, որ օլիգոդեզօսինուկլեոտիդները չեն կարող ակտիվացնել (ԱՒՖ-ռիբոզ)պոլիմերազը: Օլիգոդեզօսինուկլեոտիդներից ձևավորված երկշղթայանի կոմպլեքսները ցուցաբերում են ֆերմենտը ակտիվացնելու

բարձր ունակություն ավտո ԱԴՑ-ուրեղիացման ռեակցիայում: $d(pA)_{630} : [d(pT)_{10}]^n$ տիպի կոմպլեքսների կտրվածք պարունակող հատվածները օժտրված են ֆերմենտի ակտիվացման նույն էֆեկտիվությամբ և ֆերմենտի նկատմամբ նույն խնամակցությամբ: Ֆերմենտն ակտիվացնելու էֆեկտիվությամբ էականորեն չեն տարբերվում նաև մի- և երկշղթայանի կտրվածքները, նուկլեոտիդային վազմի և ծայրային հատվածի քիմիական կառուցվածքի անփոփոխություն դեպքում:

Л И Т Е Р А Т У Р А — Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

- ¹ K. Ueda, O. Hayaishi, Ann. Rev. Biochem., v. 54, p. 73—100 (1985). ² G. de Murcia, A. Huletzky, G. G. Poirier, Biochem. Cell Biol., v. 66, № 6, p. 626—635 (1988). ³ U. Ohgushi, K. Yoshihara, T. Kamiya, J. Biol. Chem., v. 255, № 13, p. 6205—6211 (1980). ⁴ R. C. Benjamin, D. M. Gill, J. Biol. Chem., v. 255, № 21, p. 10502—10508 (1980). ⁵ Л. В. Карабашян, Д. Л. Арутюнян, А. А. Погосян и др., Биохимия, т. 53, № 4, с. 580—585 (1988).