

Հ. Ա. ԽԱՆՈՑԱՆ

ԹՈՔԱՅԻՆ ՈՉ ՍՊԵՑԻՖԻԿ ԽՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՆ ՈՒ ԵԼՔԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԺԻՇԿԱՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ (1958—1965 թթ.)

Հայաստանի բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտի թերապևտիկ կլինիկան իր գոյության ութ տարվա ընթացքում կատարելագործելով բուժման մեթոդները, հարստացնելով այն նորանոր միջոցներով, օգտագործելով բժշկական նորագույն տեխնիկան, բուժել և աշխատանքի է վերադարձրել բազմաթիվ հիվանդներ:

Այդ թերապևտիկ հիվանդների մեջ իրենց ուրույն տեղն են գրավում թոքային ոչ սպեցիֆիկ խրոնիկ հիվանդությունները:

Այս աշխատանքի նպատակն է թերապևտիկ կլինիկայից անցած հիվանդների ընդհանուր թվից անջատել թոքային այդ հիվանդներին, ուսումնասիրել հիվանդությունների շարժման պատկերը, նրանց տեսակարար կշիռը, շարժման օրինչափությունները, որոնք կկարողանան օգնել այդ հիվանդների հետագա բարձրորակ բուժման կազմակերպմանը: Մշակման նյութը քաղված է բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտի թերապևտիկ կլինիկայի 1958—65 թթ. ժամանակաշրջանի հիվանդների ընդհանուր տվյալներից:

Թոքային ոչ սպեցիֆիկ խրոնիկական հիվանդություններն աչքի են ընկնում իրենց տարածվածությամբ (ինչպես ցույց է տալիս 1-ին աղյուսակը) և դժվարաբուժությամբ (ինչպես մենք կտեսնենք հաջորդ աղյուսակներում):

Մեր հետազոտությունները պարզել են, որ թերապևտիկ կլինիկայում ընդունված հիվանդներից՝

1958 թ. թերապևտիկ	575	հիվանդից թոքայինը	կազմել է	25 հ.—4,4 %
1959 թ. »	779	»	»	66 հ.—8,5 %
1965 թ. »	1636	»	»	141 հ.—8,6 %

իսկ մահճակալ օրերը՝ թերապևտիկ հիվանդների

1958 թ. կազմել է	2080,	որից թոքայինը	661	մահճ. օր—5,5 %
1959 թ. »	15400	»	1638	մահճ. օր—10,6 %
1965 թ. »	34931	»	3768	մահճ. օր—10,6 %

Ուսումնասիրված ժամանակաշրջանի երկրորդ կեսից սկսած թոքային հիվանդների և՛ մահճակալ օրերն են ավելացրել, և՛ քանակը (աղյուսակ 1), կապված թերապևտիկ հիվանդների քանակի բարձրացման հետ, որը բացատրվում է մահճակալների քանակի շատացմամբ, այսինքն՝ 1958 թ. մինչև 1961 թ. մահճակալների քանակը թերապևտիկ կլինիկայում եղել է 50, իսկ 1962 թվին հասել է 100-ի:

Վերոհիշյալ ժամանակաշրջանում թոքային հիվանդներն ըստ քանակի կազմել են թերապևտիկ հիվանդների միջին թվով 7 տոկոսը, իսկ ըստ մահ-

ճակատ օրերի՝ 8,5 տոկոսը: Թոքային հիվանդանքների մահճակատ օրերի տոկոսի բարձր լինելը բացատրվում է այդ հիվանդանքների բուժման երկարատևությամբ (մեկ թոքային հիվանդի բուժման միջին տևողությունը 25,6 մահճակատ օր է, իսկ թերապևտիկինը՝ 20,2 մահճակատ օր):

Աղյուսակ 1

Տարե- թիվը	Հիվանդ. բացարձակ թիվը			Մահճակատների թիվը		
	Թերապևտիկ	որից թոքային		Թերապևտիկ	որից թոքային	
		քանակը	տոկոսը		քանակը	տոկոսը
1958	575	25	4,4	12080	661	5,5
1959	779	66	8,5	15400	1638	10,6
1960	850	65	7,6	13600	1544	11,3
1961	420	35	8,3	7476	959	12,8
1962	598	31	5,2	12578	667	5,3
1963	1419	62	4,4	34896	1711	12,2
1964	1644	126	7,7	24545	3175	9,2
1965	1636	141	8,6	34931	3768	10,8
Գումարը՝	7921	551	7,0	165506	14126	8,5

Թոքային ոչ սպեցիֆիկ խրոնիկ հիվանդությունների պատկերն ավելի պարզ արտահայտելու համար մենք այն բաժանել ենք խմբերի և դուրս բերել կանանց և տղամարդկանց հարաբերակցությունը ըստ տարեթվերի և ըստ դիագնոզների: Այդ հիվանդություններից առաջինը խրոնիկ բրոնխիտն է, որը մյուս թոքային հիվանդությունների մեջ կազմում է 55,6%, երկրորդը՝ ասթմատիկ բրոնխիտը—16,5%, երրորդը՝ բրոնխիալ ասթման—10,3% և վերջինը՝ 4-րդ խումբը, խառը խումբն է—11,4%, որի մեջ մտնում են թոքերի թարախակալույտը, փտախտը, բրոնխոպնևմոնիաները՝ իրենց քանակի քիչ լինելու պատճառով:

Վերջին խմբում մեծ մասը կազմում են բրոնխոպնևմոնիաները: Ըստ հիվանդանքների սեռի, մեծամասնությունը կազմում են տղամարդիկ, բացառությամբ բրոնխիալ ասթմայի, որտեղ տղամարդիկ փոքրամասնություն են կազմում, իսկ կանայք 1,6 անգամ ավել են:

Խրոնիկ բրոնխիտի մեջ հատկապես մեծամասնություն են կազմում տղամարդիկ և 2,4 անգամ գերակշռում են կանանց թվին (աղյուսակ 2):

Ջանալով ավելի պարզ և ավելի ճիշտ պատկերացում տալ թոքային հիվանդությամբ տառապող հիվանդանքների մասին, մենք նրանց բաժանեցինք տարիքային խմբերի, որտեղ արտահայտված է նաև սեռը: Վերցված է հիմնականում չորս խումբ.

- 15—40 տարեկան՝ 52 կին, 57 տղամարդ,
- 41—60 տարեկան՝ 105 կին, 165 տղամարդ,
- 61—68 տարեկան՝ 34 կին,
- 61—70 տարեկան՝ 25 տղամարդ:

և վերջին խումբը՝ երկարակյացների խումբն է, որտեղ մտնում են կանայք՝ 69 տարեկանից բարձր, թվով 13 հիվանդ, իսկ տղամարդիկ՝ 71 տարեկանից բար-

ձեր, թվով 25 հիվանդ: Դիտելով 2-րդ խումբը՝ 41—60 տարեկանը, կարելի է եզրակացնել, որ այդ հասակը երկու սեռերի համար էլ, թոքային ոչ սպեցիֆիկ հիվանդությունների տեսակետից, ավելի խոցելի է (աղյուսակ 3):

Աղյուսակ 2

Դ ի ա գ ն ո ղ

Տարե- թիվը	Թոքային հիվանդ. քանակը	Խրոնիկ բրոնխիտ		Ասթմատիկ բրոնխիտ		Բրոնխային ասթմա		Բրոնխո- էքստազ		Այլ թոք. հիվանդ.	
		քան.	տոկ.	քան.	տոկ.	քան.	տոկ.	քան.	տոկ.	քան.	տոկ.
1958	25	12	48,0	1	4,0	5	20,0	4	16,0	3	12,0
1959	66	44	66,7	12	18,2	6	9,1	3	4,5	1	1,5
1960	65	37	56,9	9	13,9	2	3,1	1	1,5	16	14,6
1961	35	19	54,3	3	5,7	6	17,1	3	8,6	5	14,3
1962	31	17	55,0	6	19,3	4	12,8	4	12,9	—	—
1963	62	32	51,7	11	17,7	11	17,7	2	3,2	6	9,7
1964	126	65	51,7	25	19,7	12	9,5	7	5,6	17	13,5
1965	141	80	56,8	15	17,7	11	7,8	10	7,1	15	10,6
Ընդա- մենը՝	551	306	55,6	91	16,5	57	10,3	34	6,2	63	11,4

Աղյուսակ 3

Թոքային հիվանդներն ըստ տարիքային խմբերի

Տարեթիվը		Հիվանդներն ըստ տարիքային խմբերի																	
		Բացար- ձակ քանակը		1-ին խումբ				2-րդ խումբ				3-րդ խումբ				4-րդ խումբ			
				կին		տղ.		կին		տղ.		կին		տղ.		կին		տղ. 71	
				15—40	15—40	41—60	41—60	21—60	21—68	69 ավ.	71								
քա- նակ	տո- կոս	քան.	տոկ.	քան.	տոկ.	քան.	տոկ.	քան.	տոկ.	քան.	տոկ.	քան.	տոկ.	քան.	տոկ.	քան.	տոկ.		
1958	25	100	1	4,0	5	26,6	7	28,0	6	24,0	1	4,0	4	16,0	1	4,0	—	—	
1959	66	100	6	9,1	9	13,6	10	15,1	23	35,0	4	6,0	11	16,7	2	3,0	1	1,5	
1960	65	100	7	10,8	6	9,2	2	3,1	29	44,7	3	4,6	18	27,6	—	—	—	—	
1961	35	100	2	5,7	4	11,4	10	26,6	15	44,9	—	—	4	11,4	—	—	—	—	
1962	31	100	1	3,2	1	3,2	6	19,4	7	22,6	2	6,5	12	38,7	1	3,2	1	3,2	
1963	62	100	10	16,1	6	9,7	12	19,4	15	24,2	8	12,9	10	16,1	—	—	1	1,6	
1964	126	100	13	10,3	10	7,9	27	21,4	35	27,8	9	7,1	19	15,2	3	2,4	10	7,9	
1965	141	100	12	8,5	16	11,3	31	22,0	35	24,8	7	5,0	22	15,6	6	4,3	12	8,5	
Ընդա- մենը	551	100	52	9,4	57	10,3	105	19,1	165	39,9	34	6,2	100	18,1	13	2,4	25	4,6	

Բոլոր խմբերի մեջ, ինչպես տեսնում ենք, տղամարդկանց թիվը գերա-
կշռում է կանանց թվին: Տղամարդիկ կազմում են 63%, իսկ կանայք՝ 37%:

Ախտահարված տղամարդկանց թիվն ականբախ է հատկապես խրոնիկ բր-
ոնխիտով տառապողների մեջ՝ 55,5% (ընդհանուր թվից):

ԵԼՔԸ.— Վերլուծելով տարիների ընթացքում կլինիկայով անցած հիվանդների բուժման ընդհանուր ելքը, պարզեցինք, որ մահաբերությունը 1958—1965 թթ., այսինքն, ութ տարվա ընթացքում, կազմել է 2,5%, անփոփոխ դուրս է գրվել 5,3%-ը, լավացել է 78,3%-ը, և առողջացել է 13,9%-ը (աղյուսակ 4):

Աղյուսակ 4

Հիվանդության ելքը	Տ ա ր ե թ վ ե ր ք								Ը ն դ ա մ ե ն ք	
	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	քան.	տոկ.
Հիվանդների ընդ. քանակը	25	66	65	35	31	62	126	141	551	100
որից՝										
ա) մահաբեր	3	—	2	1	—	2	1	5	14	2,5
բ) անփոփոխ	1	2	3	2	6	5	2	8	29	5,3
գ) լավացում	19	58	54	29	22	48	110	117	431	78,3
դ) առողջացում	3	8	9	4	5	10	17	21	77	13,9

Այսպիսով, բերված վիճակագրական տվյալները մեզ թույլ են տալիս եզրակացնելու.

1. Թերապևտիկ հիվանդների մեջ բավական մեծ տեղ են բռնում Թոքային ոչ սպեցիֆիկ խրոնիկական հիվանդություններով տառապողները:

2. Այդ հիվանդների մահճակալ-օրերի թիվը մյուս թերապևտիկ հիվանդությունների համեմատությամբ բարձր է՝ երկարատև բուժման կարիք ունենալու պատճառով:

3. Թոքային ոչ սպեցիֆիկ խրոնիկ հիվանդություններով ախտահարված են ավելի շատ տղամարդիկ՝ 63%, քան կանայք՝ 37%, որոնք համեմատաբար հաճախ են հիվանդանում բրոնխիալ ասթմայով (1,6 անգամ):

4. Ըստ տարիքի, աշխատավորներն ավելի մեծ քանակ են կազմում 2-րդ խմբում՝ 41—60 տարեկան հասակում:

5. Ստացիոնար կոմպլեքսային բուժման շնորհիվ Թոքային ոչ սպեցիֆիկ խրոնիկական հիվանդությունների լավացման տոկոսը բարձրացել է. այն կազմում է 78%:

Ճրկանի բժիշկների կատարելագործման
ինստիտուտի թերապևտիկ կլինիկա

Ստացված է 8/VI 1966 թ.

А. С. ХАНОЯН

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ХРОНИЧЕСКИХ
ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО ДАННЫМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
КЛИНИКИ ЕГИДУВ-а
(1958—1965 гг.)

Р е з ю м е

Статистические данные по течению и исходу неспецифических хронических легочных заболеваний дают возможность сделать следующие выводы.

1. Среди терапевтических больных значительное место занимают страдающие неспецифическими хроническими болезнями легких (7%).
2. Количество койко-дней по этим болезням выше, чем по другим терапевтическим болезням, что объясняется длительностью процесса лечения их.
3. Неспецифическим легочным заболеваниям больше подвержены мужчины (63%), чем женщины (37%), которые чаще болеют бронхиальной астмой (1,6 раз).
4. Наибольшее количество больных встречается в возрасте 41—60 лет.
5. Благодаря комплексному лечению процент излечиваемости неспецифических легочных больных повысился и составляет 78,5%.