Ս. Ա. ՓԱՓԱԶՅԱՆ, Թ. Գ. ՕՎԱՆԵՍԵԿՈՎԱ

СОЧЕТАНИЕ ГРОЗДЕВИДНОЙ САРКОМЫ МАТКИ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Саркома тела и, особенно, шейки матки является относительно редким заболеванием [1, 2, 5, 6, 10 и др.]. Выделяют гроздевидную (ботриоидную) саркому, получившую свое название по внешнему сходству с виноградной гроздью, которая является одним из вариантов мезодермальных смешанных опухолей.

По данным литературы, гроздевидная саркома шейки матки встречается весьма редко [3, 4, 7, 8, 11, 12]. Как в отечественной, так и в зарубежной литературе имеются лишь единичные описания саркомы матки у беременных [9]. В доступной нам литературе указаний на сочетание беременности и гроздевидной саркомы шейки матки мы не встречаем. В этом аспекте считаем интересным привести наше наблюдение.

Больная Ш., 37 лет, поступила в гинекологическое отделение Армянского института рентгенологии и онкологии с диагнозом: рак шейки матки? Беременность?

Менструации с 15 лет, установились сразу, умеренные, продолжительностью 5 дней. Замужем с 18 лет, родов—4, один аборт сделан 7 лет назад. С февраля 1973 г. стала жаловаться на боли в нижней части живота, кровянистые выделения, контактные кровотечения. Менструации участились, стали нерегулярными и обильными. Спустя 3 месяца по поводу сильного маточного кровотечения обратилась в районную консультацию. Кровотечение было остановлено консервативными средствами. 28 июля кровотечение вновь повторилось, в связи с чем больная поступила в гинекологическое отделение онкологического института, где после клинического обследования был поставлен диагноз: полипоз шейки матки? Беременность 10—12 недель. 6/VIII произведена операция экстирпации матки, в послеоперационном периоде—рентгенотерапия (12 000 р).

Макроскопическое описание удаленного операционного материала: матка увеличена, размером с мужской кулак, дряблая, слизистая оболочка полнокровная. Из шейки матки свисает гроздевидное ветвящееся полипозное образование, напоминающее гроздь винограда размерами 10×9×8, состоящее из сосочков разной величины. Поверхность сосочков гладкая, одни из них темные, другие с синюшным оттенком. В основном сосочки мягкие, но встречаются и более плотные. На разрезе ткань сосочков отечная, рыхлая, местами желеобразной консистенции, беловато-розового цвета, в некоторых участках с тусклым оттенком.

Микроскопически опухоль отличается большой пестротой строения. Сосочки покрыты однорядным цилиндрическим, а местами многослойным плоским эпителием и представлены в основном миксоматозной

тканью, богатой сосудами со стазом в них и состоящей из круглых, веретенообразных и звездчатых клеток (рис. 1 а). Отростки последних анастомозируют между собой и образуют наружную сеть. Встречаются участки эмбриональной круглоклеточной ткани, имеющей саркоматозный вид с гиперхромными ядрами клеточных элементов и единичными

Рис. 1. а—сосочек, покрытый цилиндрическим эпителием, $\times 50$;
б—участок эмбриональной ткани, имеющей саркоматозный вид, $\times 200$;
в—островки гиалинового хряща, окруженного перихондрием, $\times 10$;
г—ворсинки хориона в стенке матки, $\times 50$. Окраска гематоксилин-эозином.

митозами в них (рис. 1 б). В некоторых полях среди миксоматозной ткани определяются островки гиалинового хряща, окруженного перихондрием (рис. 1 в), а также обширные очаги кровоизлияний. В кусочках из стенки матки ворсинки хориона—беременность (рис. 1 г).

Армянский институт рентгенологии
и онкологии

Поступила 21/1 1974 г.

Շ. Պ. ՓԱՓԱՋՅԱՆ, Տ. Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻԿՅԱՆ

ԱՐԳԱՆԴԻ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՈՂԿՈՒՅՉԱԶԵՎ ՍԱՐԿՈՄԱ
ՀԴՒՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հոդվածում նկարագրված է արգանդի պարանոցի հազվագյուտ պատահող ողկույթաձև սարկոմայի և 10—12 շաբաթական հղիության համատեղ դեպքի մասին: Հայկական ՍՍՀ Ռենտգենաօնկոլոգիական ինստիտուտը է ընդունվել 37 տարեկան մի կին՝ արգանդի պարանոցի քաղցկեղ ախտորոշումով, որովայնի ստորին մասի ցավերի և արգանդային արյունահոսության զանգատներով:

6/8 1973 թ. կատարված է արգանդի հեռացում: Կլինիկորեն հետազոտությունից հետո ախտորոշվել է արգանդի պարանոցի պոլիպոզ և հղիություն: Միայն վիրահատությունից հետո հիստոլոգիական մանրակրկիտ հետազոտությունից ախտորոշվել է արգանդի պարանոցի ողկույզաձև սարկոմա և հղիություն:

Տվյալ նկարագրությունը հետաքրքիր է և այն տեսակետից, որ մեզ մատչելի գրականությունից նույնպես չենք հանդիպել ողկույզաձև սարկոմայի և հղիության համատեղ դեպքի նկարագրության:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Апетов А. С. Советская медицина, 1949, 9, стр. 27.
2. Вамбергский В. Ф. Акушерство и гинекология, 1949, 4, стр. 24.
3. Дасаева А. М. Казанский медицинский журнал, 1965, 6, стр. 57.
4. Краевский Н. А., Смоляников А. В. Руководство по патологоанатомической диагностике опухолей человека. М., 1971.
5. Каркашин В. Н., Лихачев А. А. Вопросы охраны материнства и детства, 1966, 9, стр. 90.
6. Николаева-Грачева Ю. П. Казанский медицинский журнал, 1971, 3, стр. 75.
7. Петрова Е. Н. Гистологическая диагностика заболеваний матки. М., 1959.
8. Пономарева П. И. Акушерство и гинекология, 1964, 4, стр. 31.
9. Рубинштейн С. Я. Акушерство и гинекология, 1966, 7, стр. 70.
10. Серебров А. И. Злокачественные опухоли, т. III, ч. II. Л., 1962.
11. Суол С. Ф. Советская медицина, 1949, 9, стр. 29.
12. Alzpuer. Archives of pathology, 1955, 60, 3, 329.