МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРМЯНСКОЙ ССР

Управление лечебно-профилактической помощи

СИНДРОМ «ПОДВИЖНОЙ СЛЕПОЙ КИШКИ», ЕГО
РАСПОЗНАВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ

(Методические рекомендации)

Авторы—проф. И. Х. ГЕВОРКЯН и проф. Г. Л. МИРЗА-АВАКЯН
Ереван, 1979 г.

Чрезмерная подвижность правой половины толстой кишки, обусловленная аномалиями развития ее фиксирующего аппарата, по данным различных авторов, встречается от 6,8 до 31,4%. Наличие чрезмерной подвижности правой половины толстой кишки часто приводит к возникновению своеобразной симптоматиологии, а нередко и тяжелых осложнений (инвагинация, кишечная непроходимость, спаечная болезнь и др.).

В методических рекомендациях приводится симптоматология синдрома «подвижной слепой кишки», методы его распознавания и лечения.

Авторами взамен фиксации слепой кишки, что признано антифизиологическим вмешательством, предложена новая операция—мезоперитонизация нижней трети восходящей кишки. Техника этой операции подробно приведена в методических рекомендациях и иллюстрируется фотоснимками.