

компромиссов, переоценок интериоризированных норм, позиций и ценностей, ведут, с одной стороны, к возникновению и фиксации лишь частично разряжаемых эмоциональных состояний, с другой—к стимуляции перманентной идеаторной переработки ситуации. Показано, что в условиях средового стресса подобный тип психологического реагирования и стереотип разрядки эмоциональной напряженности может служить патогенетической основой стойкого повышения артериального давления.

5 с., илл. 1, библиогр. 14 назв.

Кафедра факультетской терапии Ереванского
медицинского института

Поступила 17/VI 1981 г.

Полный текст статьи депонирован в ВНИИ медицинской и
медико-технической информации за № Д-5216

УДК 612.013.7—577.3:541.135:612.4:618.2

Ж. С. АРУТЮНЯН, Д. З. ГРИГОРЯН

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ-ЭКСКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ У БЕРЕМЕННЫХ

Исследованы суточные ритмы выделения слюны и содержащихся в ней электролитов натрия, калия и хлоридов с помощью усредненных хронограмм у здоровых беременных в трех триместрах физиологически протекающей беременности и на 7-й день послеродового периода. Установлено, что в течение беременности и в послеродовом периоде электролитный ритмостаз в слюне претерпевает определенные изменения, связанные с адаптационной перестройкой обмена веществ и электролитного обмена, в частности.

Составленные нормативные усредненные хронограммы могут быть использованы для выявления ранних отклонений и регулирования электролитного баланса у беременных.

5 с., табл. 2, библиогр. 7 назв.

Институт акушерства и гинекологии
им. Н. К. Крупской

Поступила 12/V 1981 г.

Полный текст статьи депонирован в ВНИИ медицинской и
медико-технической информации за № Д-5458 от 29/VII 1982 г.

УДК 616—056

А. М. ЗАВГОРОДНЯЯ, Э. Е. НАЗАРЕТЯН, Г. К. ХАЧАТРЯН

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОНТАННОГО РОЗЕТКООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Изучалась функция Т-лимфоцитов при периодической болезни (ПБ) с помощью показателей спонтанного розеткообразования и использование этого теста в труднодиагностируемых случаях при ПБ и системной красной волчанке. Выявлено значительное статистически достоверное, особенно во время приступов, снижение этих показателей. Отмеченные иммунологические сдвиги коррелируют с клиническим те-