

В. М. АРУТЮНЯН, Г. А. ЕГАНЯН, Г. А. МИНАСЯН

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУЛЬПИРИДА ПРИ ЯЗВЕННОЙ  
БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ**

В условиях рандомизированного контролируемого двойного слепо-го исследования изучена противоязвенная активность эглонила (сульпирида) у 46 больных, из коих 7—с язвенной болезнью желудка и 39—двенадцатиперстной кишки в возрасте 17—52 лет. Длительность болезни—от одного года до 12 лет. Первая группа (26 больных) получала сульпирид в дозе 200 мг 2 раза в день до еды, вторая—контрольная группа (20 больных) —дважды в день получала плацебо. Всем больным назначен диетический стол № 1.

Через месяц от начала лечения у всех больных проводилось повторное эндоскопическое, рентгенологическое обследование и исследование желудочного сока фракционным методом с определением дебита свободной соляной кислоты за час.

Показано, что сульпирид эффективно устраняет моторно-эвакуаторные нарушения—явления гастро- и дуоденостаза и оказывает антацидное действие при исходно высоких цифрах кислотности желудочного сока, в то же время он существенно не влияет на секрецию в случаях нормо- и гипоацидного состояния. Благодаря этим свойствам препарат вызывает быструю регрессию клинической симптоматики и достоверно ускоряет рубцевание язвы. Вышесказанное позволяет рекомендовать широкое применение его в комплексной терапии язвенной болезни.

7 с., 1 табл., библиогр. 8 назв.

Кафедра факультетской терапии  
Ереванского медицинского института

Поступила 19/IV 1983 г.

Полный текст статьи депонирован в ВНИИ медицинской и медико-технической информации за № Д-6680 от 10/VIII 1983 г.