

Р. С. МАМИКОНЯН, В. М. АРУТЮНЯН, Г. А. МИНАСЯН, Г. А. ЕГАНЯН

АНТИДЕПРЕССИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ВЕРАПАМИЛА
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
И НЕВРОТИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИЕЙ

В условиях рандомизированного двойного слепого испытания исследована антидепрессивная активность верапамила (изоптин, финоптин) у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС). Больные были разделены на две группы, одна из которых получала верапамил (120—240 мг/день), а вторая (контрольная)—дипиридамолом и препаратами нитроглицерина. С помощью ММРТ и психологического интервью контролировался психический статус больных, проводились также повторные ЭКГ и клиническая оценка симптоматики. Депрессивный синдром считался устраненным при исчезновении трех наиболее значимых симптомов: пониженного настроения, психомоторной заторможенности, тревоги.

При оценке результатов через месяц после начала лечения у больных с ИБС и невротической депрессией, принимавших верапамил, был констатирован отчетливый антидепрессивный эффект ($P < 0,05$). По переносимости верапамил значительно превосходил комбинацию дипиридамола—нитраты; последние относительно часто провоцировали головные боли, гипотонию, тахикардию, тошноту, зуд. Верапамил рекомендуется в качестве специфического для кардиологической практики антидепрессивного средства. Вместе с тем верапамил с успехом может быть использован в психиатрии у больных с депрессией, у которых наличие сопутствующих сердечно-сосудистых поражений препятствует назначению классических антидепрессантов.

6 с., табл. 1, библиогр. 20 назв.

Кафедра факультетской терапии
Ереванского медицинского института

Поступила 20/IV 1984 г.

Полный текст статьи депонирован в ВНИИ медицинской и медико-технической информации за № Д-7937 от 7/VI 1984 г.

Р. С. МАМИКОНЯН, В. М. АРУТЮНЯН, Г. А. МИНАСЯН, Г. А. ЕГАНЯН

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СУЛЬПИРИДА В ТЕРАПИИ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Сульпирид—неседативный гипоталамический нейролептик, широко используемый в психиатрии и гастроэнтерологии, испробован в лечении климактерических расстройств. Апробация проводилась у 38 женщин с выраженной климактерической симптоматикой, контроль осуще-