

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем применение АТФ в комбинации с другими лечебными мероприятиями при лечении больных, страдающих указанными заболеваниями.

8 с., библиогр. 5 назв.

Институт биохимии АН Арм. ССР
и Ереванский медицинский институт

Поступила 15/III 1983 г.

Полный текст статьи депонирован в ВНИИ медицинской и медико-технической информации за № Д-7935 от 7/VI 1984 г.

УДК 575.191:616.64—007.17

И. В. СИМОНЯН, М. А. ХАЧИКЯН

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ «ЛОЖНОМ МУЖСКОМ ГЕРМАФРОДИТИЗМЕ»

Одной из причин первичной аменореи и бесплодия является реверсия пола, в которую входит группа больных с «ложным мужским гермафродитизмом». Под «ложным мужским гермафродитизмом» подразумевается ряд патологических состояний, при которых формируется широкий спектр фенотипов и наружных половых органов при генетически мужском поле. Различают феминизирующую и маскулинизирующую формы «ложного мужского гермафродитизма», в основе которых лежат различные дефекты в генной системе регуляции.

Среди индивидов, обратившихся по поводу первичной аменореи и бесплодия, клинико-генетическими исследованиями выявлено 6 случаев «ложного мужского гермафродитизма». Учитывая редкость данной патологии, авторы сочли целесообразным представить анализ собственных наблюдений и особо отметить роль генетических методов в дифференциальной диагностике «ложного мужского гермафродитизма», включающих в себя анализ карiotипа, дерматоглифики и родословной.

На основании проведенных исследований можно судить о широком полиморфизме «ложного мужского гермафродитизма», обусловленного различными наследственными дефектами. Четкая дифференцировка клинических вариантов на основании комплексных клинико-генетических исследований необходима для правильного и эффективного лечения.

8 с., библиогр. 8 назв.

НИИ акушерства и гинекологии им. Н. К. Крупской

Поступила 29/XII 1983 г.

Полный текст статьи депонирован в ВНИИ медицинской и медико-технической информации за № Д-7791 от 4/V 1984 г.

УДК 616.15—002+616.992.28/:615.282

К. А. АКОПЯН

ЛЕЧЕНИЕ ГРИБКОВОГО КОЛЬПИТА КАНЕСТЕНОМ

Проведено лечение грибкового поражения женских половых орга-

503