ния. Обсуждаются механизмы гипотензивного действия препаратов калия. При этом отмечается, что дефицит калия увеличивает активность ренина в плазме, а увеличение концентрации калия снижает скорость секреции ренина, тормозит его выброс в кровь. Приводятся данные о холинэргической релаксации сосудов, опосредованной изменениями в K^+/Na^+ ионообменном пуле.

4 с., 1 табл., библиогр. 10 назв.

I кафедра внутренних болезней
Ереванского медицинского института

Поступила 20/IV 1984 г.

Полный текст статьи депонирован в ВНИИ медицинской и медико-технической информации за № Д-7938 от 8/VI 1984 г.

УДК 575.2+003.12+577.16.3+615.382+616.155.392+616.08

Л. Ф. БИЛЯН

ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ α -ТОКОФЕРОЛА В ПЛАЗМЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ ДО И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ

Острый лейкоз сопровождается резким понижением в плазме крови содержания эндогенного α -токоферола. В результате проведения соответствующего комбинированного лечения по известным схемам ВАМП, АВАМП и ЦАМП, а также применения в некоторых случаях несложных комбинаций преднизолона с 6-меркаптопурином имеет место наступление состояния ремиссии, характеризующейся как улучшением общего состояния больных, так и нормализацией у них процентного содержания в плазме крови изученного антиоксиданта.

5 с., 1 табл., библиогр. 12 назв.

НИИ переливания крови МЗ Арм. ССР

Поступила 13/III 1984 г.

Полный текст статьи депонирован в ВНИИ медицинской и медико-технической информации за № Д-8390 от 30/VIII 1984 г.