

регуляции иммунного ответа. Очевидно, поиск средств и воздействий, активирующих Т-супрессорную активность, является наиболее перспективным в терапии ПБ.

5 с., табл. 2, библиогр. 15 назв.

Кафедра № 1 внутренней терапии

Ереванского медицинского института

Полный текст статьи депонирован в ВНИИМИ МЗ СССР

за № Д-10135 от 26/VIII 1985 г.

Поступила 15/IV 1985 г.

УДК 616—002.5:616—073.4—8

Е. П. СТАМБОЛЦЯН, Э. А. АПРЕСЯН, О. Г. ПАПАНЯН, Е. Ф. МАРКОВА

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

С целью повышения эффективности лечения деструктивного туберкулеза легких у 130 больных применено стимулирующее средство—ультразвук на фоне химиотерапии через 4—5 месяцев от начала лечения. Среднее количество процедур—20, постоянный режим, доза—от 0,2 до 0,8 вт/см^2 , продолжительность от 2 до 6—8 мин. До применения ультразвука у 84 больных размеры каверн составляли до 2 см, у 46—2—5 см. При полостях размером более 5 см ультразвук не применялся.

В результате лечения у 71,5% больных полости закрылись, у 26,1%—уменьшились в размерах. Наилучший эффект получен при диссеминированном, очаговом и инфильтративном туберкулезе. Меньший эффект наблюдался при кавернозном, фиброзно-кавернозном туберкулезе и туберкуломах. Больным этими формами туберкулеза показано хирургическое лечение. У 99,1% больных наступило стойкое абациллирование. Типы заживления полостей были в основном в виде ограниченного фиброза—у 43%, рубца—у 30,1%. Реже отмечен исход в рубец-очаг—у 18,3%, в бронхоэктазы—у 8,6% больных.

Полученные результаты позволяют рекомендовать более широкое применение ультразвука как одного из эффективных методов неспецифической терапии туберкулеза.

5 с., библиогр. 8 назв.

Кафедра фтизиатрии ЕГИУВ

Полный текст статьи депонирован в ВНИИМИ МЗ СССР

за № Д-10136 от 26/VIII 1985 г.

Поступила 3/VI 1985 г.

УДК 616—076:616—003

В. М. АРУТЮНЯН, Г. А. ЕГАНЯН, Г. А. МИНАСЯН,
С. Д. ТАТЕВОСЯН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОПСИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ АМИЛОИДОЗА ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

В последние годы благодаря внедрению в практику фиброэндоскопических методов исследования у больных периодической болезнью все