

**ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵԼԱԿՏԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ
ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԾԱԽՍԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ԳԱՅՄԱՆԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՈՎ**

Բուժական ժամանակի ծախսումների նորմաները գնահատվում են տարբեր ցուցանիշներով, որոնց թվում և պայմանական աշխատանքային միավորներով, որոնք մշակվում են ժամանակահատվածի (ըրոնոմետրաժի) մեթոդով։ Վերջին տարիներին ստոմատոլոգիայում ի հայտ են եկել նոր բուժական մանիպուլացիաներ, որոնք առաջներում գնահատված չեն եղել ՊԱՄ-ի չափանիշով։ Դրանք բժշկական մանիպուլացիաներ են կանխարգելիչ, բուժական, ախտորոշիչ նպատակներով։ Անց է կացվել ժամանակահատվածի հետևյալ մանիպուլացիաների համար՝ հիգիենիկ ինդեքսի որոշում, ատամների պատումը ֆտորային լաքով, ապլիկացիա նատրիում ֆտորի լուծույթով և այլն, որոնց արդյունքները այնուհետև մշակվել են հաշվողական կենտրոնում։ Այսպիսով, ի հայտ է գալիս ռեալ հնարավորություն հաշվի առնել բժշկի աշխատանքը, որը նախկինում հաշվի չէր առնվում։

E. A. MNATSAKIAN, G. V. GOROVIC, E. A. ARUTYUNOVA,
Ts. V. KHACHATRIAN

**THE SYSTEM OF COMPLEX STOMATOLOGIC PROPHYLAXIS AND
ESTIMATION OF EXPENDITURE OF MEDICAL TIME IN
CONDITIONAL-WORKING UNITS**

The standards of the expenditure of the medical time are appraised by various criteria including conditional labour units produced by the method of time-keeping. Following manipulations were carried out; the application of the solution of fluoric sodium, the covering of the teeth by the fluoric varnish, the instruction of the private hygiene, the definition of the hygienic index.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Пахомов Г. Н. Первичная профилактика в стоматологии. М., 1982.
2. Рыбаков А. И., Гранин А. В. Профилактика кариеса зубов. М., 1976.

РЕФЕРАТ

УДК 577.154.21.616.69.32—008.8—0.7

Т. С. ДРАМПЯН, Д. М. АРУТЮНЯН, М. А. ХАЧИКЯН, К. К. АРУСТАМЯН

**ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ФРУКТОЗЫ И ФРУКТОЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ОПЛОДОТВОРЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СПЕРМЫ
ЧЕЛОВЕКА**

Проведено определение величины фруктозы и фруктолиза в эякулятах 93 мужчин репродуктивного возраста, находящихся в бесплодном

браке Установлена тенденция фруктолиза к уменьшению ($P > 0,1$) у мужчин с олигозооспермией и астенозооспермией и полное отсутствие фруктолиза у мужчин с азооспермией ($P < 0,001$). Отрицательные тесты проникновения через цервикальную слизь чаще отмечались при пониженном фруктолизе спермы.

6 с., библиогр. 9 назв.

НИИ акушерства и гинекологии им. Н. К. Крупской

МЗ АрмССР

Поступила 25/IV 1985 г.

Полный текст статьи депонирован в ВНИИМИ

за № Д-10583 от 23/XII 1985 г.