

ՔԱՆԱՔԵՆՈՒ ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ԹԻԹԵՂԱԳԼԱՆՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍԻ
ԲԱՆՎՈՐՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ
ՆՐԱ ԱՌՈՂՋԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Ուսումնասիրվել են Քանաքեռի ալյումինի գործարանի թիթեղագլանման արտադրամասի բանվորների աշխատանքային պայմանները: Պարզվել է, որ հիմնական վնասակար գործոնները հանդիսանում են քսայուղերի գոլորշիները, ինչպես նաև անբարենպաստ պայմանները, որոնք կարող են ազդել բանվորների առողջության վրա:

Առաջարկված են մի շարք առողջացուցիչ միջոցառումներ, որոնք ընդունվել են գործարանի ղեկավարության կողմից:

L. G. MELIKIAN, S. A. PETROSAIAN

HYGIENIC CHARACTERISTICS AND THE METHODS OF IMPROVEMENT OF WORKING CONDITIONS OF WORKERS IN THE FOIL-ROLLING SHOP OF KANAKER ALUMINIUM PLANT

The investigation of the working conditions of workers in the foil-rolling shop of Kanaker aluminium plant has revealed the factors having negative effect on the organism. In this connection the measures are proposed for the improvement of the working conditions.

Л И Т Е Р А Т У Р А

- ГОСТ 12.1.005—76. Воздух рабочей зоны.
- Никогосян Х. А., Аппель Я. А., Салманова М. И. Гигиена труда и профзаболеваний, 1969, 12, с. 3.

РЕФЕРАТЫ

УДК 616—053.31:577.7

Г. Д. ЕШУТКИН, А. Г. АЛЛАВЕРДЯН, Н. А. СИМОНЯН, И. М. КАРАПЕТЯН

ЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПНЕВМОПАТИИ В ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ

Проанализировано 433 случая перинатальной смертности новорожденных от различных форм пневмопатий. Установлена их связь с экстрагенитальными заболеваниями женщин, патологией беременности и родов, а также с асфиксией плода. Последняя наиболее часто предшествует в случаях ателектатической формы и при сочетании ателектазов с гиалиновыми мембранами, реже асфиксия предшествует при сочетании ателектатической и отечно-геморрагической форм. При отечно-геморрагической форме и гиалиновых мембранах предшествующая асфиксия отмечалась в единичных случаях. Цифры перинатальной смертности при ателектатической форме высокие в течение первых 6 часов после рождения, при гиалиновых мембранах и отечно-геморрагической форме перинатальная смертность нарастает к концу первых су-

ток. Кривые смертности при сочетанных формах отличаются особенно-
стями, характерными для каждой из сочетающихся форм.

7 с., библиогр. 3 назв., 1 рис.

Ереванский ИУВ

Полный текст статьи депонирован в ВНИИМИ
за № Д-11745 от 24/VII 1986 г.

Поступила 25/II 1986 г.

УДК 616.89:616.831—001

А. М. ХАЧАТУРЯН

ТИПЫ ПЕРЕЖИВАНИЙ БОЛЕЗНИ В СВЕТЕ ИХ ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Клинико-катамнестически обследовано 87 больных с психически-
ми нарушениями в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы. Боль-
ные подразделялись на 2 группы, отличающиеся по характеру лич-
ностных реакций на заболевание: 39 (I гр.)—с адекватными личност-
ными и адаптивными реакциями, направленными на преодоление по-
следствий травмы, и 48 (II гр.)—с аномальным типом переживаний бо-
лезни и реакций адаптации.

Характер личностно-адаптивных реакций был тесно связан с осо-
бенностями преморбида, наличием психотравмирующей ситуации, ми-
кросоциальным климатом, складывающимся вокруг больного после че-
репно-мозговой травмы. При оценке уровней социально-трудовой адап-
тации учитывались динамика показателей трудоспособности, профес-
сиональной квалификации, частота смены мест работы, долевое участие
в хозяйстве семьи.

Несмотря на отсутствие достоверных различий по степени тяжести
травматического повреждения и глубины резидуально-органической
патологии у больных обеих групп, показатели трудовой адаптации у
больных II группы были значительно хуже, чем в I ($P_{тмф} < 0,05$). По-
лученные данные свидетельствуют об определенной зависимости меж-
ду уровнем социально-трудовой адаптации больных в отдаленном пе-
риоде черепно-мозговой травмы и типом личностных реакций на за-
болевание.

6 с., библиогр. 8 назв.

Ереванский медицинский институт

Полный текст статьи депонирован в ВНИИМИ за
№ Д-12072 от 19/XI 1986 г.

Поступила 25/V 1986 г.

УДК 612.32+616.33

А. А. ТОРОСЯН, А. А. ТОРОСЯН

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРИТОВ С СЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТВАРОМ БАРВИНКА ТРАВЯНИСТОГО

Для лечения хронических гастритов с секреторной недостаточно-
стью был применен отвар барвинка травянистого—многолетнего ра-
стения из семейства кутровых.