

ни органов дыхания, ожирение и болезни органов пищеварения); расчетные методы прогнозирования течения миопии (графическое изображение прогрессирования, математическое прогнозирование миопии по возрастнo-градиентной формуле).

16 с., библиогр. 49 назв.

Республиканская больница глазных болезней
Полный текст статьи депонирован в ВНИИМИ
за № Д-15675 от 4/VII 1988 г.

Поступила 5/IV 1988 г.

УДК 616.831.41+615.787]: 616—018

В. А. МАРТИРОСЯН, М. К. АБРАМЯН

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГИПОТАЛАМИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И СОДЕРЖАНИЕ ГИСТАМИНА В КРОВИ У БОЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

У 258 больных периодической болезнью изучено содержание гистамина в крови и функциональное состояние гипоталамических центров в динамике заболевания и на фоне лечения колхицином.

Параллельное исследование функционального состояния гипоталамических центров показало, что на фоне нормальной биоэлектрической активности иногда появляются бета-, тета- и плоские потенциалы.

Во время приступа периодической болезни клиническая картина обуславливается развитием перитонита, плеврита и выраженных болевых (стрессовых) афферентных импульсаций к коре головного мозга. На ЭЭГ появляются выраженная бета-активность и временами симметричные медленные и острые волны.

При лечении колхицином эффективность препарата проявляется не только в прекращении или урежении пароксизмов болезни, улучшении общего состояния, но и коррекцией нарушенных нейрогуморальных показателей гомеостаза организма.

6 с., библиогр. 6 назв.

Кафедра терапии № 1 Ереванского медицинского института
Полный текст статьи депонирован в ВНИИМИ
за № Д-15676 от 4/VII—1988 г.

Поступила 15/V 1988 г.

УДК 616—056.7

С. А. МИДЯН, Н. П. ЗУРАБЯН

СИНДРОМ ЧАСТИЧНОЙ МОНОСОМИИ 10p

Хромосомные болезни обусловлены различными типами численных и структурных нарушений кариотипа. К последним относятся полисомии (чаще трисомии) и моносомии по отдельным хромосомам, а также частичные трисомии и моносомии в результате структурных перестроек хромосом. Сведения о последних стали интенсивно увеличи-