

В. А. ОРЛОВ, А. А. МАМИКОНЯН

СЕРДЦЕ ПРИ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Многолетний опыт работы по последипломному обучению врачей убеждает в том, что врачи-кардиологи, а тем более общие врачи-терапевты мало знакомы с патологией сердца при нервно-мышечных заболеваниях. Диагностируемые врачами кардиомиопатии, пролапс митрального клапана, нарушения ритма и проводимости чаще трактуются с позиций шаблонного, наиболее распространенного диагноза без учета возможности особенностей течения многих нервно-мышечных заболеваний, при которых кардиальная симптоматика может предшествовать проявлению основной патологии.

В связи с вышеизложенным нашей задачей явилось обобщение данных литературы о вовлечении сердца в патологический процесс при нервно-мышечных заболеваниях. Анализ литературных данных свидетельствует о высокой частоте поражения сердца при нервно-мышечных заболеваниях. Возможность нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы должна учитываться при обследовании и лечении этих больных.

6 с., библиогр. 18 назв.

II каф. терапии на базе ЦКБ № 3 МПС ЦОЛИУВ

Полный текст статьи депонирован в ВИНМИ

за № Д-17374 от 22/III 1989 г.

Поступила: 28/VI 1988 г.

УДК 616.12—005.3:631.3

Ф. С. НИКОГОСЯН

О ВЗАИМОСВЯЗИ МИОГЛОБИНА И ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

Изучены изменения концентрации миоглобина в сыворотке крови и ее взаимосвязь с динамическими электрокардиографическими показателями у больных с острым инфарктом миокарда.

В первый день обследования у 80% больных выявлена прямая корреляция между гипермиоглобинемией и электрокардиографическими изменениями. У 20% больных повышение уровня миоглобина в крови происходило на фоне незначительных изменений электрокардиографии, что делает наличие гипермиоглобинемии более чувствительным и ранним диагностическим тестом острого инфаркта миокарда. В последующие дни наблюдалась постепенная нормализация уровня миоглобина на фоне «положительной» динамики электрокардиограммы.

Гипермиоглобинемия можно рассматривать как высокочувствительный и ранний тест, который как самостоятельно, так и в сочетании с электрокардиографией может быть эффективно использован в диагностике острого инфаркта миокарда. Серийное исследование уровня миоглобина в комплексе с электрокардиографией позволяет обнару-